









132583/2

H. x

18/2







Digitized by the Internet Archive  
in 2016 with funding from  
Wellcome Library

[https://archive.org/details/b28769727\\_0001](https://archive.org/details/b28769727_0001)

B E S C H R I J V I N G  
VAN ALLE DE  
H E E L K U N D I G E  
O P E R A T I E N ,

Naar de beste en nieuwste wijzen,

D O O R

L. L E B L A N C ,

*Heelmeester te Orleans e. z. v.*

In het Hoogduitsch uitgegeeven, en met aanmer-  
kingen verrijkt,

D O O R

D R. C. F. L U D W I G ,

*Hoogleeraar der Geneeskunde, te Leipzig.*

En nu in het Nederduitsch vertaald, en met veele  
aanmerkingen vermeerderd,

D O O R

W I L L E M L E U R S ,


*Heelmeester te 's Gravenhage, Chirurgijn Major bij de Gardes  
du Corps van zijne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prin-  
ce van ORANGE en NASSAU &c. &c. &c. Lid  
van het Genootschap ter bevordering der Heelkunde  
te Amsterdam, en van de Haagsche en Utrecht-  
sche Letterkundige Maatschappijen.*

E E R S T E D E E L.

*Met koperen Platen.*

---

T E U T R E C H T ,  
Bij G. VAN DEN BRINK, JANSZ.  
Stadsdrukker en Boekverkooper over het Stadhuis.  
M D C C X C.



Veru  
K E





# O P D R A G T

A A N D E N

WEL-EDELEN ZEER GELEERDEN EN ER-  
VAAREN HEERE

G. T E N H A A F F ,

MED. DOCTOR, LECTOR *Chirurgiæ Clinicæ*,  
OUD PREMIER-CHIRURGIJN *by 's Lands-  
Leger Hospitaalen*, STADS CHIRURGIJN en EXA-  
MINATOR *by de Oost-Indische Compagnie te Rot-  
terdam*, OPERATEUR *van den Steen te Delft*,  
LID *van de Hollandsche Maatschappij der Weten-  
schappen te Haarlem*, *van het Bataafsch Genoot-  
schap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rot-  
terdam*, *van het Provinciaale Genootschap der  
Kunsten en Weetenschappen te Utrecht*, en *van het  
Genootschap ter bevordering der Heelkunde te Am-  
sterdam*.

*Wel Edele zeer geleerde en Ervaaren Heer!*

*Het is niet alleen het gevoel eener levendigste  
vriendschap, die mij sinds eenen geruimen tijd, zo  
naauw aan u verknogt heeft, maar het is veelêr de  
eerbiedigste Hoogâchting voor uwe uitmuntende be-  
kwaamheden, die mij de vrijheid doen ncemen, dit  
Werk, OVER DE OPERATIEN DER HEEL-  
KUNST, van den voortreflijken LE BLANC, met*

de verbeteringen van den Beroemden LUDWIG, in een Nederduitsch gewaad en met eenige aanmerkingen vermeerderd, aan Uw Ed. nederig op te draagen.

*Aan wien kon ik zulks beter doen dan aan U, die in dit vak der Edele Weetenschappen zijt grijs geworden; die zo veele vrugten van Uwe Letterarbeid, bier over, aan den Nederlandschen Heelmeester hebt nagelaaten, die nog dagelijks bezig is Hem, hierin, te onderrichten; en aan wien ik in het bijzonder, in verscheide opzigten, de hoogste erkentenis verschuldigd ben.*

*Ontvang het gunstig. ——— En laat dit merk mijner erkentenis, hoe gering in zich zelve, U echter ten bewijze zijn, tot welk eens prijs uwe vriendschap en verdiensten bij Hem geschat worden, die de ser heeft, met de levendigste gevoelens van eerbiedige Hoogachting zich te noemen:*

*Wel Edele zeer geleerde en ervaaren Heer!*

*Uw Ed. Bereidvaardigen en ootmoedigen Dienaar,*

*'s Gravenhage,  
den 14 October  
1790.*

*W. L E U R S.*



# VOORBERICHT

V A N D E N

NEDERDUITSCHEN VERTAALER.

**D**E OPERATIEN DER HEELKUNST zijn ongetwijfeld het gewichtigste Leerstuk dezer edele Weetenſchap, en vorderen derhalven van baare Beoëffenaaren eenen verdubbelden aandacht. — Het was ook daarom dat ik, voor eenigen tijd, voornam, dit werk van den Beroemden LE BLANC over dit onderwerp, aan mijne Landgenooten, in hunne moedertaal mede te deelen.

't Is waar, het ontbreekt denzelven, dit aangaande, aan geene goede voorschriften: DIONIS, GARRENGEOT, HEISTER, LE DRAN, SHARP en vooräl de tegenwoordige Néerlands uismuntende Heelmeester GESSCHER, zijn Hun, als zo veele bronnen, waar uit zij het meest noodige, in dit gedeelte dezer Weetenſchap, genoegzaam putten kunnen.

Met dit alles nogthans heeft LE BLANC zijne verdienſten; en ik vleije mij dat ook deze vruchten diens grooten Heelmeesters, aan mijne Nederlaandsche Kunſtgenooten, niet ten eenemaal onnut zijn zullen. — Een juist oordeel, gegrond op de beste ondervinding, heeft in de meeste gevallen zijne pen beſtuurd. En Leerſtellingen, op zodanige gronden gevestigd, moeten de goedkeurig van ervaarenen en de naarvolging van jonge Heelkundigen verdienen.

In de overzetting heb ik de Hoogduitsche uitgave van den Hoogleeraar LUDWIG verkoozen te volgen; voornamentlijk om dat die Heer ſommige ſtukken in eene beter orde geſchikt, andere overtelligen wegge-

laaten en op veele plaatzen nuttige Aantekeningen heeft bijgevoegd.

En daar dit Werk niet altoos in de handen van er-vaaren en geëffende Heelkundigen zal vallen, zo heb ik gemeend, over het geheel geen nutteloos werk te zullen doen, van op sommige plaatzen eenige Aantekeningen bij te voegen, die (na mijn inzien) dan eens ter opheldering en laater verbetering, en dan eens ter meerderer bevestiging dienden; doch welke ook somwijlen wel eens, tegen het gevoelen van onzen Schrijver aanloopen. Ik meenden, omtrend dit laatste, deze vrijheid, tegen het veelal doorgaand gebruik der meeste Vertaalers, te mogen behouden, om dat ik niet zo zeer de verdiensten van onzen Schrijver, als wel het belang eens Lijdend Menschdoms, poogden in acht te nemen. En in hoe verre ik hier in geslaagt ben, laat ik den Oordeelkundigen ter beslissing over.

De Heer LE BLANC heeft bij zijn Werk zelve eenige aantekeningen gevoegd, en deze zyn met een (\*) getekend; die van den Heer LUDWIG insgelijks met een (\*); doch welke op het einde, ter onderscheiding met die van LE BLANC, de letter (L) is bygevoegd; ik heb de mijnen met de letteren van het Alphabeth gemerkt en tusfschen twee [] ingeslooten.

Dit weinige oordeelden wij noodig den Nederland-schen Heelmeesteren te berichten; welken wij wenschen, dat uit dit Werk, ten nutte bunner lijdende Natuurgenooten, allezins een heilzaam voordeel trekken moogen.

## HOOFDSTUKKEN

## VAN HET EERSTE DEEL.

## I. HOOFDSTUK.

*Van de vereeniging der wonden.* bladz. 1.

## II. HOOFDSTUK.

*Van de vereeniging der peezen.* 12.

## III. HOOFDSTUK.

*Van de vereeniging der wonden van de tong.* 18.

## IV. HOOFDSTUK.

*Van de operatie der Haazemonden.* 25.

## V. HOOFDSTUK.

*Van het wegneemen der beurs- knoest- en kan-  
kerachtige gezwellen.* 37.

## VI. HOOFDSTUK.

*Van het openen der Ettergezwellen.* 44.

## VII. HOOFDSTUK.

*Van de Castratie.* 60.

## VIII. HOOFDSTUK.

*Van de Operatie der Phimosis en Paraphimosis.* 69.

## IX. HOOFDSTUK.

*Van de doorbooring.* 72.

## X. HOOFDSTUK.

*Van de Fistels aan den aars.* 78.

## XI. HOOFDSTUK.

*Van het Catheterismus, of de wijze om de sonde in de  
blaas te brengen.* 89.

## XII. HOOFDSTUK.

*Van de doorbooring der blaas.* 96.

## XIII. HOOFDSTUK.

*Van de Steensnede aan Manspersoonen.* 104.



# VIII INHOUD DER HOOFDSTUKKEN.

bladz.

§. 1. *Van de Steensnede met den hoogen toestel.* 106.

§. 2. *Van de Steensnede met den laaggen toestel.* 122.

## XIV. HOOFDSTUK.

*Van de Steensnede aan Vrouwsperfoonen.* 141.

§. 1. *Van het steensnijden aan Vrouwsperfoonen met den hoogen toestel.* 143.

§. 2. *Van het Steensnijden aan Vrouwsperfoonen met den laaggen toestel.* 144.

## XV. HOOFDSTUK.

*Hoe men van de tegenwoordigheid eens vastzittenden steens in de blaas verzekeren en denzelven 'er als dan uit haalen kan.* 149.

## XVI. HOOFDSTUK.

*Van de Keizerlijke snede.* 163.

## XVII. HOOFDSTUK.

*Van de Operatie der Etterborst.* 182.

## XVIII. HOOFDSTUK.

*Van de trepanceering of doorbooring der Hersenpan.* 232.

## XIX. HOOFDSTUK.

*Van de Strotsnede.* 246.

## XX. HOOFDSTUK.

*Van de Operatie der Slagader-gezwellen.* 259.

## XXI. HOOFDSTUK.

*Van de afzetting der Leden.* 280.

I. *Van de afzetting der vingers.* 281.

II. *Van de afzetting van den voorarm.* 286.

III. *Van het afzetten des opperarms.* 299.

IV. *Van het afzetten van het been.* 310.

V. *Van het afzetten der dijs.* 315.

KORTE

# KORTE BESCHOUWING

## DER

### HEELKUNDIGE

### OPERATIEN.

---

#### EERSTE HOOFDSTUK.

##### *Van de vereeniging der Wonden.*

**O**M eene eenvoudige, met een snijdend werktuig gemaakte, wond te heelen, is de bloote vereeniging genoegzaam. Het is genoeg, wanneer men de lippen der wonde slegts zamen voegt, behoorlijk aan elkander past en in dien stand houdt, zo dat zij aan elkander kleeven, zig als zamen smeeden en met elkander vereenigen kunnen.

Om de lippen eener wonde, die naar behoren vereenigd zijn, zamen te houden, bedienden de Ouden zig van de hegtingen met de naald, welken zij de *knoophegting*, de *pennehegting*, de *omgewonden hegting* en de *pelthershegting* noemden.

Ik zal over het misbruik dezer hegtingen, welken groote Heelmeesters voor mij gebruikten, niet breedvoerig handelen, maar mij alleenlijk vergenoegen, met te zeggen, dat er geen wonden zijn, die met een snijdend werktuig zijn gemaakt, welken men niet gemakliker door den stand, dien men aan het gewonde deel geeft, den

vereenigenden band en de drooge hegting, dan door de hegtingen met de naald, zou kunnen vereenigen (a). Het schijnt, als of de schrijvers, zelfs de nog in leven zijnde, welken deze hegtingen als onvermijdelijk noodzaaklijk aanbeveelen, en de wijze om ze te maaken, voorschrijven, de Ouden slaafsch nagevolgd hadden. Indien zij over de onvolmaaktheid dezer middelen, over de ongemakken, welken zij veroorzaaken, over de pijn, die zij verwekken, en over de toevallen, welken ontstaan, daar zij aangelegd worden, eenige waarneemingen gemaakt en dezelveu flegts volgens de ondervinding beschreven hadden, zouden zij er gewislijk zo veel ophef niet van gemaakt hebben.

Ondervinding en waarneeming hebben thans voldoende geleerd, dat men zig in plaats van deze hegtingen veel gevoeglijker van den behoorlijken stand van het gewonde deel en de drooge

(a) [Wij moeten met leedwezen bekennen, dat de hegtingen met de naald, niet dan maar te dikwerf in gevallen, daar dezelveu niet vereischt wierden, door geoefende Heelmeesters zijn voorgesteld en gebezigd, en dat dit zelfde misbruik nog bij veelen plaats heeft. — Dan, om alle wonden, gelijk onze geleerde Schrijver hier voorstelt, door *den stand, den vereenigden band, of door de drooge hegting* te hereenigen, kunnen wij zo gereedelijk niet toestemmen: vooral niet in dwerse wonden der Oogleden; in de bijna geheele afsnijding van den neus, of der ooren; doorgaande en hoekige doorsnijding der wangen; regte doorklieving der lippen met verlies van zelfstandigheid; als ook in darm- en zomtijds in groote buikwonden; maar welken allen meeren-deels vereischen door de *bloedige hegting* hereenigd te worden.]



hegting nevens den vereenigenden band kan bedienen (b).

Men maakt de drooge hegting best met Engelsche plaaster, welke men in kleine reepen, van twee of drie lijnen breed, snijdt; men legt dezen dwars over de wond, welke lippen men aan elkander gevoegd heeft, en laat tusschen elk paar reepen eene kleine ruimte. Om dezelve te doen kleeven, behoeft men ze slegts met de tong een weinig nat te maaken, en om ze in den behoortlijken stand te houden, en te beletten, dat zij niet losspringen, legt men twee andere kleine reepen dwars over de einden der eersten: hierop legt men een weinig plukzel, het welk het vogt naar zig neemt, en over het geheele verband legt men een' vereenigenden band aan, die zig naar het deel voegt. Deze reepen zijn ook boven de gegate plaasters te verkiezen, welken zommigen aanbevelen hebben.

De meeste hoofdwonden, welken tot derzelver heeling niets anders, dan de vereeniging vereischen, gelijk ook die van het aangezicht, waar bij

(b) [ De hegtingen door den Schrijver voorgesteld, hebben elke haare bijzondere werkzaamheden, in die gevallen, waar in zij gebruikt worden, als bij voorb. de *plaatsing des deels* komt te pas in diep doorgaande en dwersse Spier- of Peeswonden, het zij dezelve geheel, of ten deele zijn doorgesneden. — De *drooge hegting* werkt niet meer uit, dan dat dezelve de lippen der gescheiden huid aan elkander houd; en is dus niet anders gebruikelijk dan in huid- en oppervlakkige Spierwonden. — Het *vereenigend verband* word in de langwerpige wonden der Lede-maaten, meestal met behulp der drooge hegting, gebastigd. ]

de Ouden zig van de hegting met de naald bedienden, kunnen gemaklijk op dezelfde wijze vereenigd worden.

Om eene dwarswond aan het voorste gedeelte van den hals, waar bij ook de lugtpijp en de flokdarm, het zij ten deele of geheel, doorgesneden zijn, te vereenigen, laat men den gewonden het hoofd vooröver op de borst houden, en eenen genoegzaamen tijd in dezen stand blijven, door middel van een' daartoe geschikten halsband (\*). Tot meer zekerheid kan men er eenige reepen Engelsche plaaster op leggen en met den vereenigden band vastmaaken. De behoorlijk aan elkander gevoegde lippen der wonde, hoe groot en hoe diep dezelve ook mag'wezen, vereenigen zig op deze wijze zeer wél, kleeven aan elkander en hegten zig zamen, wanneer de lijder slegts zijne wond overleeft.

In eene dwarswond van den opperärm moet men den voorärm naar den opperärm buigen, eenige reepjes Engelsche plaaster daarop leggen, eenen zwagtel er om doen en den arm in eenen armband verzekeren.

Eene dwarswond aan de voorhand, aan den knieboog of dicht bij het gewrigt van den voet,

(\*) Men kan zig tot dat einde van den vereenigenden halsband van den heer GARENGEOT bedienen. Zie HENCKEL *vom chirurgischen Verbande, Berlin und Staalsund*, 1779. S. 127. *Taf. 6. Fig. 53.* Door middel van zulk een verband heb ik te Londen eene diepe dwarswond aan den hals, zonder eenige hegting of andere wijze van vereeniging, zien geneezen. Kortlings sloeg de heer EVERS een T verband voor. Zie RICHTERS *Bibl. Vl. Band*, S. 235. L.

kan men door middel van Engelsche plaaster en den band vereenigen ; doch voornaamlijk door het gewonde deel in eenen stand te brengen , die de vereeniging begunstigt.

Deze middelen zijn toereikende om eene dwarswond aan de voorste of middenste plaats van den arm of daar de tweehoofdige spier ten deele of geheel doorgesneden is , te vereenigen. Zulk eene gescheiden spier vormt eene open gaapende wond , inzonderheid , wanneer men het gewonde deel uitspant. De voorstanders der hegtingen beveelen voornaamlijk bij zulke wonden die aan , welken zij de pennehegting (*emplumée ou enchevillée*) noemen : maar de kennis van het maakzel van het gewonde deel heeft ons in staat gesteld , om in plaats van deze pijnlijke en dikwijls met toevallen verzelde hegting , zagter en zekerer middelen te verkiezen.

Om deze wonden te vereenigen , begint men met den voorarm naar den opperarm te buigen. Hierop brengt men de verhevenheid der bovenste armpijp , aan dewelke de pees der tweehoofdige spier vast is , naar den opperarm , het welk niet alleen de raking der lippen van de wonde , maar ook van het vleeschige deel der gescheiden spier gemaklijker maakt. Alsdan voegt men de lippen der wonde op elkander , legt er kleine reepen van Engelsche plaaster , en een weinig geschaafd plukzel op , het welk het vogt naar zig neemt , en een' eenvoudigen zwagtel er om. Op die wijze brengt men de doorgesneden deelen der spier aan elkander , legt den arm in eenen armband , de voorhand zo hoog als mogelijk is , verder draagt men zorg , dat de lijder in zijn bed of in zijnen leu-

ningstoel den arm van de borst af houd, en legt denzelfven te dien einde op een verheven kussen.

Wanneer de spieren, die den voorarm uitspannen, doorgesneden zijn, moet men in tegendeel den voorarm uitspannen en hem in dien stand houden.

Men moet zig van dezelfde hulpmiddelen bedienen, om eene dwarswond van de dije of eenige spieren, welken hier liggen, het zij dat dezelve ten deele of geheel doorgesneden zijn, te vereenigen. Men ziet hier uit, dat de kennis van de werking der spieren, derzelver ligging, inplanting en zamenvoeging den Heelmeester moeten leiden, ten einde niet slegts de behoorlijke middelen tot vereeniging van zulk eene wond te verkiezen, maar ook aan den lijder en het gewonde deel eenen stand te geeven, die tot vereeniging medewerkt.

Om bij voorbeeld eene wond aan het voorste en middendeel der dije, daar de regte dijespier nevens een gedeelte der beide dikke hier liggende spieren (*vasti*) door den houw van eenen sabel doorgesneden was, te vereenigen, zou de lijder in het bed het geheele been zo hoog, als mogelijk is, moeten opheffen en gelijk VALENTIJN, sprekende van de breuk der knieschijf (\*), zegt, zo hoog opligten, als de uitspannende spieren zig zelfven verheffen, wanneer zij derzelver werking nog kunnen doen. Door middel van dezen stand kunnen de einden der doorgesneden spieren zonder enig

(\*) *Recherches critiques sur les Chirurgiens modernes*, p. 184.



ander hulpmiddel aan elkander gebragt worden, en om het been in de vereischte hoogte te houden, zal de pantoffel, door VALENTIJN voorgeschreven (\*), aan welken te weêrziiden twee banden en een derde voor aan den neus vast gemaakt zijn, volkomen aan den wensch des Heelmeesters beantwoorden, alleenlijk moeten de banden lang genoeg zijn om aan den grooten lijfzwagtel vastgemaakt te kunnen worden. Maar, er word wezenlijk, gelijk dezelfde schrijver aanmerkt, vereischt, dat men onder het been en de dije kussens legge, welken groot genoeg zijn, om deze deelen om hoog te houden; ook kan men eene omgekeerde stoelleuning onder de kussens leggen, om dus de banden en doeken, welken aan den grooten lijfzwagtel vast gemaakt zijn, te ondersteunen. Verder legt men reepen van Engelsche plaaster, om de lippen der wonde aan elkander te houden, en een weinig geschaafd plukzel daar op, en verbind dit met eenen eenvoudigen zwagtel.

Indien de wond aan het agterdeel der dije was, en dat de spieren, welken daar liggen, gedeeltelijk of geheel van elkander gescheiden waren, dan zou men het been moeten buigen, hetzelfde met den band van PETIT (\*\*) of eenen voetzoek ge-

(\*) *Recherches &c.* p. 185.

(\*\*) Men vind in het *Precis de Chirurgie pratique, par M. P., Paris 1768. 8. Pl. III.* eene afbeelding van het maakzel van dezen band. Dezelve bestaat uit eenen pantoffel, welke van agter door middel van eenen band opgetrokken en aan de knie naar boven en naar beneden door twee gespen vastgemaakt word. De afbeelding van het werktuig van MONRO vind men op de V. pl. fig. 1-9, in

bogen houden en de dije zo veel mogelijk uitsprekken, ten einde de afgesneden einden der spieren elkander kunnen raaken en zig zamenvoegen.

Men gebruikt dezelfde middelen, om eene dwarswond aan het been te genezen.

Wanneer de wond aan het voorste en buitenste gedeelte ter zijde van het been en diep is, moeten de spieren, welken den voet zijdwaard naar buiten beweegen, ten deele of geheel gescheiden zijn. In dit geval moet men het geheele deel uitsprekken, den voet buitenwaard buigen en hem in dien stand houden, zonder hem te veel geweld aan te doen; met één woord, de deelen der gescheiden spieren zo aan elkander brengen, dat zij zamen kleeven en zig vereenigen kunnen. Hierop legt men eenige reepen Engelsche plaaster en eenen vereenigenden band aan. Doch het gansche verband bezorgt men door eene soort van steigbeugel, welks riemen aan eenen lijfband of over de knie vastgemaakt zijn, en in dien gebogen stand laat men het been en de dije op verheven kussens rusten.

Als de kuitspieren ten deele of geheel met eenen fabel doorgchouwen zijn, moet men den voet uitsprekken en hem in dien stand houden door middel van den band door den overleden PETIT uitgevonden, of met eenen voetzok, welks banden of riemen men met eenen kringwijzen band over

ALEXAND. MONRO *des ältern Sämmtlichen Werken.* Leipzig 1682. HENCKEL heeft een dergelijk voorgesteld. L. [Zie ook D. VAN GESSCHER *Hedendaagsche oefenende Heelkunde* L. d. pl. XVII.]

de knie vast maakt [zie bladz. 7. \*]. Tevens moet men het been buigen en het met denzelfden band, welke dient om den voet uitteftrekken, gebogen houden. Door middel van deze houding komen de doorgesneden boven- en beneden-deelen der spieren zo aan elkander, dat zij zig onmiddellijk raaken en vereenigen kunnen.

De band, welke den voet uitstrekt en het dijbeen gebogen houd, moet zo aangelegd worden, dat hij den lijder niet te zeer drukt; het is genoeg, wanneer hij, om de begeerde werking te doen, de onwillekeurige uitspanning van het dijbeen en de buiging van den ondervoet belet.

De wonden der borst, des onderbuiks en van alle uitwendige deelen des lijfs, moeten door de houding, de drooge hegting en den vereenigden band vereenigd worden (c).

(c) [ Wij merkten hier boven (bladz 2. (a)) aan, dat 'er somtijds buikwonden waren, waarin de hegting met de naald onvermijdelijk is. Dit willen wij verstaan hebben alleenlijk gezegd te zijn van zodanige wonden, welke door haare hoeken en lippen in geene mogelijkheid, door de andere hegtingen, bij een gevoegd en gehouden kunnen worden: de ondervinding levert van zodanige gevallen genoegzaame en volledige bewijzen op. — Dan, wij moeten ook herinneren, dat hegtingen met de naald in deze deelen spaarzaam, en zo het wezen konde, nooit, dan na eene vrugtelooze pooging der drooge hegting, ondernomen wierden. — De Heer PIBRAC verhaalt in de *Memoires de L'Academie Royale de Chirurgie tom III.* onder veele andere gewigtige waarnemingen, betreklijk de hegtingen, ook dezen: dat naamelijk de hegtingen met de naald, in doorgaande Buikwonden, veel toevallen veroorzaakten, en minder spoedig genazen, dan wanneer dezelve door de drooge hegting en het vereenigend verband behandeld wierden. — Zelfs was dit

In het algemeen zijn de drooge hegting en de behoorlijke houding van het gewonde deel genoegzaam om de grootste wonden te vereenigen, gelijk de dagelijksche ondervinding zulks leert.

De ondervinding en eene menigvuldige waarneeming hebben mij zedert dertig jaaren alle hegtingen met de naald, om wonden te vereenigen, leeren verwerpen (*d*), en ik heb, in plaats van deze pijnlijke en dikwijls van kwaade toevallen verzelde middelen, die verkozen, van dewelken ik thans gesproken heb, en de schriften van beroemde oefenende Heelmeesters hebben mijn gevoelen bevestigd (\*).

blijkbaar in zodanige gevallen, waar in de Keizerlijke Snede werkstellige was gemaakt. ]

(*d*) [ Wij kunnen niet afzijn, tot meerder staaving van des auteurs gezegdens, de taal van den beroemden GESSCHER hier plaats te gunnen. — „ Wij kunnen, zegt hij, „ den schaakel deezer voorbeelden niet beter afbreken, „ nog de uitgebreide nuttigheid der daar in aangepreezen „ hegting, meerder bekragtigen, dan door aan te merken, „ dat de Heer LE BLANC verzeekert, zig daar van, staande een tijdkring van meer dan dertig jaaren, altoos met „ een goed gevolg bediend te hebben; en dat wij zelve, „ in eene konstoeffening van ruim twee en twintig jaaren, „ door ons inzonderheid daar van te bedienen, nog geene „ wonde hebben aangetroffen, waar bij wij verpligt waren, „ van de Naaldhegting gebruik te maaken.” *Hedendaagsche oefenende Heelkunde*, deel 3. bl. 66. ]

(\*) Behalven de aanmerkingen van onzen schrijver en van den heer VALENTIJN, leeze men ook de verhandeling van den heer PIBRAC *sur l'abus des sutures*. *Memoires de l'Academie Royale de Chirurgie* T. IX. p. 1. 12. CLARE in *Samml. für Wundärzte*, IV. Stück S. 144. en RICHTERS *Anfangsgründe der Wundarzneijk.* I. Band. S. 162. u. ff. over de vereeniging der wonden. In de geschiedenis en proeven van het heilkundig privaat genootschap te Koppenhaage, in 1774, in 8°. gedrukt, vind men eene waarneeming van



het geneezen eener wond der slaapspier enkel door hegt-plaasters en compresen van den heer TRÖSTER. In zekere gevallen, als in eene darmhegting en de verëeniging van eenen haazenmond, in wonden van den neus, der ooren, der lugtpijp, der borst e. z. v. [zie bl. 2. in de noot.] kan men de bloedige hegting niet altijd vermijden. — De heer DEFAULT te Parijs heeft onlangs de fraaiste proeven over de vereenigen der bewerktuigde deelen gemaakt, en het is te bejammeren, dat wij zijne waarneemingen over de vereeniging der huid, spieren, vaten en zenuwen nog niet te leezen hebben gekregen. Hij sneed spieren van eenen hond twee duim diep door, genas de wond, doodde het dier en toen hij het met wasch opgespuut had en vervolgens ontleedde, vond hij, dat wel de huid, maar niet de spieren zig vereenigd hadden. Zo vond hij ook in geheelde buikwonden het buikvlies en de buitenhuid vereenigd, terwijl de vaten der buikspieren in tegendeel nog niet vereenigd waren. Ik hoop, dat wij deze gewigtige waarneemingen eerstdaags in de *Memoires* zullen leezen. Van de schadelijkheid der wieken in de vereeniging der wonden schrijft LE CAT in het *Recueil des pieces, qui ont concouru pour le prix de l'Academie Royale de Chirurgie*, T. I. p. 109. 12. L. [De waarneemingen van den heer DEFAULT door den beroemden LUDWIG hier bijgebracht, steunen niet alleen op deze gemaakte proeven; maar worden ook door eene gezonde lichaamskunde aanneemlijk gemaakt: want door de drooge hegting, schoon ondersteund met het vereenigend verband, word wel de huid of uitwendige bekleedzelen der wond aan elkanderen gebracht en gehouden, doch geenzins het middenste onderste spieragtige gedeelte derzelve, dat altoos door deszelfs terugtrekkende kragt gewoon is te verwijderen. Het welke men egter door de bloedige hegting, in vereischte gelegenheden, kan te gemoet komen: als door welke de middendeelen der gescheiden wond, zo wel als derzelver buitensten omtrek bij elkanderen kunnen gebracht en gehouden worden tot eene volkome geneezing.]

## TWEEDE HOOFDSTUK.

*Van de vereeniging der Peezen.*

**W**ANNEER de pees van Achilles [*tendo Achillis*] gedeeltelijk of geheel gescheiden is, moet men den voet en het been in de houding brengen, welke wij voorgeschreven hebben, om de dwarswonden der kuiten te vereenigen [bladz. 8.] en ze door denzelfden band in dien stand houden. Om de beide einden der pees wél aan elkander te brengen, moet men ze te deeg over elkander leggen en het eene eind nauwkeurig aan het andere passen; om egter te verhoeden, dat zij niet verschuiven, leg ik op de wond twee kleine reepen van Engelsche plaaster en een zagt dotje van ruuw plukzel te weêrzijden en omwind het geheele deel met eenen vereenigden band.

De natuur moet dan werken, en de gekwetste pees vereenigen en als zamenfmeeden; en hier vertoont zij zig bekwaamer dan de kunst. Maar de Heelmeester moet zig ook met alle mogelijke zorgvuldigheid wagten, dezelve slegts in het minste te hinderen. Te dien einde moet de band, welke dient om den voet uittestrekken en het been te buigen, zo vast niet aangelegd worden, dat hij den lijder drukt. Eene onbekwaame houding zou den lijder ook zeer in zijne rust hinderen. Het is genoeg, wanneer de band alleenlijk zo vast aangelegd is, dat men van de onagtzaamheid des lijders niets te vreezen heeft, op dat niet

mischien eenige bewegingen de aaneen gevoegde einden der pees van elkander verwijderen.

Het gebeurt zelden , dat de pees van Achilles door eene geweldige beweging geheel gebroken word; een gedeelte van derzelver vezelen geeft gemeenlijk meê en verlengt zig, en ik heb lang getwijfeld , of eene geweldige beweging wel eene volkomen scheuring van dezelve kan veroorzaken. Verscheiden onderzoekingen , bij dewelken de Heelmeesters beweerden , dat deze pees gebroken was, schoon de lijder slegts eenen valschen tred gedaan had, en ik hun aantoonde, dat alleenlijk de koker van dezelve aan stukken was, hebben mij in die twijfeling gebragt. Doch één voorbeeld heeft mij van de mogelijkheid van dit geval overtuigd (e).

Een sterk levendig manspersoon van veertig jaaren, welke zeer sterke zenuwagtige kuitspieten had, speelde met den bal, en na dat hij ee-

(e) [ Er is thans geen twijffel meer aan , dat de Pees van Achilles door een min of meer gewigt van zwaarte , welke de lichaams linie in een bijzonder tijdperk op dit deel maakt , kan breeken. — Te meer is dit blijkbaar , wanneer wij in aanmerking neemen , de werkdaad en het vermogen , 't welk deze Pees oefent , in een tijdstip als de geheele kragt van het lichaam zig bijna alleen op dezelve vestigt; b. v. als door springen , vallen of wat in staat zij dit deel in zijne grootste werking van inspanning te brengen , 't gewigt der kragt onverwagts op den navoet of de toonen nederkomt , moet noodwendig volgen , dat door de spoedige en onverwagte tegenwerking , dit gespannen deel scheuren of geheel verbreeken zal. — De waarneemingen getuigen , dat in zo een geval , zelfs het Hielbeen ( door dien de kragt van de Pees waarschijnlijk de zamenhang van het zelve overtrof ) gebroken is. ]

nen bal gefchoten had, rigtte hij zig op en deed eenen fprong met den regten voet; oogenbliklik voelde hij eene geweldige pijn in den hiel, en het was hem, als of hem iemand van agteren op deze plaats eenen flag met eenen ftok had gegeven. Toen ik daar bij geroepen werd, vond ik, dat de pees van Achilles aan ftukken was, en dat nog een klein gedeelte aan het hielbeen en aan de groote pees vast hong. Ik vermoedde in het eerst, of dit klein gedeelte niet de kleine pees ware, welke met de pees van Achilles afloopt en tot de fpijter der voetzool behoort: toen ik het egter nauwkeurig onderzocht, befpeurde ik, dat dit peezig gedeelte in de daad tot de pees van Achillis behoorde. Ik lei derhalven het voorbefchreven verband aan, en de lijder werd geneezen en kan tegenwoordig weêr volkomen wél gaan.

Ik heb zedert de plaats, waar de pees gebroken was, weêr onderzocht en bevonden, dat dezelve op deze plaats een' langen knobbel van omtrent twee vingeren breed gevormd had, welke veel grooter was, dan de pees zelve is. Zo heb ik ook de vereeniging van eene pees van Achilles van den voet onderzocht, welke met een timmermans diffel geheel doorgesneden was, en die ik ook op dezelfde wijze vereenigd had. Hier vond ik ook eenen knobbel, doch hij was niet volkomen zo dik en uitgezet als die, welke ik aan de pees waarnam, die gebroken was geweest.

Volgens deze waarneemingen ben ik volkomen overtuigd, dat noodzaaklijk aan elke gebroken of doorgesneden pees een knobbel moet overblijven. Deze knobbel is een vast kenteken van eene gebroken pees, want het is niet mogelijk, dat eene



pees gelijk de tendo Achilles is, of de sterke band der knieschijf, welke aan de verhevenheid van het scheenbeen vast is, na dat dezelve aan stukken is, zig zou kunnen vereenigen, zonder dat er een knobbel overblijft, gelijk onlangs een Heelmeester wilde beweeren (*f*).

De ondervinding heeft mij verder geleerd, dat de koker van de pees van Achilles kan breeken, zonder dat de pees zelve zig van een scheid; maar mij is geen geval bekend, waarin de pees gebroken was, zonder dat aan de koker hetzelfde was gebeurd. Ik kan ook nauwlijks gelooven, dat dit zou kunnen plaats hebben.

Men heeft zeer dikwijls den gebroken koker voor de gebroken pees gehouden. De holligheid, welke men vind ter plaatze, daar de koker gebroken is, en in dewelke men een' vinger kan leggen, heeft veele Heelmeesters misleid; wij! de einden van den gebroken koker, doordien zij opzwellen en naar beneden en naar boven trekken, zig zamen rollen, en een klein gezwelmaaken, het welk eene tuschenruimte laat, waarin men eenen vinger kan leggen.

Om verzekerd te zijn, of de pees in de daad aan stukken is, moet men met de eene hand tegen

(*f*) [Onlangs hadden wij gelegenheid, een man te ontleiden, bij wien in zijn tijd de Pees van Achillis gebroken was geweest, en vonden ter plaatse dezer geheelde breuk een eeltachtig lichaam, even als men bij de verëninging der gebroken beenderen waarneemt. Dit deed ons besluiten om te gelooven, dat de zamengroeiing der Peezen met die der beenderen evenaart; dat is: door uitstorting van een voedend lijmend vogt, en uitbotting van waare vezeltepeltjes, welke alle in en op elkander pakkende, vereenigende den waaren Callus voortbrengen.]



de zool van den voet drukken , en de toppen van de vingers der andere hand in de holte over de pees leggen ; als dan den lijder den voet doen uitsprekken tegen de hand , die de voetzool ondersteunt ; op het oogenblik nu , dat de kuitspijeren zig zamentrekken , verzekert men zig door de vingers , welken men in de holte heeft gelegd , of deze pees gebroken zij of niet. Zo de koker alleen aan stukken is , bespeurt men in hetzelfde oogenblik de spanning der pees ; maar zo de pees zelve aan stukken is , voelt men deze spanning niet. Voor het overige , wanneer beiden , de koker en de pees , aan stukken zijn , is de holte veel aanmerklijker , en de beide kleine verhevenheden , welken door de gebroken einden ontstaan , zijn zo verheven niet. Deze aanmerkingen heb ik aan de ondervinding en waarneeming te danken.

Als de koker slegts aan stukken is , word de oplettendheid des Heelmeesters zo zeer niet vereischt , als wanneer de pees zelve gebroken is. Het is derhalven wezenlijk noodzaaklijk , deze beide gevallen wél te onderscheiden , om beiden behoorlijk te behandelen.

Alle overige peezen moeten op dezelfde wijze vereenigd worden. De bloedige hegting , waar van de ouden zig in zulke gevallen bedienen , moet geheel verworpen worden (g)

De

(g) [ De beroemde Leidsehe Handartz A. BALTHAZAAR merkt te regt aan , dat de bloedige hegting in peezen niet altoos vermijdelijk is. — De ondervinding leerde hem , dat bij de geheele doorsnijding van de uitsprekkende Pees des wijsingers , bij de nahand , de twee einden dezer doorgekapt Pees wel bij elkander konden gebragt ,

De ouden begingen nog eene dwaaling, welke men den laateren in geenerlei wijze kan vergeeven; zij sneden namelijk eene pees, die slegts op de helft of ten deele doorgesneden was, met het snijdende werktuig, waar mede de wond was toegebragt, geheel door, om, zo zij zeiden, de toevallen te verhoeden, welken zij van de onvolkomen kwetzing der pees vreesden. (b) (\*).

maar niet regtlijnig tegen elkanderen gehouden worden. —

„ Ten eerste (zegt hij) om dat soortgelijke smalle  
„ Peezen te weinig lighaam hebben, en te los leggen; en  
„ ten tweede, om dat ik ten aanzien van de kneuzing [die  
„ hier bij was] geen gebruik kost maaken van een nood-  
„ zaaklijk stijf verband, en een gedwongen uitgestrekte ge-  
„ stalte der vingeren.” e. z. v. — Uit dien hoofde  
vond hij zich verplicht, eene tussehen geknoopte heg-  
ting te leggen; en welke ook, zonder toevallen te veröör-  
zaaken, den vinger spoedig in zijnen vorigen stand herstelde. Zie *Heelkundige Waarneemingen* bladz. 107. en volg.

Hier uit ziet men, dat 'er zomwijlen gevallen kunnen voorkomen, waar in men zig niet altoos aan den voorgestelden regel zonder uitzondering houden kan.]

(b) [Wij verwonderen ons, dat dit gevoelen ook nog zo algemeen van veele der hedendaagsche Heelmeesteren aan hunne Leerlingen word voorgesteld. — Immers buiten bijzondere omstandigheden is dat nimmer aan Peeskwetzingen nodig. De buiging en in rustbrenging van het gekwetste deel doen zo veel, ja meer af, dan de geheele doorsnijding zelve.]

(\*) In de *Essays and Observations, read before a Society in Edinburgh*, Vol. I. p. 450., alwaar ALEXANDER MONRO zijn eigen geval en het gevoel der pijn beschrijft, welke de lijder ondervindt in de breuk dezer pees, vindt men voorbeelden van de breuk der Achillespees, welke door hegting, door banden, of gepaste werktuigen geneezen werd; gelijk ook in het *Discours historique & critique sur le traité des maladies des Os de feu Mr. Petit par Louis*, 8. p. 20. in *Cases and practical Remarks in surgery by Benjamin Gooch*,

## DERDE HOOFDSTUK.

*Van de vereeniging der wonden van de tong.*

DE overleden FIBRAC liet zijne gedagten gaan over de middelen om de wonden der tong, zonder de bloedige hegting, te geneezen, en bedagt het eenvoudige werktuig, van het welke hij in het derde deel der *Memoires de l'Acad. Royale de Chirur.* (volgens de uitgaaf in kwarto) eene beschrijving en afbeelding gaf.

Een timmerman viel agterover van een hoog gebouw midden in eenen kalkkuil, zo dat hij niet het minste uitwendig letzel kreeg. Toen men hem wegbragt, bemerkte men, dat hij uit den mond bloedde. Een opperman, welke ont-

*London 1758. p. 71.*, welke met het werktuig van PETIT, verbeterd door MONRO en LOUIS, twee lijders genas, bij de welken de Achillespees gekwetst was. OLOF AKREL, verhaalt een dergelijk geval. Zie *Richters chirurg. Bibliothek* II. S. 27. en in *chirurgischen Vorfällen übers. von J. A. Murray*, II. Band. S. 373. Gött. 1777. 8; verder verhaalt VILDE' *Journal de Medecine*. Tom. I. Août. 1778. een geval. In de *Verhandelingen uitgegeven door de Hollandfche Maatschappij der wetenschappen te Haarlem vijfde Deel*, 1760. bl. 311. vind men eene zeer fraaije verhandeling over deze stof, waar van de heer J. VAN DER HAAR de fchrijver is. De *Disf. de tendine Achillis disrupto et arteriis in osseam substantiam degeneratis* Præs. J. A. KULMUS Resp JO. JAC. KNAPE Gedani 1730. vinden wij in de *Hallerifchen collection T. V.* De heer WIJNANTS verhaalt eene genezing der onderste pees van de voorste rechte scheenbeenspier, in de *verhandelingen*. e. z. v. VIII. bl. 464. Men zie ook *commentar. Bononiensi.*, Tom. V. P. II. L.

dekte, dat zijne tong twee derden van derzelver breedte tegenöver den tongriem van een gescheiden was, zo dat de punt uit den mond hong, maakte zig reeds gereed om het afgeschieden stuk met eene schaar af te snijden. Doch een ander verzette zig daar tegen en bragt den lijder naar huis. Waarschijnlijk viel onder het neêrstorten van dezen ongelukkigen door den schok en eene onwillekeurige beweging zijne tong uit den mond, terwijl hij op het zelfde oogenblik de kaaken schielijk op elkander, en de tong, welke tuschen de tanden was, door beet. Twee derden van de breedte der tong was slegts doorgebeeten, wijl in de beide kaaken op dezelfde zijde eenige tanden ontbraken, waar door eene opening was gebleeven, welke het gedeelte der tong, dat op die plaats kwam, behield.

Na dat men deze wond twaalf dagen lang verwaarloosd had, verzogt men mij, den lijder te bezigtigen. Ik vond, dat dit stuk tong gezwollen uit den mond hong, de wond was week en met een sponsagtig week vleesch, dat tot versterving neigde, overtogen. Ik wiesch hem den mond met laauwen wijn; riep verscheiden van mijne kunstgenooten bijeen; maakte den kinband van PIBRAC gereed en begon in hunne tegenwoordigheid de operatie. Ik nam met de linkehand de tong en hield dezelve vast met de vingers, met de rechte hand schrabde ik met een lancet, dat ik met een bandje aan deszelfs schede vast gemaakt had, de lippen der wond en nam met eene kromme schaar de sponsagtige week vleeschdeelen weg, en op deze wijze maakte ik eene nieuwe versche wond, welke zo



mengroeijen en zig vereenigen kon. Hier op lei ik den kinband van PIBRAC aan, welks banden ik met spelden aan de muts van den lijder vast maakte. Door dit werktuig werd het afgescheiden stuk der tong op het naauwste aan het deel der tong, daar het van afgesneden was, gebragt en vast gehouden. Den volgenden dag gaf de lijder mij te verstaan (want hij kon niet naar behoren spreken), dat dit werktuig hem niet gemakkelijk genoeg was; dat deszelfs buiging onder de kin de verhevenheid der lugtpijp, als hij het hoofd slegts een weinig vooröver hield, drukte; hebbende zulks hem gehinderd en den ganschen nacht het slaapen belet; ook zag ik van zelven, dat deze kleine zak de wond niet volkomen bedekte. Dewijl ik dus begreep, dat het maakzel of eigenlijk de vorm van dit werktuig oorzaak van dit ongemak was, maakte ik ten eersten een ander van ijzerdraad, doch in plaats van het gedeelte onder de kin zo te draaijen, gelijk aan den kinband van PIBRAC, draaide ik hetzelfde zo, dat deszelfs holte, als het werktuig aangelegd was, zig ter zijde om de lugtpijp omhoog. Zie C. op de I. plaat, fig. 2.

De kleine beurs bedekte de wond ook niet geheel, wijl zij aan den tongriem stiet; ik maakte derhalven eene kleine uitsnijding in het onderste gedeelte van dezelve (zie B. fig. 1.), zo dat de tongriem, als het werktuig aangelegd was, genoegzaame ruimte behield, de zak de tong naauwkeurig over de geheele wond insloot en dezelve volkomen bedekte. Ik lei daarop dezen kinband aan en de lijder had er niet het minste ongemak van. Het gezwollen deel der tong, in



den kleinen zak bevat, flonk van dag tot dag, zo dat ik genoodzaakt was eenen kleineren aan te leggen, en mij om der zindelijkheid, gedurende de geneezing, driemaal, namelijk den derden, den zevenden en den tienden dag van eenen anderen te bedienen. Den twaalfden dag nam ik den kinband weg. De punt der tong, welke reeds versterking dreigde, in diervoege in den kleinen zak belloten, tegen het afgebeeten deel der tong gericht, door den kinband in den mond gehouden en door het speekzel bevogtigd, won, om zo te spreken, deszelfs leven weder en groeide op die wijze weêr volkomen zamen.

Deze waarneeming leert, dat zelfs eene verwaarloosde wond, welker lippen met wild vleesch bezet zijn, nogthans door middelen, welken de kunst daartoe voorschrijft, kan vereenigd worden, en dat men ze niet moet behandelen als eene wond, die reeds tot verettering overgegaan is.

Deze kinband met deze geringe veranderingen heeft mij in staat gesteld om een geheel bijzonder ongemak der tong te geneezen.

De dogter van eenen mandenmaker te Orleans, welke zeventien jaaren oud was, werd in haar derde jaar door eene stuipziekte aangetast, in dewelke de tong haar zo sterk ten monde uitdrong, dat zij dezelve niet weêr kon terug halen. Zij was gedurende veertien jaaren aan dit ongemak onderhevig.

Ik werd in grasmaand 1772 bij haar ontboden. Ik vond haare tong drie vinger breed uit den mond hangen, zij was meer dan twee vinger dik, vertoonde een' mismaakten klomp en was

met zeven of agt kleine zweeren bezet, om dewelken eene zwarte korst gezet was; ook ontdekte ik van onder drie of vier gezworen uitsteekzels. Het gezigt van dit meisje verschrikte elk.

Na dat ik dit ongemak met alle naauwkeurigheid onderzocht en mijne gedagten had laten gaan, hoe hetzelfde zou kunnen weggenomen worden, begon ik mij te verbeelden, dat, wanneer de tong in eenen kleinen zak van fijn linnen werd besloten, in den mond gebragt en een' tijd lang door den kinband daar in gehouden kon worden, de gezwollenheid van dezelve mogelijk zou verdwijnen; dat de spieren, welken de tong terug en tegen het gehemelte trekken, en zedert veertien jaaren te zeer uitgezet waren, derzelver kragt allengs zouden kunnen weder bekomen, en dat het speekzel, hetwelk de zweeren dan geduurig zou bevogtigen, alleen in staat zou kunnen zijn, dezelve te zuiveren.

Met deze gedagten ten volle ingenomen, maakte ik van papier het modél van eenen kleinen zak over deze tong, om dien over dezelve aan te leggen, en wel zo, dat deze zak noch te groot, noch te klein zou wezen. Toen het werktuig gereed was, lei ik het aan, nam den band des avonds en des morgens af, om den kleinen zak te waschen en van de vuiligheid, die uit de zweeren kwam, te zuiveren, en liet den mond telkens met wijn waschen en uitspoelen. In vier dagen nam de gezwollenheid der tong af, de zweeren begonnen zig te zuiveren en de spieren kregen haare veerkracht weder, zo dat ik den vierden dag den kinband weér kon afdoen, en denzelven

niet weêr behoefde aan te leggen. Van dien dag af kwam de tong niet weêr uit den mond.

De vier snijtanden der onderkaak, welken van het derde jaar af in het geheel geen nut gedaan hadden, wyl de tong dezelve altijd bedekt had, waren met eenen geelen wijnsteen overtrokken en bedekt. De tong, zedert veertien jaaren gestadig uit den mond gehangen hebbende, had allengs de tanden omgebogen, zo dat, zedert dat de tong niet meer over dezelve hong, zij onder de onderlip stonden, voornaamlijk wanneer de lijderes den mond wilde toedoen, zo dat zij de binnenzijde der lip drukten, pijn veroorzaakten en verhinderden, dat zij dezelve niet tegen de bovenlip kon beweegen. Om dit ongemak weg te neemen en de onderlip aan de bovenste te brengen, moesten deze vier tanden uitgetrokken worden, want anders zoude de mond altijd open gestaan hebben.

Zedert dat de tong niet meer uit den mond valt, maar er binnen blijft, heeft zij bijna haare natuurlijke grootte weer bekomen; en zedert dat ik de tanden heb laten trekken, sloot de onderlip ongehinderd aan de bovenste en men ziet niets meer van die wanstaltigheid, welke het meisje te voren zo zeer misvormde. (i).

(i) [’Er zijn van vroeger en laater tijden verschillende waarneemingen betreklijk dit laatste onderwerp gedaan, getuigen hier van zijn: GALENUS, VALESIUS, RIVERIUS, FORESTUS, SLEGEL, LOUIS, TRIOEN, SPÖRING, VAN SWIETEN en meer anderen. Doch de behandeling daar van was veelal zo verschillend als gebrekkig. Meestendeels liet men deze Lijders hulpeloos worstelen; zomwijlen zig alleenlijk vergenoegende, de uithangende tong met een Koker, Beurs-

Ik heb den kinband, van denwelken ik boven gesproken heb, aan den heer FIBRAC getoond, en deze

je of iets diergelijks te omhangen; dan wel eens gebruikte men scherpe en zamenirekkende middelen; veelal sneed men het uithangende eind tot tusschen de tanden weg, 't welk zomwijlen gelukkige, dan meestal slegte gevolgen had. Doch deze eeuw, die de moeder van veele nuttige ontdekkingen is, heeft hier in voorzien. Onze Schrijver slaagde reeds met zijnen verbeterden Kinband; en tot genoegen van alle waare konstöeffenaars, heeft de geleerde J. VAN DER HAAR in de *algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen*, deel 4. n. 14. bladz. 564. en volg. als ook in het 6. deel n. 6. bl. 241. zeer beredeneerende Waarneemingen over de Oorzaaken, Behandeling en Herstelling van dit onderwerp medegedeeld.

Wij neemen de vrijheid deszelfs behandeling, die ons alleruinnemendst wel voorkomt, hier woordelijk plaats te geeven: „ Ik nam een bierglas, zegt hij met geurigen Moezelwijn, die voor de hand stond, mengde daar onder een „ raauwe doijer van een hoenderēi, en daar in een zwagteltje ter lengte van eene elle, en twee vingeren breed, „ genat hebbende, omwond ik dit, redelijk stijf, om de „ tong [in aanmerking nemende, dat de tong merklijk dikker en breeder *buiten*, dan *binnen* den mond was]. „ Wijders deed ik een strookje linnen van op het hoofd „ tot overde ooren afhangen, nemende daarna een tweede „ stuk, twee duimen breed, het welk ik meest van „ onder en van voren tegen de tong lei, en op het „ achterhoofd vastknoopte; liggende daar mede de tong, „ bij wijze van een schortband, eenigzins in de hoogte en „ in den mond. En op dat deze band niet verschuiven „ mogt, knoopte ik de afhangende einden, over de ooren, „ boven op het hoofd vast; het welk den lijder in de eerste „ minuten wel eenig ongemak scheen te baren, dan „ dit was ras gedaan. Wijders deed ik den zieken altoos „ op den rug en met het hoofd zeer laag liggen; slikkende „ zo alle kwijl of speekzel naar de maag. En om zulks „ meer en meer te bevorderen, gelaste ik zijne vrouw, dat „ ze het zwagteltje om de tong, alle quartier-uurs, met twee



groote Heelmeester heeft de verandering, die ik er aan gemaakt heb, volkomen goedgekeurd en mij geraaden, denzelven openlijk bekend te maaken.

---

## VIERDE HOOFDSTUK.

### *Van de Operatie der haazemonden.*

**M**EN zal zelden eenen haazemond vinden, die niet op dezelfde wijze, als de wonden in het algemeen, vereenigd kan worden.

Om een' aangeboren haazemond te geneezen, moet men de volgende toebereidzels maaken: voor alle dingen moet men twee ronde plaasters hebben ter grootte van een guldenstuk van Engelsche taf; aan elke van dezelve maakt men een tongvormig stukje linnen vast, het welk drie of vier duim lang is, en zo breed kan zijn als de nagel van den kleinen vinger, verders eenen tweehoofdigten zamengerolden band van twee of drie ellen lang, en even zo breed als de aangezette stukjes linnen, twee dikke vierkante compressen en eenen kinband. Als men het voorschrift van LOUIS wil volgen, en de einden van den haazemond snijden,

„ of drie theelepeltjes Moezelwijn en een doijer van een  
 „ Ei, langs de bovenlip, moest bevochtigen, en hem tot  
 „ het nederflikken aanzetten; als mede, nu en dan, den  
 „ tongschortband, agter op het hoofd, een weinig aan-  
 „ sluiten, zo als geschiedde.” e. z. v. Door deze ma-  
 nier van behandeling is eene tong, die meer dan twee dui-  
 men lang buiten den mond hong, in een tijdkring van  
 minder dan twee dagen, binnen den zelve terug ge-  
 bragt.

moet men zig van een stukje gefneden bordpapier voorzien, het welk zo gebogen moet zijn, dat men het tusschen de tander en de lip kan brengen, op dat het tot een rustpunt kan dienen voor het mesje, waarmede men de randen zal afsnijden.

Als men de nodige toebereidzels gemaakt heeft, legt men de beide plaasters op de wangen, zó, dat de beide tongvormige bandjes onder den neus kruislings over elkander kunnen komen, ten einde dezelve op de wangen vast te kleeven. Voor dat men de plaasters aanlegt, moet men dezelve, om ze aan de huid te kleeven, gelijk ook de daar aan vast gemaakte bandjes, met de tong vogtig maaken. De helper, welke agter den lijder moet staan, vat het hoofd met beide handen, en drukt met de vingers de wangen naar voren, brengt op deze wijze de randen van den haazemond bij elkander en verlengt de kaakspieren en de groote jukbeenspijeren zodanig, dat zij niet zamen en de beide hoeken der lip, aan dewelken zij vast zijn, agterwaard trekken kunnen.

Als men de operatie met het mes wil doen, zo als LOUIS (\*) die voorschrijft, legt de Heelmeester een stukje bordpapier tusschen de tanden en de lipen brengt met den duim en voorsten vinger der linke hand het eene stuk van den haazemond over het bordpapier, spant het hier over uit en trekt het een weinig naar beneden; met de regte hand, in dewelke men een welsnijdend mesje

(\*) Men vind de verhandeling van den heer LOUIS in de *Memoires de l'Academie Roy. de Chirurgie* T. XII. p. 90. & Tom. XIV. p. 48. 12. L.

moet houden, drukt hij deszelfs punt in de huid en besnoeit den rand op het bordpapier, het welk tot een steunpunt van het snijdend werktuig dient, snijdende telkens van boven naar beneden (*k*). Het afgesneden stuk moet nog aan het middenshot van den neus blijven hangen, en hij moet het er niet van afscheiden, voor dat de afsnijding aan de andere zijde op dezelfde wijze geschied is. Op de andere zijde moet hij even zo veel afsnijden en hierop de beide kleine afgesneden stukjes wegneemen en zorg draagen, dat, terwijl hij ze wegneemt, de versche wond nauwkeurig in de bovenste vereeniging van den haazemond ingâ; want zonder dat zou zij zig niet vereenigen en er zou eene kleine opening blijven, door dewelke de lugt en het speekzel zou uitgaan, gelijk ik het bij een kind gezien

(*k*) [ Deze manier van afsnijding komt ons te ongeschikt voor. Wij verkiezen ook, gelijk de schrijver, het gebruik der schaar in deze operatie, doch om met den duim en vinger het einde der lip genoegzaam uittespannen, bekennen wij, met anderen, vrij moeilijk te zijn; dit is de reden dat sommigen een zogenaamd *toomtje* hebben uitgedagt, zijnde een gewaschte draad, welke zij door eene naald aan elken ondersten binnenhoek der gespleeten lipstukken doorhaalen, en door den draad naar zich toetrekken, deze deelen uittespannen, en dus uittespannende agter dezelve de randen wegsnijden: dan wijl deze wijze ook min of meer omstandig en pijnlijk is, vinden wij het gebruik der tangetjes door den heer HEISTER afgebeeld en door ULHOORN verbeterd, (zie *plaat 14. fig. 12 en 13 der Heelkundige Onderwijzingen*) hier toe merkelyk beter. Door deze heeft men een vast steunpunt voor de lip, en men kan dezelve in eene gelijke linie uittrekken, latende zo veel van den rand der lip overschieten als men nodig oordeelt, langs het tangje met de schaar weg te snijden. ]

heb, aan het welk men deze vereeniging niet behoorlijk uitgesneden en geneezen had. Het is derhalven in veele gevallen nodig, de zamenvoeging der kaak, daar zij in den natuurlijken staat aan de lip vereenigd is, met het mesje los te maaken (1).

Het is veel gemakliker het snijden der randen van eenen haazemond met de schar te onderneemen; want met het mes moet men dikwijls verscheiden sneden doen, om eene goede wond te bekomen, daar men hier in tegendeel maar eene snede met de schar doet.

De helper, welke de kaaken voorwaard drukt, brengt de lippen der wond aan elkander; als zij nu te deeg aan elkander gebragt zijn, neemt de Heelmeester de beide tongvormige bandjes, legt ze kruislings over elkander en kleeft ze ten eersten, het eene regts, het andere links, op de wangen of op de plaasters. Wanneer de beide bandjes niet voldoende schijnen te zijn, om de lippen der wonde behoorlijk aan elkander te houden, kan men er boven en onder nog smalle reepjes plaaster op leggen en ze te weêrzijden op de wangen of op de reeds gelegde plaasters vast doen kleeven. Alsdan neemt men den tweehoofdigigen band, legt het midden daar van aan den nek, laat elk hoofd van dezen band onder de ooren en over de wangen en plaasters heen gaan en

(1) [Het is niet alleen in *veele* gevallen, zo als onze schrijver bepaalt, nodig, de zamenvoeging van de bovenkaak met de lip los te maaken; maar het is eene algemeene vereischte in deze operatie: en het goed gevolg derzelve hangt niet zelden van eene genoegzame losmaaking dezer deelen af.]



legt ze kruislings over de wond. Door verscheiden omwindingen houd de band, op die wijze aangelegd, de bandjes, en belet het opsperren van de lippen der wonde, welke in zes, zeven of agt dagen geneest. Wijl deze band alleenlijk het verband moet zamen houden, behoeft dezelve dienvolgens niet te sterk zamengetrokken te worden. Men legt op elke wang eene dikke compres, welken men door den kinband, die aan de muts van den lijder gespeld is, vast houd. Deze compresen en kinband, wél aangelegd zijnde, houden de kaakspieren en groote jukbeensspieren vast, welken de helper uitspant door de wangen voorwaard te drukken, ten einde zij niet te zamen trekken en dienvolgens regts en links de hoeken der lippen, daar zij vast zitten, te rug beweegen zouden kunnen. Verders belast men den lijder zeer stil te zijn, en inzonderheid het lachen, niezen en veel spreken te vermijden (*m*).

Om eenen eenvoudigen haazemond te geneezen, heeft men niet eens den band nodig; de tongvormige bandjes der plaasters, een of twee reepjes van Engelsche plaaster, de compresen op

(*m*) [ De rust en stilte is altoos na de operatie en vooräl bij kinderen nodig. Deze kunnen door het lang en menigvuldig schreien niet dan ongeschiktheden aan het verband toebrengen. Wat betreft de kinderen voor de operatie een langen tijd rusteloos te houden, gelijk veelen willen, in hoop van kort na dezelve in slaap te geraaken, heeft zomwijlen geen gewenschte uitwerking; in tegendeel men heeft gezien, dat zij er veelmaalen lastiger en moeilijker door wierden: wij maaken dierhalven geene zwaarigheid met den heer GESSCHER, zie *oeffenende Heelkunde d. 3 bl. 212*, het voorzigtig gebruik der slaapmiddelen, kort *voor*, en nu en dan *na* het verrigten der operatie toe te staan. ]

de wangen en de kinband zijn gemeenlijk genoegzaam; egter kan men tot meer zekerheid ook den vereenigenden band aanleggen.

Bij eenen verschen haazemond heeft men alleenlijk een of twee reepjes van Engelsche plaaster, de compresen op de wangen en den kinband nodig, ten einde het opsperren te verhoeden en de vereeniging te bewerken.

Als men eenen aangeboren dubbelen haazemond wil behandelen, moet men, zo veel mogelijk, het middenste gedeelte zoeken te behouden en de randen van dit deel en de beide klooven, gelijk wij het boven bij de eenvoudige haazemondden aangewezen hebben, afsnijden, doch inzonderheid de beide bovenste vereenigingen zorgvuldig zamen vatten en derzelver vereeniging met de kaak door het mesje afscheiden. Aan de dubbele haazemondden is de operatie veel gemaklijker met de schar dan met het mes te doen.

Aan elke kloof der lip in eenen dubbelen of enkelen haazemond is gemeenlijk een klein gerond deel, het welk met een week fluweelhuidje bedekt is, gelijk dat, het welk de lippen befluit. Als men de randen wegsnijdt, moet men dit klein gerond deel ook wegneemen, anders blijft bij eenen vereenigden dubbelen haazemond op de rechte en linke zijde eene opening over, gelijk ik zulks dikwijls bespeurd heb, of bij eenen enkelen haazemond eene dergelijke kloof in het midden, welke het gezicht mismaakt.

In eenen dubbelen haazemond gebeurt het zeer dikwijls, dat het kleine middenstuk veeltijds in een klein afgerond deel eindigt, het welk de gedaante eener olijve heeft; wanneer men derhalven

dit middenstuk te weêrzijden afsnijdt, moet men ook tevens, zo veel mogelijk, dit afgerond deel wegneemen, anders blijft op beide zijden eene opening over, die eene wanfstaltigheid maakt.

Maar zomwijlen is ook het kleine middenstuk te kort, zo dat het met den rand der lip, aan dewelke men het aangelegd heeft, niet even lang blijft en zig naar het middenschot van den neus optrekt, hoe wél men de bandjes ook aanlegt. Om hetzelve in dit geval met den rand der lip in gelijke lijn te brengen en alleenlijk te beletten, dat het niet opwaard trekt, haal ik eene regte naald met eene tweesnijdende punt, die als een lancet gepunt en waar in een dubbele gewaschten draad is, dwars door het bandje, het welk ik onder aanleg; ik doorsteek hierop de lip, rijg het kleine middenstuk mede aan, en breng de naald op de andere zijde door hetzelfde bandje weêr uit. Ten einde nu deze hegting, welke in dit geval nodig is, vast te maaken, doe ik te weêrzijden de draaden van elkander en leg eene kleine rol van Engelsche plaâster tusschen dezelve, op dewelke ik met deze draaden den heelmeeesters knoop maak. Eenige dagen daarna snijd ik deze hegting af. Door deze behandeling kan het kleine middenstuk niet opwaard trekken en de rand der lip word regelmatig en gelijk (n).

(n) [Zomwijlen is het middenstuk zo klein en kort, dat, wanneer de beide zijranden wierden afgesneden, er bijna niets zoude overblijven: en dus de goede uitslag der operatie meer hinderlijk dan voordeelig zoude zijn. In zo een geval is men verplicht dit geheele middenstuk weg te snijden, en het ongemak als eenen enkelen Haazemond te behandelen.]



Op die wijze heb ik verscheiden dubbele haazemonden, welken aanmerklijk gespleeten waren, zo dat de randen, wanneer de lijder lachte, agtien lijnen van elkander stonden, gelukkig vereenigd (o).

In zeer veele dubbele haazemonden, die aangeboren zijn, en ook in de enkelen is de bovenkaak dikwijls door eene spleet, welke meer of minder breed is en zig van de snijtanden tot aan het gehemelte uitstrekt, gekloofd (\*). In dit

ge-  
(o) [De Heer L. HEISTER raad aan, dat men in eenen dubbel Haazemond eerst de eene, en deze genoegzaam geneezen zijnde, dan de andere zijde hereenigen zal. Zie de *disfert. de labris leporinis*. §. 50. Van dit gevoelen is ook de heer ULHOORN. Zie *aantek. op L. HEISTER's Heelkundige Onderwijzingen. d. 2 bl. 760.* — Dan wij verwonderen ons in de *Conspect. Chirurg.* van den beroemden JUNKER te leezen: *duobus in locis quando fissum est labium, vix unquam malum Curatur.* — Geevende zo veel als te kennen: „ dat eene lip aan beide zijden gespleeten, bijna „ nooit geneest.” Dit egter word niet alleen door veele waarneemingen tegengesproken, maar de dagelijksche ondervinding toont aan ieder Heelkundigen genoegzaam het tegendeel dezer gezegdens.]

(\*) Het gebeurt niet zelden, dat niet slegts de weeke spieragtige lip gespleeten is; maar dat ook de bovenkaak en het gehemelte van een gescheiden zijn. Hier van vind men veele voorbeelden waargenomen. Zie *Recueil periodique d'Observations de Médecine, de Chirurgie & de Pharmacie. Tom. I. Paris 1755. 8. p. 163.* ALBINI *annot. academ. Lib. IV. p. 57.* *Frankische Sammlungen IV. Band. S. 241.* *Nova Acta Acad. Cesareæ Nat. Curios. Tom. III. p. 161.* en meer anderen. Voornaamlijk leeze men hier over OLOF ACRELS *chirurgische Vorfälle, Erster Band. S. 47.* (een boek, het welk verdient elken Heelmeester ter leezing aanbevolente worden.) Ik zelf bezit in mijne Verzameling een Praparaat, daar behalven de uitwendige bovenkaak ook de beenderen van het gehemelte gespleeten zijn. L.



geval hebben gemeenlijk eenige tanden eenen kwaaden stand, welken men voor de operatie moet uittrekken.

De ondervinding heeft geleerd, dat, wanneer men aan eenen aangeboren haazemond bij tijds de operatie onderneemt, dat is te zeggen, wanneer men de vereeniging in de kindsche jaaren werkitellig maakt, de spleet in de kaak met den tijd vergroeit en dat de randen allengs elkander voeden; daartegen blijft deze spleet bij de geenen, aan dewelken men de operatie niet bij tijds onderneemt, altijd in denzelfden staat.

Ten einde het vergroeijen van de kloof in de kaak te hulp te komen, moet men, wanneer de vereeniging van den haazemond in de jeugd ondernomen is, wat de heer JOURDAIN (\*) ook daaromtrent mag zeggen, den band gebruiken, dien QUESNAT (\*\*) voorgeschreven heeft om den haazemond te vereenigen, welke voorzeker veel daar toe doen zal. Wij gelooven egter ook, dat het middel, het welk de heer JOURDAIN opgeeft, het vergroeijen kan te hulp komen. Het bestaat daarin, dat men twee baktanden, die namelijk, welken het naast bij de opgespleeten randen en tegenover elkander staan, met eenen gouden draad, die van den eenen tand tot den anderen dwars over het gehemelte moet gaan, omvat en

(\*) *Journal de Méd* 1773. Février.

(\*\*) Zie *Memoires de l'Acad. R. de Chirurgie*, III p. 195. 12. Deze band bestaat uit balein, welken QUESNAT rondom het hoofd en den nek brengt, en welks einden hij voor over den haazemond door eenen vereenigenden band vast maakt. L.

allengs meer zamentrekt. Maar om deze spleet volkomen te sluiten en zamen te brengen, en door dit middel het onaangenaame in de uitspraak, het welk deze spleet veroorzaakt, weg te nemen, moet men de randen van deze op die wijze aan elkander gebragte spleet scherven. Door deze operatie zal de natuur ze vereenigen en zamenkleeven, gelijk DE LA FAYE reeds voor lang waargenomen heeft (p).

De haazemond der onderlip word op dezelfde wijze vereenigd.

Na het wegneemen van een kankerächtig gewas van eene lip kan men zig ter vereeniging der wond van dezelfde middelen bedienen, waarvan ik verscheiden waarneemingen gemaakt heb.

Alleenlijk moet men deze wijzen van behandelen overeenkomstig de verschillende foorten van haazemonden afwisselen.

Behalven de middelen, van dewelken wij thans gesproken hebben, heeft VALENTIJN ons een werktuig aan de hand gegeven om de raaking van de lippen der wond, welken na de operatie van den enkelen aangeboren haazemond overblijven, te onderhouden, welk werktuig hij een haak noemt, en het welk als een band de randen der wonde, die in de aangeboren haazemonden altijd geneigd zijn zig te rug te trekken, zamen houdt.

(p) [Het leezen der verhandeling van den heer DE LA FAYE, in de *Memoires de l'Academie Roy. de Chirurgie*. verdient bij uitstek over dit stuk, als ook over de geheele Operatie van den Haazemond, onze aanprijzing. Zie ook de Néderduitsche vertaaling door J. TROUT, 2. st. bl. 233. en volg.]

„ Deze haak , zegt VALENTIJN , is uit twee  
 „ stukken zamengesteld , welken men door eene  
 „ schroef vast zamendrukt en zamengedrukt  
 „ houdt. Elk van deze stukken , welker armen ,  
 „ ten einde de drukking in de onderscheiden  
 „ punten gelijk zij , paralel zijn en welken men ,  
 „ om de drukking zagter te doen zijn , te deeg  
 „ met linnen moet overtrekken , omvat een ge-  
 „ deelte der gespleeten lip een vinger breed ver  
 „ van de wond , en eene schroef van een duim en  
 „ eenige lijnen lang vereenigt van onder de zamen-  
 „ rijpende deelen van het werktuig , welke de-  
 „ zelveu tegengesteld aan elkander brengt. Dus  
 „ brengt dit werktuig eene zachte en gematigde  
 „ uitspanning te weeg , past de wanden der won-  
 „ de behoorlijk aan elkander en houdt ze in eene  
 „ onmiddellijke raaking vast.

„ Door dezen haak , vervolgt VALENTIJN ,  
 „ bekomt men ook het voordeel , dat men den  
 „ lijster zo dikwijls , als de omstandigheden het  
 „ vereischen , kan verbinden , de deelen blijven  
 „ steeds in onmiddellijke raaking ; men kan zon-  
 „ der iets te hinderen , de poging der natuur , om  
 „ de deelen te vereenigen , onderzoeken : ook is  
 „ men op deze wijze niet in het geval om eene  
 „ wond verscheiden dagen open en in eenige  
 „ punten onvereenigd te laten. ” Dit gebeurde  
 „ mij met eenen haazemond , daar ik alleen den ver-  
 „ eenigingsband , welken LOUIS in de *Memoires de*  
*l'Academie* beschreven heeft , aanlei. Hier moest ik  
 „ er eenen draad door trekken en dien van de eene  
 „ zijde tot de andere over een stukje zamengerolde  
 „ Engelsche plaaster vastmaaken , gelijk ik dit boven  
 „ beschreven heb , om het te korte stuk van eenen

dubbelen haazemond in gelijke lijn met de lip te houden en het affchieten te beletten. Op die wijze vermijdde ik in dit geval den wanftal, welke van deze niet volkomen vereeniging zou overgebleeven zijn.

Er zijn ook nog meer bewijzen, dat men zig met goed gevolg van den haak van VALENTIJN bediend heeft, en de Akademie en de meeste Heelmeesters te Parijs zijn bij ondervinding overtuigd van de deugdzaamheid van dit werktuig in het geneezen van enkele aangeboren haazemon-

den. Deze bekwaame Heelmeester vereerde mij dit werktuig, en ik oordeelde, dat het nog verbeterd kon worden. Wijl het geheel van ftaal gemaakt is, hield ik het voor beter, het van zilver te laaten maaken, en ten einde de drukking, die de beide zig zamennijpende ftukken maaken, des te zagter zij en minder kwetze, heb ik elken arm met een klein ftuk bereid eikenzwam laaten overtrekken, het welk ik met vaste lijm, omtrent eene lijn dik, op elken arm van het werktuig vast gelijmd heb. Dit ftukje zwam, welk ik in plaats van het linnen, dat VALENTIJN tufchen de lip en den arm van het werktuig laat leggen, gebruikte, is wegens deszelfs buigzaamheid zagter, dan het linnen kan wezen. Men zie hier over na de befchrijving der 9 afbeelding op plaat IV. (\*).

(\*) De haak van den heer VALENTIJN komt ons te zeer zamengefteld voor en te weinig te belooven bij de heeling. Ongeägt LOUIS, FERRANT (*Disf. de labio leporino. Paris 1771. 4.*) en meer anderen alle haazemonden door de enkele vereeniging zonder hegting onderneemen te verbinden, dunkt ons egter, dat de ondervinding van BERTRANDI,



## VIJFDE HOOFDSTUK.

*Van het wegneemen der Beurs- knoest- en kankeragtige gezwellen.*

**D**E beursgezwellen, die men het meest pleegt wegteneemen, zijn die aan de knie (*q*). De meeste Heelmeesters maaken eene kruisfnede op het gezwel en de hoeken los, en ligten den zak er uit. Doch hier van is het gevolg, dat het lidteken, het welk daar uit ontstaat, langen tijd nodig heeft, voor dat het geheel geneezen is en vast houd, en als het reeds toegeheeld is, hindert het nogthans het buigen van de knie, springt open bij eene onverhoedsche en geheele buiging, gelijk dit in het vallen of bij het doen van eenen valschen pas kan gebeuren: met één woord, het

OLOF ACBEL en anderen dit genoegzaam weerspreken. Nu en dan kan het wel plaats vinden, maar in zeer veele gevallen zal de omgewonden heging voorzeker den voorrang moeten behouden. L.

(*q*) [Het gezwel, dat de Schrijver hier bepaalt, is bij de meeste Heelkundigen onder den naam van Boongezwel (*Lupia*) bekend. En welk soort van gezwellen in de Slijmbeurzen der gewrigten meestál hunne zitplaats hebben; voornamelijk aan het gewrigt van de Knie, de Dije, den Voet, den Schouder en den Elleboog. Doch zo het schijnt, geeft de Heer LE BLANC er hier een ruimer betekenis aan, en verwart dit gezwel onder de algemeene klasse der Beursgezwellen (*tumores tunicati*). Het weinig verschil egter, dat in de operatie van alle deze omkleede gezwellen gelegen is, is oorzaak dat men dezelve in dit Hoofdstuk onder den naam van Beursgezwel behouden heeft.]

blijft lang gevoelig en pijnlijk, wijl wij dikwijls genoodzaakt zijn, de knie te buigen.

Ten einde dit ongemak te verhoeden en deze beursgezwellen zonder vertoeven weg te nemen, maak ik eene maanswijze dwarsnede met een bol of uitgebogen incisiemes onder het gezwel, daar op maak ik twee anderen, eene van binnen, de andere van buiten de knie, langs de grondvlakte van het gezwel, beiden aan de einden der dwarsnede beginnende en zo naar boven gaande. Als ik nu de huid en het celswijze weefzel in den geheelen omrek weggesneden heb, maak ik de daar onder liggende beurs los van de plaatzen, daar zij aan de knieschijf en het celswijze weefzel houd, en legze terug naar boven naar de dije toe. Alsdan snijd ik steeds verder van onder voort, om ze aftezonderen, van de huid te scheiden en wegteneemen. Dan bedek ik de wond met dit stukje huid, en als het zelve te groot is, zo dat het over de insnede, voornaamlijk over de dwarsnede, heen gaat, het welke egter zelden gebeurt, snijd ik met het zelfde werktuig het overtollige af en schik het zo, dat de wond er nauwkeurig meê bedekt is. Men zou dit veel gemaklijker met de schaar kunnen doen, doch deze drukt de deelen te zeer en veroorzaakt te veel pijn, om aan het bolle snijtuig de voorkeur niet te geven, inzonderheid, wanneer de schaar niet wél geslepen is (r). Over dit opgelegd stukje

(r) [Wij zouden egter van oordeel zijn, dat een welgeslepen schaar, (en die men altoos moet gereed houden) tot het afsnijden der overhangende randen der huid, veel geschikter werktuig is, dan een uitgebogen incisiemesje: te meer, wijl onzes bedunkens, voor dit werktuig geen ge-

huid leg ik een lapje fijn linnen, dat slegts eenige lijnen over de insnede gaat, dit bedek ik van boven met zagt plukzel, op het welk ik nog eene genoegzaame hoeveelheid ruuw plukzel doe, zo dat het deel in alle punten even sterk en zagtlijk gedrukt word. Ik omwind den ganschen toefsel met eenen bekwaamen band en leg de knie dan zo tuschen de strooärmen, dat het been niet kan buigen, en laat er het verband zo lang om, als nodig is, om dit stuk huids aan te heelen en te vereenigen; vier of vijf dagen daarna, als het bloed door het verband gedrongen, gedroogd en hard geworden is, zo dat deze hardigheid den lijder hinderlijk is, snijde ik den band regts en links open, scheide alles, wat hard, vuil en onzuiver is, voorzigtig af, zonder het stukje linnen, dat de huid dekt, op te ligten; en leg eenen anderen zachten band aan. Als ik geen noodzaaklijkheid zie om het verband af te neemen, laat ik het tot de volkomen vereeniging liggen, welke gemeenlijk in agt, tien of twaalf dagen geschied, zo dat de lijder in staat is, om veertien dagen na de operatie te gaan, gelijk ik dit dikwijls gezien heb; want de lidtekens van de drie insneden beletten in het minste de buiging van de knie niet. Op deze wijze heb ik beursgezwollen aan de knie van aanmerkelijke grootte met goed gevolg weggenomen (s).

noegzaam steunpunt, zonder kwetzing van andere deelen, plaats heeft.]

(s) [Deze wijze van Opereeren op de zogenaamde Papegezwollen (*atteromata*) werktellig gemaakt, verdient bij

De beursgezwellen, die zig aan andere deelen des lichaams openbaaren, welken even als de knie gevormd zijn, kunnen op dezelfde wijze behandeld worden. Als zij de gedaante van eene peer of kalbas hebben en derzelver steel dun is, kan men ze met eenen gewaschten draad afbinden, en men zal daarop bespeuren, dat het gezwel begint te versterven, alsdan moet men den steel dicht bij den draad afnijden, ten einde het gezwel weg te nemen: maar als zij van een grooten omtrek zijn, zo dat de steel naar evenredigheid van het gezwel dik is, raad ik volgens HOIN de huid ter plaatse, waar men den draad wil aanleggen, intefnijden en den draad, na dat men dien in deze kringwijze insnede gelegd heeft, toe te trekken.

Een knoestgezwel kan men even als een beursgezwel aan de knie wegneemen; maar, als de huid, welke hetzelfde omgeeft, door de kleine verhevenheden en uitsteekzels, die gemeenlijk op een knoestagtig gezwel ontstaan, te zeer verdund is, of dat er door de vergroeiingen, welke zij met het gezwel gemaakt heeft, bederf aan gekomen is, moet men dezelve als een knoestgezwel of borstkanker behandelen, die hier en daar met de huid vergroeid is.

uitstek boven de gewoone kruisnede en uitpelling de voorkeur. Dan een ieder, die weet wat Boongezwollen zeggen wil, zal de wegsnijding daar van, uit aanmerking van de ongelukkige gevolgen, buiten de dringendste noodzaaklijkheid, zo gereedelijk niet toestemmen. Zie onder anderen hier van nader de doorwrochte verhandeling van den heer D. VAN GESSCHER *over de langduurige gezwollen*, bladz. 69. en volg. als ook *alg. oeff. Heelkunde*, D. 1. bl. 140.].



Het knoestgezwel en de kanker der borst namelijk, word op dezelfde wijze uitgerooid. Als het gezwel van zulk eene grootte is, dat het de huid, welke het omgeeft, noch verdund noch door vergroeiingen met het gezwel bedorven heeft, maak ik met een uitgebogen incisiemes eene maanswijze insnede aan het onderste gedeelte van het gezwel, scheide de beurs van onder van zijne inwendige aangroeiingen af en leg ze naar boven toe, om ze van de huid af te schellen. Alsdan leg ik deze huid over de wond en dezelve grooter dan de wond bevindende, snij ik het overtollige weg met het zelfde werktuig, of anders met eene wélsnijdende schaar: de huid behoorlijk op de wond gepast zijnde, leg ik er een stukje fijn linnen op, het welk de insnede eenige lijnen breed overdekt, omleg den ganschen omtrek van dit stukje linnen met eene behoorlijke hoeveelheid gepluisd plukzel, welk ik met veel zagt ruuw daar op gelegd plukzel, eenige compresien en eenen gevoeglijken band vast maak. Op deze wijze heb ik veele borstkankers met het gelukkigste gevolg weggenomen, en onder anderen ééne, in dewelke in den tepel, die het midden uitmaakte van het stukje huid, het welk weér over de wond moest komen, behield. De wond sloot zo wél toe, dat na het vormen van het lidteken, toen de lijderes weer geheel bekomen was en vet werd, het schier scheen, als of men hier geen borstkanker weggenomen had.

Als de huid dun of door vergroeiingen, welken uit eenige verhevenheden uit de beurs van het gezwel ontstaan, vervalscht geworden is, moet men deze bedorven plaatsen te gelijk met de kan-

ker wegneemen. In dit geval maak ik van boven naar beneden om het gezwel heen twee insneden, waarvan het middenpunt een langwerpig eirond verbeeld, zo dat de bedorven plaatzen der huid mede in dit ovaal middenpunt bevat zijn. Deze beide insneden tot aan de beurs van het gezwel gemaakt hebbende, scheidde ik dezelve van haare vergroeiingen af, vat ze met de linke hand, terwijl ik ze, met het mes in de rechte hand, afscheidde en wegneem (*t*).

Het kankergezwel weggenomen hebbende, tragt ik deze eivormige wond op dezelfde wijze te behandelen, als die, welke ik voorgeslagen heb om de wonden te vereenigen; als zij tot verettering overgaat, het welk gemeenlijk geschied, vergenoeg ik mij dezelve alleenlijk met droog plukzel gedurende de behandeling te verbinden, zonder eenige zalf noch een digestief te gebruiken.

Als het gezwel klein en de huid niet bedorven is, maak ik slegts eene toppuntige insnede langs dezelve in de gedaante van een knoopgat, vat het gezwel met eenen haak, haal het naar mij, snijde en scheidde het van zijne vergroeiingen af en neem het weg. De wond moet als eene andere enkele wond vereenigd worden, en alle kleine beursgezwellen moeten op dezelfde wijze weggenomen worden.

(*t*) [De manier van den heer SHARP in het behandelen dezer gebreken, verdient van ieder Heelkundige met de vereischte oplettendheid gelezen te worden. Zie zijne *Oordeelkundige Aanmerkingen over de Heelkunde*, bl. 365.

Wij zagen onlangs, door den kundigen Utrechtschen Heelmeester H. HEILDIJ, op de voorgestelde wijze van SHARP, eene aanmerkelijke *Scirrhus* uit de borst van eene bejaarde Jufvrouw, met een allergewenscht gevolg, wegneemen.]

De bloedstorting is bij het uitneemen der borstkankers veel aanmerkelijk, dan bij het uitsnijden van een beursgezwel aan de knie; egter kan dezelve door veelzagt gepluisd plukzel, op welk men ruuw legt, en eenen band gestelpt worden. Ik heb veele borstkankers zien wegneemen en heb er zelf veele van eenen aanmerkelijken omtrek, welken aan de borstspier vasthingen en zig zelfs tot onder de okzelen uitbreidden, weggenomen, zonder verplicht te wezen, het onderbinden der vaten werkitellig te maaken, en de bloedstorting kon door gepluisde plukzelwieken van ruuw plukzel en eenen band gestelpt worden. Indien, niet tegenstaande dit wél aangelegd verband, eene slagader bloedde, zou men het verband moeten wegneemen en er eenige stukjes eikenzwam of tondelzwam op leggen en de wond op nieuw verbinden. Doch indien de wond dan evenwel nog bloed, moet men tot het onderbinden van de slagader overgaan.

Om deze operatie wél te doen, moet een Heelmeester beoordeelingskracht hebben en genoegzaam onderrigt zijn; ook moet hij zig in de ontleedkunde oefenen en de operatiën dikwijls aan lijken beproeven, anders zal hij nooit de zo nodige vaardigheid bekomen, om operatiën, voornamelijk die, welken men, gelijk wij zo even aangemerkt hebben, volgens de verschillende omstandigheden moet veranderen, wél te verrigten (\*).

(\*) De heer hofraad RICTER handelt over de beursgezwellen in zijne *Anfangsgr. der Wundarzneykunst. I. Band. S. 297.*

## ZESDE HOOFDSTUK.

*Van het openen der Ettergezwellen.*

**M**EN opent een ettergezwel [*abscesfus*] om de stof, die er zig in zet, te ontlasten. Zommige Heelmeesters openen het gezwel met een lancet. Vervolgens brengen zij door deze opening eene sonde in, die met eene sleuf voorzien is, welke tot een geleider van het incisiemes of de schar moet dienen, om de eerste opening naar boven, naar onder en in de dwarste te verwijden, met één woord, om eene incisie in de gedaante van eene T, of eene kruisnede, als zij het nodig oordeelen, te maaken. Anderen brengen een regt incisiemes in het middenpunt van het gezwel en verwijden met hetzelfde de opening door verscheiden sneden op de sleufsonde, of bestuuren het incisiemes op den vinger der linke hand, dien zij door de opening in brengen.

Om een ettergezwel te openen, spannt men het middenpunt van het gezwel, hetzelfde door den helper met beide handen latende drukken, of het zelf met de linke hand zeer ligt drukkende, en maakt met de regte hand door middel van een incisiemes met eene bolle snede, gelijk LEVRET (\*) het opgegeven heeft, langs het gezwel op eens eene langwerpige incisie (u).

(\*) *Observations sur les causes & les accidens de plusieurs accouchements laborieux.* 1751. *Planche II. fig. 11.*

(u) [Het is niet even ééns of men een klein dan wel



Om de diepte van een ettergezwel te weeten, brengt men er den vinger der linke hand in; deze kan het incisiemes beftuuren, om, als men het nodig agt, de opening te vergrooten, eene incisie te maaken en om de banden van het celswijze weefzel, welken der stoffe in het ontlasten zouden kunnen hinderen, door te snijden.

Wijl men de aanmerking kan maaken, dat elk snijdend werktuig niet anders dan eene zaag is, en dat de snede, welke de deelen het best scheid, als bij voorbeeld die van een scheermes, als men het op de binnen hand legt, in het geheel geen indruk veroorzaakt, ten minsten als men het niet als eene zaag beweegt, wanneer men eindelijk ziet, dat van alle sneden de bolle het best scheid,

een groot ettergezwel opent. De éénvondigste en, zo het ons toeschijnt, beste wijze is deze: in het eerste geval namelijk, drukt men het zelve tusfchen den duim en voorste vingeren der linkehand, zodanig dat het middenpunt verheven uitsteekt, als dan maakt men met een stevig lancet, door de regte hand, in deze uitsteekende punt, eene genoegzaame langwerpige opening, welker grootte geëvenredigd is naar de grootte van het gezwel. — In het tweede geval, of bij een aanmerklijk en uitgestrekt Ettergezwel, en waar bij de huid weinig of niet verdund is, kan het lancet niet dienen. Een Helper drukt met zijne eene hand de eene zijde van het gezwel, terwijl de Heelmeester met zijne linkehand de tegengestelde zijde aanzet, drukkende als dan met de regte hand een fcherpfnijdend scheermes (’t welk in eene regte lijn, onbeweegelijk in deszelfs kas is vastgemaakt) tot in de holte van het gezwel. En zo het nodig is de snede te vergrooten, steekt men aanstonds in deze gemaakte opening eene fleuffonde, of dat beter is, den voorsten vinger der linke hand, en opent op dezelve met eene geknopte fchaar, zodanig en zo veel, als men nodig zal oordelen.]

zal men ras bij zig zelven overtuigd zijn, dat de wijze, welke ik voorgeslagen heb om ettergezwellen te openen, boven de beide anderen, van dewelken ik gesproken heb, moet gekozen worden; want in de meeste gevallen is eene enkele incisie genoegzaam, zonder dat men genoodzaakt is, dezelve verscheidenmaalen te herhaalen; daar men in tegendeel in de beide andere wijzen de sneden vermenigvuldigt, het welk den lijder meer pijn veroorzaakt, is dit reden genoeg, om dezelve boven de anderen te kiezen.

Een hoofdregel bij het openen der ettergezwellen is, de insnede zo veel mogelijk parallel met de groote plooijen der huid en naar de lengte der deelen te maaken (v). Ook moet men de insnede zo maaken, dat de etter ongehinderd, volgens de ligging en den stand, welke het beledigd deel na de operatie moet aanneemen, kan uitvloeijen, op dat geen etter zig in het middenpunt van het ettergezwel verzamelé. Deze omstandigheid verplicht den Heelmeester zomwijlen noch de indrukken der huid noch de regte ligging der deelen te volgen, maar eene insnede in de gedaante van eene T te maaken, om de vrije ontlasting der etter te bevorderen. Als de stof onder eene vlakke

(v) [Het bevordert de geneezing, en maakt de Lidtekens minder merkbaar, wanneer men de rigting der snede zodanig maakt, dat de huid naar de loop zijner plooijen, dat is, naar die der ronde vezelen geopend word: als daar zijn de Ettergezwellen van het voorhoofd, de oogleden, den hals, de oksels, de lippen der vulva, de billen, en die der agterste en voorste oppervlaktens van zommige geledingen, welke allen door eene dwersche insnijding moeten geopend worden.]

spier ligt, geeft men zo veel mogelijk agt, dat men dezelve naar de lengte van haare vleeschvezelen afscheid, op dat haare werking niet in het minste gestremd worde. Als zij van eenige vliezen omgeeven is, bij voorbeeld de spieren van de dije van den breeden band of de tweehoofdige spier van haare aponeurosis e. z. v., zo moet men dit vlies met hetzelfde instrument doorsnijden, en de opening naar welgevallen vergrooten; maar de Heelmeester moet het instrument altijd met den vinger bestuuren, welke een veel zekerer bestuurder is dan eene sonde, ten minsten als het geen hol gezwel is, in het welk de vinger niet ingebracht kan worden.

Als men bij deze operatie eene slagader gekwetst of dezelve geheel afgesneden heeft, moet men de bloedstorting door eene zachte drukking, door opgelegd gepluisd plukzel, of geprepareerd eikenzwam, of tondelzwam stelpen ende de slagader niet onderbinden, dan alleen in geval de andere middelen vrugtloos waren. Egter moet men de onderbinding altijd boven eene sterke drukking, die van gevaarlijke uitwerkingen kan wezen, verkiezen.

In het algemeen moeten bij het openen der ettergezwollen bekwaamheid, kundigheid en vaardigheid den Heelmeester bestieren, ten einde hij geen deelen treffe, die zorgvuldig vermijdd dienen te worden, en in staat zij, naar gesteldheid van de onderscheiden deelen des lichaams en de veelheid der etterholten, die hetzelfde kunnen zamenstellen, de insnede te veranderen. Ten einde de deelen, welken men in agt neemen moet, te vermijden, en geen al te groote incisie te maaken,

maakt men tegenopeningen op de plaatzen , waar zig etter vertoont. Zommige Heelmeesters haalen er een lemmet van gerafeld linnen door van de eene opening tot de andere , welke zij met het digestief vet maaken en bestrijken om de opening te reinigen. Doch de ondervinding heeft mij geleerd , dat dit lemmet niet altijd van dien uitwerking is , maar dat hetzelfde dikwijls pijn veroorzaakt , en dat het in zeer veel gevallen veel gevoeglijker is , hetzelfde er niet door te haalen , maar de zuivering aan de natuur over te laten , welke de kunst altijd in haare werking overtreft.

Een volkomen rijp geworden ettergezwel gaat zomtijds van zelve open en de etter ontlast zig door eene of meer openingen. Om in zulk geval de volkomen ontlasting der stof te bewerken , kan men eene sleuffonde in die openingen steeken en vervolgens een incisiemes op de sonde inbrengen , om het gezwel te splijten (w). Als men het gezwel op de sonde tot de helft geopend heeft , want gemeenlijk is het gat in het midden , brengt men den vinger der linke hand in het middenpunt van het ettergezwel om het incisiemes te bestuuren , splijt daar op de andere helft van het gezwel en snijdt de wanden van het  
cels-

(w) [Zo men in deze of soortgelijke gevallen van het incisiemes gebruik maakt , moet deszelfs lemmer smal , stevig en aan eene zijde zeer welsnijdend zijn. Men brengt het omgekeerd met den rug in de sleuf der sonde , of op den ingestookten vinger , en dus oplichtende en voordstuwende verwijdt men de opening. Het is altoos veiliger , hier een geknopte *bistorie* toe te gebruiken.]



celswijze weefzel, welken den vrijen uittogt der etter zouden kunnen hinderen, door.

Om deze eerste insnede altijd op dezelfde wijze te maaken, kan men zig van een incisiemes bedienen, op welks rug, omtrent eene lijn van de punt, op eene schroef een staafje met een geëgaat knopje is, welks opening geëvenredigd is naar de grootte van eenen kleinen steel met eenen knop; men brengt dezen steel door de opening, door dewelke de etter uitvloeit; houd dien met de linke hand vast, plaatst en houd hem in de directielijn, welke men aan de incisie wil geven, en met de regte hand, in dewelke men het incisiemes heeft, stuurt men het einde van den steel, welke buiten de opening van het ettergezwel is, door de opening van het staafje; stoot het incisiemes voort; brengt het in het ettergezwel en maakt op deze wijze de eerste incisie. Men kan zig ook van hetzelfde incisiemes bedienen; om eene regte holle zweer te openen. Ik zag dit konstig uitgedagt incisiemes voor de eerste maal in handen van den heer JOUBERTHOU.

Menige Heelmeesters vullen volgens eene blinde gewoonte de holte van een ettergezwel; welk zij geopend hebben, op. Dit veroorzaakt aandoenlijke pijnen, koorts en vermeerdert het geen, waar mede de lijder reeds bezwaard is. Ik ben verscheiden maalen bij het openen van ettergezwellen geweest, wanneer de lijders hun geschreeuw gedurende het verband verdubbelden. Ik besloot derhalven eens; eenen dezer lijderste vraagen, waarom hij gedurende het verband zo geschreeuwd had, en hij verzekerde mij, dat hij onder het verbinden veel meer geleden had; dan

bij de operatie en dat hij eene aanmerkelijke spanning bepeurde in het deel, welke gevoeliger en pijnlijker was, dan die, welke hij voor de opening gevoelde.

Om de toevallen, welken de gevolgen van dit opvullen zijn, te vermijden, vergenoeg ik mij alleenlijk met tusschen de lippen der wonde, na dat de etter er uit gevloeid is, een weinig ruuw plukzel langs haaren geheelen omtrek te leggen en hier op leg ik eene genoegzaame hoeveelheid van hetzelfde plukzel, het welk de etter, die van het eenetot het andere verband uitvloeit, moet inzui- gen; dit alles omwind ik met een bekwaam verband.

Veele Heelmeesters pleegen, als zij het eerste verband afgenomen hebben, de wond zorgvuldig op te vullen met steekwieken, die zij met digestief besineerd hebben, en leggen hier op weêr platte wieken, die zij met dezelfde zelf besineeren, om, zo zij zeggen, den grond der zweer te zuiveren en eene verettering te weeg te brengen, welke de verloren deelen weder moet vergoeden. Veele oefening, ondervinding en oplettendheid hebben mij het misbruik van de veele digestieven leeren kennen; ik ben derhalven van de gewoone wijze afgegaan, en heb er mijn werk van gemaakt, om geen digestief bij de behandeling der geopende ettergezwellen meer te gebruiken en ben verzekerd, dat men de verettering en zuivering van den grond van het ettergezwel veel eer der natuur, dan der kunst moet overlaten. Ik nam in veele gevallen de proef, om de natuur te laten werken, en de proef is mij zo wél gelukt, dat ik geen der digestieven, welken sommige Heelmeesters bij het verband der

ettergezwellen zo zeer aanprijzen, meer gebruik. Ik bespeurde namelijk, dat de natuur, die voorzigtiger is dan de kunst, de etter van zelve uitschijft, wanneer men zig niet tegen dezelve verzet, gelijk bij voorbeeld door dit opvullen geschied, en dat de wond zig zuiverde en veel eerder een lidteken vormde, dan in de zulken, bij dewelken ik zalven en digestieven gebruikt had.

Als ik het eerste verband afgenomen heb, vergenoeg ik mij, alleenlijk tusschen de lippen der wonde kleine fijne wicken te leggen, welker beide einden doorgesneden moeten zijn, waarvan het eene in de wond gebragt word, doch het andere er uit moet hangen. Deze plukzeldraaden beletten, dat de lippen der wonde niet aan elkander kunnen kleeven en drijven de etter af, welke in het verband intrekt; alsdan leg ik eene genoegzame hoeveelheid zeer zagt grof plukzel, het welk eene soort van dekzel vormt, eenige drooge en weeke compresen daar op, en ten laatsten hier over eenen vereenigenden band. Het Engelsch plukzel is het best, om tusschen de lippen der wonde gelegd te worden.

Indien het ettergezwel aan het hoofd, in het aangezicht of aan andere deelen des lichaams is, alwaar het moeilijk valt, het verband met eenen band vast te maaken, maak ik over het plukzel eene gemeene Nurenbergsche plaaster met eenige soort van gom of *onguent de la Mere* (\*).

(\*) Deze zalf heet ook *Ung. Fuscum*. en bestaat uit geel wasch, goudglit en olijvenolie. Zie *Pharmacopœa Parisiensis. Par. 1748. 4. p. 156. L.*

Door deze eenvoudige behandeling vult de holte der zweer zig veel eerder, dan wanneer men zig van het digestief bedient; ook is men gemeenlijk niet verplicht, zo dikwijls den hellschen steen [*lapis infernalis*] op de wond te leggen, om het sluiten der wond te bevorderen. Het schijnt zelfs, dat het nieuw opgezwollen en sponsägrig vleesch, over het welk men dezen steen dikwijls moet strijken, enkel door het misbruik der zalven en digestieven veroorzaakt word. Bij elk verband draag ik zorg, dat zo weinig etter, als mogelijk is, in de wond blijve. Als dezelve niet uitvloeit en zig op den grond der zweer verzamelt, doe ik ze er uit door middel der einden van kleine zachte wicken, of met kleine tangetjes, om dewelken ik gerafeld linnen wikkel. Ik wagt mij wél, met deze tangetjes de kleine witte droppels weg te neemen, welken zig op de gekorrelde verhevenheden zetten, die den grond van het ettergezwel bekleeden; deze kleine droppels zijn niets anders, dan het voedingsap, het welk zig over deze deelen verspreid en het sluiten der wond helpt bewerken. Er is geen balzem, noch eenige zalf, die bekwaamer is, om het opheelen der wond te bevorderen, dan deze kleine droppels.

Alle hoegenaamde vogtige compresen, welken men over het plukzel en de wicken legt, beletten, dat de etter niet in het verband kan dringen; en het kan dus, wanneer het op den grond der zweer terug gehouden word, eene kwaade gesteldheid aanneemen. Het zelfde kan men van de plaasters zeggen: dezen behoeft men slegts ten tijde van het sluiten der wonde te leggen, ten einde het plukzel niet aan haare randen kleeve, en men be-



hoeft dan geen zorg meer voor de terug blijvende etter te hebben. Ook moet men ze op kleine open ettergezwellen aan het hoofd en in het aangezicht leggen, alwaar men niet wél eenen band over het verband kan aanleggen, gelijk wij zulks boven aangemerkt hebben (\*).

Zommige oefenende Heelmeesters maaken inspuitingen in het middenpunt en in de holte van een ettergezwel, dat zij geopend hebben, met oogmerk, om de etter uittespoelen, en de wanden der zweer te reinigen. Dit is ook een middel, dat men te zeer misbruikt heeft. De inspuitingen zijn alleen van nut, daar men groote ophooping van etter heeft, op welker grond men niet kan komen en daar de stof rotächtig en van eenen kwaaden aart is, en zelf in dit geval moet men ze niet overmatig en met de behoorlijke afkookzels uitspuiten.

(\*) Zie *Memoires sur les sujets proposés pour le prix de l'Acad. R. de Chir. Tom. XII. & XIII.* 12°. alwaar men, behalven eenige andere verhandelingen, de voortreflijke verhandeling vind van den hoogleeraar CAMPER over het misbruik der zalven en plaasters. L. [Wenschlijk ware het, dat deze uitmuntende verhandeling door een ieder heekundige, wien het belang zijns medemenschen ter harte gaat, geleezen wierd: wij zijn verzekerd, dat veele gebreken, die veelal verwaarloosd, vermorst of aan gebrek van genoegzaame kunde niet wel behandeld worden, beter en spoediger geneezen zouden.

De ondervinding heeft ons, niet dan maar te dikwerf, het misbruik der zalven en plaasters in onderscheiden gevallen doen zien; en tevens doen opmerken, dat de natuur in de meeste dezer gevallen, op eene zachte wijze in haar werking ondersteund wordende, waarlijk alleen genoeg is, om het verlorene te herstellen, en het gebrekkige te volmaaken.]

Daar wij nu in het algemeen van het openen der ettergezwellen en van de wijze om dezelve te verbinden, gesproken hebben, zullen wij ook nog iets in het bijzonder van eenige soorten van ettergezwellen zeggen.

Om een ettergezwel der lever, welk zig openbaart door een gezwel en ophooping van vloeistoffen onder en langs den rand, dien de kraakbeenen der ribben vormen, met een incisiemes, dat eene bolle snede heeft, te openen, maakt men de incisie in het gezwel. De Heelmeester vat met de vingers der linke hand de huid in het midden van het gezwel en laat ze ook te zelfden tijde door eenen helper vatten, zo dat er eene langwerpige plooi ontstaat, hij ligt vervolgens, nevens den helper, deze plooi op en snijdt met het incisiemes de plooi tusfchen zijne en des helpers vingers door, zo dat de flap geworden plooi een knoopgat of eene dwarslopende incisie vormt, welke alleen door de huid en het celagtig weefzel gaat. Indien het gezwel zo uitgezet mogt zijn, dat men de huid in geen punt kon vatten, zo zou men het gezwel met de linke hand een weinig moeten zamen drukken en de eerste incisie maaken tot op de vleeschige vezelen der buikspieren. Hier op snijdt men de vleeschige vezelen door, voelt met den vinger der linke hand het gezwel, welk door de etter gevormd is en dan merklijk gevoeld word, en maakt met het zelfde werktuig eene langwerpige insnede in de etterbeurs, welke naar maate van de uitgebreidheid van het ettergezwel en de vergroeiing van deszelfs zak, welke het met het buikblies gemaakt heeft, moet zijn. Maar men moet wel letten, dat de incisie niet buiten de grens

zen van de vergroeiing des zaks met het buikvlies ga, wijl de etter zou kunnen ontsnappen en zig in de holligheid van den buik uitstorten, gelijk ook de loshangende deelen door deze opening zouden kunnen uitschieten (x). De vinger der linke hand, dien men inden etterzak brengt, moet het incisies rigten, om de opening, als men het nodig agt, te vergrooten; als dan brengt men in de wond een langwerpig stukje fijn linnen, dat aan de zijden uitgerafeld is, daar uit moet hangen, en de wond langs haaren omtrek opvult, waar over men veel ruuw plukzel en eenige compresen legt, die men met den lijf- en schouderband vast maakt. Men laat den lijder, zo veel als mogelijk is, op de wond liggen, beveelt hem aan, dezen stand, zo veel het hem maar eenigzins doenlijk is, te houden; met één woord, men verhoed, dat de etterstof niet van het eene verband tot het andere op den grond der zweer vertoeve. Elk volgend verband moet op deze wijze gemaakt worden.

Maar nu en dan is men na de opening van zulke ettergezwollen genoodzaakt, zijne toevlugt tot de inspuitingen te neemen, doch men moet er zig altijd met veel omzigtigheid van bedienen.

(x) [Bij het openen der Lever is men ook indagtig, dat, wanneer dezelve in een staat van zwelling en uitzetting is, zij veel laager naar den onderbuik zakt, dan in den gezonden staat; en na maate de uitstorting groot is, en de geneezing nadert, zich weder in haaren natuurlijken stand en plaats herstelt. — Dus volgt, dat wanneer men de insnijding te veel naar den onderkant verrigt, de uitwendige opening, niet met die der Lever, maar met de holte des buiks zoude overeen komen.]

Ik heb het reeds gezegd, en zal niet nalaaten, het telkens te herhaalen, dat de natuur voorzigtiger is, dan de kunst. Men moet haar derhalven altijd laten werken en alleen behulpzaam zijn, terwijl men, om de stof te ontlasten, den lijder, zo veel als mogelijk is, van het eene verband tot het andere een' gevoeglijken stand in agt laat neemen.

De ettergezwollen, welken zig in het celagtig weefzel, dat de buikspieren bedekt, vormen, moeten op dezelfde wijze als die, welken tusschen de spieren, als ook tusschen de spieren en het buikvlies zitten, geopend en behandeld worden.

De ettergezwollen, welken zig in eenige andere ingewanden van het onderlijf zetten, welker zak aan het buikvlies vast is en die zig aan den omtrek van het onderlijf ontdekken, moeten even als die der lever geopend en verbonden worden.

Ik heb op dezelfde wijze ettergezwollen in de liezen, in den dijeboog, langs den kamvormigen boog van het darmbeen, welks hoofdmiddenpunt in het celagtig weefzel van de groote lendenpier en van de darmbeenspier vast zat, geopend. Ik heb een dergelijk ettergezwel gezien, waar van de lijder genas, bij het welk het buikvlies ter lengte van een halven voet van deszelfs celagtig weefzel ontbloot en verwijderd was, waar door men de kronkelingen der darmen kon onderscheiden. Bij het openen van dit ettergezwel moest ik langs den kamvormigen boog van het darmbeen de aangewassen einden van de groote en kleine schuine spier doorsnijden. Zo als ik dezen



doorgesneden had , zag ik de kronkelingen der darmen door het doorschijnend buikvlies , het welk door de etter van zijn celagtig weefzel beroofd en ontbloot was ; en door een eenvoudig verband zonder zalf en zonder digestief werd de lijder weêr volkomen hersteld.

De ettergezwollen aan den balzak moeten met een bol incisiemes geöpend en op dezelfde wijze verbonden worden. Ik heb opgemerkt, dat hier na de opening het herhaalde opleggen van eene weekmaakende en pijnstillende pap over het plukzel de geneezing spoediger bevorderde, dan het verband met zalven en digestieven.

De ettergezwollen eindelijk , welken zig aan den omtrek van het hoofd , van den hals , van de borst , van de lendenen en aan alle uitwendige deelen des lichaams vormen , moeten door eene langwerpige snede met een bol incisiemes geöpend worden. Als het niet mogelijk is , dezelve met dit werktuig te openen , als bij voorbeeld in den mond , dan bedient men zig van een lancet , welks hegt men met een bandje omwind.

De ettergezwollen der amandelen in de keel of den slokdarm opent men met den bij de Heelmeesters bekenden *pharyngotomus*. Deze ettergezwollen en die aan de binnenvlakte van den mond hebben geen verband nodig en eenige geschikte gorgelwaters zijn de eenigste middelen , waar van men zig kan bedienen.

De ontsteekingagtige verzamelingen (*dépôts phlegmoneux*) , die aan de leden komen , in dewelken de etter onder de huid , of onder de aponeurotische vliezen , als bij voorbeel onder de breede zwagtelspier van het dijbeen , onder de hand ,

of voetäponeurosis in den koker der peezen c. z. v. uittort, moeten op dezelfde wijze geopend en verbonden worden (y).

Eene volkomen kennis van al de verscheiden deelen moet hier de hand des Heelmeesters be-  
stuuren en hem tot een rigtsnoer dienen bij de incisiën, die hij genoodzaakt is, te maaken. De zelfde kennis moet hem ook tot eene geleidster strekken bij de incisiën, welken men in de vijf aan de vingers van de eerste, tweede, derde en vierde soort moet onderneemen.

Zommige schrijvers hebben ook de bijtende middelen geteld onder dezulken, welken men kan gebruiken, om de ettergezwellen te openen. Ik stem zulks toe, wanneer men dezelve gebruikt, om in een koud ettergezwel de warmte te vermeerderen en om meer etter en verëtering te weeg te brengen; maar de bijtende middelen kunnen geen ettergezwel openen, wijl men altijd na derzelver werking nog genoodzaakt is, de korst met een snijdend werktuig weg te neemen

(y) [In de *Memoires de l'Academie Roy. de Chirurgie tom. I pag. 563. en volg.* (Zie ook TROUT 2. stuk bladz. 139. en verv.) vinden wij door den heer HAVIN verscheide zeldzaamheden, betreklijk de Ettergezwellen aangetekend, als b. v. van spelden, naalden, vischgraaten, beenderen, karsen en pruimensteenen, stukken van hout, steen en meer andere lichaamen, welke allen door den mond waren ingegaan, en op onderscheiden plaatsen van het lichaam in ettergezwellen gevonden en uitgehaald wierden. — Dit leert ons het vermogen der natuur kennen, en tevens in zwijffelagtige gevallen, de geöpende verzwearing, met den vinger of de sonde nauwkeurig onderzoeken: door welke te verzuimen, niet zeldzaam het goed gevolg der operatie te leen zoude gesteld worden.]

Daar nu het wezenlijke van de opening van een ettergezwel in de incisie bestaat, agt ik het onnoodig, hier van het gebruik te spreken der bijtende middelen, om eene opening te maaken (\*).

(\*) Met regt geeft onze schrijver aan het snijdend werktuig den voorrang boven de bijtende middelen; doch in zommige gevallen, wanneer namelijk de lijder voor het snijdend werktuig eenige vrees betoont of bij kinderen, die gedurende de operatie niet stil houden, kan men de bijtende middelen gebruiken. De bijtende middelen brengen in nog niet geheel week geworden ettergezwellen ook iet toe tot geneezing en bevorderen door derzelver prikkeling de ettering. Men bedient zig van de bijtende middelen op de volgende wijze: eene plaaster, in welker midden men eene opening gesneden heeft, kleefst men op het beledigde deel, legt dan in de opening gekneusden en vogtig gemaakten hellschen steen, bij den welken men een weinig heilsap [*opium*] kan mengen, om de pijn te verminderen, en hierover legt men nog eene plaaster, ten einde het bijtende middel er op blijve liggen. Naar dat de opperhuid van het ettergezwel dikker of dunner is, laat men het er meer of minder uren op liggen. Bij het afneemen van de plaasters vloeit in de meeste gevallen de etter er tevens uit, of men moet de opgekomen korst er afdoen. In groote eiterverzamelingen beveelt de heer BELL (*Abhand. von den Geschwüren und deren Behandlung, a. d. E. Leipzig 1779. 8.*), om den toegang der lucht te beletten, een haarsnoer aan, het welk men van boven naar beneden daaglijks meer afrekt en welks draad men allengs vermindert. L.

## ZEVENDE HOOFDSTUK.

*Van de castratie.*

**I**N de operatie van eene liesbreuk vind men zomwijlen, dat de bal [*testiculus*] knoestagtig, vol ettergezwollen en verstorven is, zo dat de Heelmeester zig genoodzaakt ziet, denzelfen weg te neemen; en deze operatie noemt men de castratie.

Zomtijds geschied het castreeren, zonder dat eene waare breuk plaats heeft, en dan doet men het, om eenen knoestagtigen bal weg te neemen, gelijk in eene zaad- en vleeschbreuk.

Als het knoestgezwel van de zaadstreng zig tot binnen den buikring uittrekt, moet men zig wagten, daar eenen band aan te leggen, het welk gewislijk eene ontsteking zou veroorzaaken, die zig in het bekken zou kunnen verspreiden en met de versterving of eene etterverzameling eindigen, waar van de dood des lijdens het gevolg zou zijn, gelijk ik dergelijke gevallen gezien heb.

In geval van eenen kankeragtigen bal en eene knoestagtige zaadstreng tot binnen den buikring, zo dat het kankeragtig vergift zig er aan mededeelt, is het kwaad ongeneeslijk, door dien het in dit geval niet mogelijk is, om al de deelen van de zaadstreng, die door dit vergift aangetast zijn, wegteneemen, en het terug gebleven deel van dezelve kankeragtig zou kunnen worden en in het bekken een gezwel veroorzaaken, het welk



## HEELKUNDIGE OPERATIEN.

van de zaadstreng tot de overige deelen overslaan en voor den lijder dodelijk zijn zou (\*).

Maar, als men verzékerd is, dat de zaadstreng, voor dat dezelve nog door den buikring opwaard stijgt, niet door dit vergift aangetast is, dan kan men hoop hebben, dat zij niet kankeragtig zal uitspatten, en men kan de operatie met goed gevolg onderneemen, ook zal men eene goede genezing zien volgen.

De hoofdzaak in deze operatie is het stelpen van het bloed uit de zaadslagäder. De onderschepping van de zaadstreng is hier het zekerste middel, om de bloedvloeijing te stremmen, egter moet men zorg draagen, dat men ze niet te vast maake, wijl men anders te vreezen heeft, toevallen te véoorzaaken, welken de gewoone gevolgen van eene te vaste onderschepping in de gemelde deelen zijn. De eikenzwam, de tondelzwam, het geschaafd plukzel en eene twaalf, agtien of vier en twintig uren aanhoudende zachte drukking der hand zijn gemeenlijk genoegzaam, om de bloedvloeijing te stillen: maar zekerheids-halve moet men de zaadstreng met den blooten heilkundigen knoop onderscheppen, de onderschepping niet te sterk toetrekken, alleenlijk beletten, dat het bloed niet kan uitvloeijen en slegts den mond der slagäder zamen drukken, om der-zelfer wanden aan elkander te brengen, zo dat zij te zamen kleeven en zig vereenigen kunnen. De geringe zwellings, welke boven de onderschep-

(\*) *Opusculas de Mr. MORAND deuxieme partie, p. 171.*

ping na dit ligt toetrekken volgt, sluit de vaten en belet het uitvloeijen.

Om deze onderschepping naar behoren te maaken, vat ik met eenenaald, in dewelke twee gewaschte draaden zijn (\*), een weinig van het celleweefzel der zaadstreng, maak met den eenen draad eenen heekundigen knoop en trek dien zagtlijk en matig toe, en hier op leg ik nog eenen enkelen knoop met eenen strik; den anderen draad knoop ik in het geheel niet, egter leg ik dien zo, dat in geval de slagader bloed mogt uitlaaten, ik aanstonds de onderschepping kan onderneemen.

Om eenen knoestagtigen bal weg te neemen, moet men eerst eene incisie maaken, zo als men die in de operatie van eene breuk maakt, wanneer men den breukzak ontbloot, en wel zo, dat het gezwel van den bal ontstaan, in deszelfs geheel en omtrek, gelijk ook de zaadstreng geheel ontbloot en zichtbaar worden. Een wél ervaren Heelmeester, die de deelen kent, welken hij snijdt, en zig in de ontleedkunde en in het opereeren oefent, zal nooit verlegen zijn, wanneer hij eenen knoestagtigen bal moet wegneemen. Het komt er voornaamlijk op aan, dat men hem wél ontbloot en hem zo wel, als de zaadstreng, van de plaatzen, daar zij zouden kunnen vast zijn, vooral daar, waar men de onderschepping wil doen, dat is, daar de zaadstreng onbeschadigd.

(\*) Elke van deze draaden moet uit twee zamengevoegde draaden bestaan en te deeg gewascht worden, zo dat elke een klein koordje verbeeld. L.

is, afzondert; hier moet nu de onderschepping geschieden, het koordje matig toegetrokken, de zaadstreng omtrent een vinger breed beneden den band afgesneden en de bal weggenomen worden. Alleenlijk moet men agt geeven, dat men de snede schuin maake, en de zaadstreng moet men zo lang laten, als mogelijk is. Daarna legt men op de einden van de afgesneden zaadstreng een stukje geprepareerde eikenzwam of tondelzwam, vult de wond met zagt geschaafd plukzel op, waar over men eene wiek ruuw plukzel en eenige compresen aanlegt; dit alles maakt men vast met eenen vereenigenden band of eenen draagband. Dit verband moet niet voor den tweeden, derden of vierden dag, of wanneer het plukzel zig van zelve zonder veel trekken laat losmaken, afgenomen worden, ten minsten is het niet noodzaaklijk, het eerder af te neemen. De regel, welken wij omtrent het afneemen van het eerste verband bij het wegneemen van een beursgezwell aan de knie of van eene borstkanker, in het vijfde hoofdstuk, voorgeschreven hebben, moet hier insgelijks in agt genomen worden. De tweede reis moet het verband alleenlijk met droog plukzel [met agterlaating der zwam] gemaakt worden, zo als ik het in een geöpend ettergezwel, in het zesde hoofdstuk, voorgeschreven heb. Indien er verrotting plaats had, zou ik het water van GOULARD boven alle zalven en digestiven kiezen (z).

(z) [Het water van GOULARD is onder den naam van *Eau vegeto minerale* bekend, en word bereid door één lepel vol afrekzel van goudglit, *Extrac. Saturni*, twee le-

Om alle vrees voor eenen bloedvloed, welke bij deze operatie zeer dikwijls voorkomt, te ontwijken, pleeg ik in de meeste gevallen op de volgende wijze te handelen: na dat ik den bal en de zaadstreng behoorlijk van het celledweefzel afgescheiden en den draad matig toegetrokken heb, snijd ik de zaadstreng niet door, maar wikkel den bal in eene compres, leg hem in de lies van den lijder op een klein kussen van plukzel, maak hem zo vast, dat hij geen spanning maakt en laat hem hier vier en twintig, zes en dertig, of agt en veertig uren lang rusten: alsdan onderzoek ik de onderschepping, leg, als het nodig is, eenen tweeden draad aan en neem den bal met het incisiemes weg. Schoon ik onderschept heb, leg ik evenwel op de einden van de zaadstreng, welke ik schuin afgesneden heb, een stukje zwam en daar op geschaafd plukzel, vervolgens eene behoorlijke hoeveelheid ruuw plukzel, compresen e. z. v. Vreezende, dat het bloed uit de slagader mogt vloeijen, leg ik ook wel de hand op het verband en laat mij door eenen helper aflossen om eene zachte drukking gedurende vier of zes uren te maaken. Tegen den vijftienden of agttienden dag scheid zig de band, of, liever, het gedeelte van de zaadstreng, waar aan de band gelegd is, en valt door eene verettering van zelve af. Het ge-

pels vol brandewijn, *Spir. vini*, en één mengelen gemeen water onder elkanderen gemengd. Dit middel kan, na maate de omstandigheden het vereischen, verslapt of versterkt worden, door het water te vermeerderen of te verminderen.— Wij kunnen tot deugd van dit middel zeggen, dat het ons dikwerf in uitwendige ontsieeking, kneuzingen en verzeeringen van veel dienst geweest is.]



gebeurt dikwijls, dat het onderschepte deel, wanneer men de onderschepping zeer matig toetrekt, zig niet scheid. Bij het wegneemen van eene zeer groote vleeschbreuk, welke ik op deze wijze opereerde, kwam eene behoorlijke verettering, ik sneed den band den twaalfden dag af en er kwam geen bloed, en de wond was nog voor den dertigsten dag volkomen gesloten, zonder dat een deel van de onderschepte zaadstreng afgevallen was. De lijder kreeg geen toevallen, en werd zelfs niet eens eene koorts gewaar. Hij ontving dagelijks gezelschap, en den veertigsten dag na de operatie kon hij reeds in den tuin gaan wandelen.

Indien het mogelijk was, zou het zeker beter zijn, wanneer men, gelijk A. PETIT in zijne lesfen leerde, bij de onderschepping enkel de slagader kon vatten: maar de proeven, die wij genomen hebben, hebben ons geleerd, dat het niet mogelijk is, deze afscheiding der vaten met behoorlijke zorgvuldigheid te maaken, zonder door het trekken en uitspannen hevige pijnen te veroorzaaken. Daar het dus onmogelijk is, houden wij het voor beter, de geheele zaadstreng te omvatten en den band slegts matig toe te trekken. De ondervinding heeft ons geleerd, en wij zouden veele voorbeelden kunnen bijbrengen, dat deze wijze van opereeren van geen der toevallen verzeld was, welken gemeenlijk het gevolg van eene geweldige toetrekking bij de onderschepping zijn (\*).

(\*) Men heeft voorbeelden, dat men op het onderscheppen van de zaadstreng eene kramp zig in het gansche lichaam of inzonderheid in de kaak zag verspreiden. Men heeft

Ik heb gezegd , dat men de onderschepping moet doen , daar de zaadstreng gezond en onbedigd is. Doch bij aldien dezelve, nevens den bal tot aan den buikring knoestagtig mogt zijn , zo dat er geen ééne gezonde plaats overblijft , daar men een band kan aanleggen , mag men ze , gelijk ik reeds gezegd heb , in het geheel niet onderscheppen (\*). In dit geval schelt men de zaadstreng uit het celledweefzel los en neemt den bal weg , gelijk wij het reeds gezegd hebben , vat het einde van de

egter veel meer operatiën gedaan , in dewelke de onderbinding van de zaadstreng geen van deze toevallen ten gevolg had. Het komt veel aan op het geweld , waar mede men de zaadstreng toetrekt en de spanning , die men daar door veroorzaakt. POTT snijdt in deze operatie den balzak van den buikring tot onder aan den balzak open , scheid alsdan de slagader van de andere vaten af , en onderschept ze ; vervolgens snijdt hij de zaadstreng onder het ligatuur af en scheid eerst ten laatste den bal van het celledweefzel des balzaks. Zie *The Chirurgical Works of PERCIVAL POTT*, Vol. II. p. 484. London , 1779. LE BRAN raad hetzelfde aan. THEDEN legt alleenlijk een weinig lorkenzwam op de slagader. Men kan hier over meer vinden in OLOF AKRELS *chirurgische Vorfällen*, I. B. S. 443. L. [De oordeelkundige SHARP is in dit stuk ook zeer nauwkeurig : 's mans behandeling komt met die van POTT vrij wel overeen , en de wijze van werking dezer twee groote Heelmeesters verdient hier in , ten sterkste aanbevolen te worden. Zie ook J. Z. PLATNER *Handl. tot de Chirurgie*, d. 2. bl. 80.]

(\*) Men heeft zomtijds , wanneer de zaadstreng tot aan den buikring knoestagtig was , den buikring geöpend en de onderschepping boven den buikring gedaan ; doch gemeenlijk kwam er eene ontsteking der ingewanden bij en de lijder stierf. Een gemeene misslag is , dat men de operatie gemeenlijk te laat onderneemt , wanneer naamlijk de verharde bal reeds begint pijnlijk te worden. L.

zaadstreng, die men zo lang laat als mogelijk is, met den duim en voorsten vinger, drukt ze genoegzaam om het uitvloeijen van het bloed te beletten, buigt ze een weinig om en houd ze, of laat ze door eenige helpers, die elkander allossen, vier en twintig uren lang zamen drukken. Op dit einde legt men een stukje eiken zwam, welk men met den vinger daar op vast houd. Vier en twintig uren zijn gemeenlijk een genoegzaame tijd, waarin eene slagader kan vergroeijen en de uitvloeiing van het bloed beletten, gelijk ik dit in verscheiden gevallen gezien en bevestigd gevonden heb.

De dodelijke toevallen, welken gemeenlijk op deze operatie volgen, hangen voornaamlijk af van de vaste zamentrekking der zaadstreng (\*). Men moet derhalven den strik van deze onderschepping slegts matig toetrekken, in plaats van het vast toehaalen, het welk zeer veele schrijvers naar hunne mening zeer aanbeveelen en veele oefenende Heelmeesters in gebruik brengen, de eiken zwam enz. opleggen, welke men door eene zachte drukking der hand gedurende eenen bepaalden tijd, gelijk wij boven gezegd hebben, daar op houd. De opperheelman van een groot hospitaal zeide mij, dat van veertien personen, aan dewelken hij de castratie had ondernomen, twaalf overleden waren, dat eeniglijk het al te sterk toetrekken van den band, waar aan hij zo zeer was gewend geweest, oorzaak van dezen ongelukkigen uitslag was: want zedert dat hij

(\*) *Opusculs de Chirurgie de Mr. MORAND, II, p. 172*

den band maar matig had toegehaald, was niemand van de geenen, die hij geopereerd had, meer door de gevaarlijke toevallen aangetast. A. PETIT verzekerde mij, dat hij zeer veelen, die de operatie ondergaan hadden, aan de te sterke onderschepping had zien sterven. Waarom wil men dus, daar er zo veele voorbeelden zijn, wanneer men middelen heeft, om het bloed te stelpen, zonder kwaade toevallen te vreezen, aan dezen den voorrang niet geeven (\*)?

De vleesch- en zaadbreuken, welken gemeenlijk tot de castratie aanleiding geeven, zijn dikwijls met de waterbreuk gepaard. Het gebeurt menigmaal, dat de oefenende Heelmeesters de waterbreuk met de vleeschbreuk verwisfelen en eerst na het openen van den zak hunne dwaling zien (aa). Als men den zak der waterbreuk geheel in zijnen ganschen omtrek geopend heeft en den bal knoestagtig bevind, gaat men tot de

(\*) In het algemeen geloof ik, dat de zaadslagader wegens eene bloedstorting niet zo zeer te vreezen is. L.

(aa) [ Wanneer de Balzak door het water aanmerkelijk uitgezet en gespannen is, is het zeer moeilijk, ja veelal onmogelijk, den bal te kunnen voelen; en daar door kan het zomwijlen gebeuren, dat wanneer de zak van het water ontlast is, men als dan nog den bal zonder verwagting kan ontäart vinden. — Het gebeurde onlangs hier ter stede, dat een beroemd Heelmeester den zak opende, in verwagting dat de bal ontaart was, doch de opening gemaakt zijnde, vond men den bal in eene gezonde hoedanigheid, maar den geheelen binnen omtrek van het celleweefzel des zaks op eene verbaazende wijze geindureerd en ontäart: dit dagt men door vernielende en wegnagende middelen te verbeteren, dan de dood des lijders maakte er spoedig een einde van. ]



castratie over; maar als dezelve onbeledigd is, laat men hem gerust liggen en verbind de wond volgens gewoonte, gelijk wanneer men de castratie gedaan heeft. Als men de eenvoudige waterbreuk volkomen wil heelen, moet men den zak in zijnen geheelen omtrek open snijden; want de enkele doorboring belooft alleenlijk eene palliative of schijnbaare heeling. MORAND raad, den helsthen steen aan de ballen te brengen, en zegt, dat dit veel zekerer zij, dan de bloote insnede, voornaamlijk in eene waterbreuk van gewoone grootte (\*).

---

## AGTSTE HOOFDSTUK.

*Van de operatie der Phimosis en Paraphimosis.*

**D**E Phimosis is aangeboren of toevallig. Als het hoofd der roede wegens de te nauwe opening der voorhuid niet kan ontbloot worden, noemt men dit ongemak eene *aangeboren Phimosis*. Om dit te opereeren, moet men eene met eene sleuf voorziene sonde tusschen de voorhuid en het hoofd der roede inbrengen, het vel der voorhuid over de sonde uitspannen, de punt van een incisiesmes langzaam in de sleuf stuuren en de voorhuid aan de zijde open snijden. De wond geneest even als alle eenvoudige wonden, en men kan zig tot de-

(\*) *Opuscles de Chirurgie de Mr. MORAND, deuxième partie. p. 180.*

ze operatie ook van eene wél aangezette schaar bedienen (\*).

Men vind zomwijlen kinderen, bij dewelken de voorhuid zig in eene kleine opening eindigt, welke met eenen kraakbeenigen ring omgeeven is en de pis slegts in eenen kleinen dunnen straal door laat. In dit geval neemt men met het incisiemes de kraakbeenige hardigheid weg, na dat men de voorhuid op de sleuf der sonde doorsneden heeft. Ik heb eens onder de voorhuid van een vijfjaarig kind, het welk zulk een Phimosis had, agttien steentjes uitgenomen, welken zo groot als linzen, glad en gepolijst hier ingesloten waren en zig door het ophouden der pis hier gevormd hadden.

Eene of meer kankeragtige pokkige zweeren aan de binnenvlakte der voorhuid of om de kroon van het roedenhoofd, veroorzaaken gemeenlijk eene toevallige Phimosis. Om dat ongemak te verdrijven en de zweeren bloot te maaken, zo dat men er bekwaame middelen kan opleggen, moet men, even als in de aangeboren Phimosis, de voorhuid ter zijde doorsnijden. Maar,

(\*) Als de voorhuid zo nauw of met zo veele pokagtige wratten en uitwasfen bezet is, dat men er geene sonde kan onder brengen, moet men de buitenhuid, welke gemeenlijk de voornaamste oorzaak der spanning is, voorzigtig doorsnijden; zo men bespeurt, dat de nauwte vermindert, kan men de sonde altijd nog onder de voorhuid brengen en de operatie volvoeren zo als onze schrijver die voorschrijft; maar in het tegengestelde geval moet men de geheele voorhuid allengs tot op het roedenhoofd doorsnijden. Zie *Traité des Operations de Chirurgie par BERTRANDI traduit de l'Italien par SOLIER DE LA ROMILLAIS. Paris, 1769. 8°, p. 241. L.*

als er harde of eeltagtige deelen zijn, moet men ze met het incisiemes wegneemen.

Een volwassen persoon, die eene aangeboren Phimosis heeft en, het roedenhoofd willende ontbloten, de voorhuid geheel over hetzelfde terug trekt, kan dezelve niet ten eersten weêr voorwaard trekken, om het roedenhoofd te bedekken; de al te nauwe opening der voorhuid knelt, als zij over het roedenhoofd gebragt is, het roedenhoofd, zo dat er ras eene ontsteking ontstaat, welke, indien men deze gespannen plooï niet doorsnijdt, met eene versterking eindigt. En dit is het geen men Paraphimosis [venuskroon] noemt.

De operatie bestaat daar in, dat men de huid, die het roedenhoofd knelt, op de regte of op de linke zijde doorsnijdt, om de knelling weg te nemen en de toevallen voor te komen. Om nu de voorhuid gemaklijk over het roedenhoofd te rug te brengen, zonder het roedenhoofd of deszelfs kroon te kwetzen, brengt men voorzigtiglijk een klein geknopt incisiemes onder de gespannen plooï der voorhuid, welks snede men naar de zijde tegen de plooï rigt. Indien de deelen zo gezwollen waren en de knelling reeds zo ver gekomen was, dat men met geen mogelijkheid het geknopt incisiemes onder de voorhuid kon brengen, zou men moeten tragten het einde van eene fleuffonde er in te brengen, en op deze het incisiemes bestuuren. In geval dit ook onmogelijk was, zou men op de gespannen plooï eene insnede met het incisiemes moeten maaken, doch wél zorg draagen, dat men de kroon niet beledige (\*).

(\*) Ook is het kwetzen van het sponsagtig lichaam zeer

Voor dat men tot de operatie overgaat, moet men de middelen gebruiken, welken de kunst tot het weekmaaken der deelen voorschrijft, als herhaald aderlaaten, weekmaakende en verzagtende pappen, baden der roede in melk, afkookzel van maluwe enz.

Er kunnen kwaadaartige pokkige zweeren, welken aan de binnenvlakte der voorhuid of aan de kroon van het roedenhoofd zitten, met de Paraphimosis gepaard gaan, en dit is eene reden te meer om de operatie te doen, ten einde de toevallen wegteneemen, de zweeren te ontblooten en de behoorlijke middelen aantewenden (*bb*).

## NEGENDE HOOFDSTUK.

### *Van de doorboring.*

**D**E doorboring geschied met het lancet of met den troicar, om water of een vogt, in eene holligheid of in een enkel deel verzameld, te

te vreezen. 'ANDRE' drukt het roedenhoofd slegts een weinig zamen en trekt aanstonds de voorhuid daar over. L.

(*bb*) [De vernauwing, *Phymosis*, zo wel als de opstrooming der voorhuid, *Paraphymosis*, kunnen uit eene spoedig aangebragte venerische ontsteeking haaren oorsprong nemen, en vereischen in een dusdanig geval (buiten dringende omstandigheden) zeldzaam de operatie. Eene aderlaating, inwendige verkoelende middelen, de Gompkwik, en uiterlijk een bad of stooving uit de Mercuriaale melk, of uit de ontbinding der opgeheven bijtende kwik, *merc. subb. corr.*, in water, zal gemeenlijk genoeg zijn om deze toevallen te herstellen.]



ontlasten. Om het water uit den buik van een waterzugtig mensch af te tappen, bedient men zig liefst van een troicar, en dan noemt men deze operatie *Paracenthesis*. De lijder moet op eenen stoel zitten, en te weerzijde moet een helper staan, om den buik aan beide zijden zamen te drukken, op dat het deel, het welk men doorboren wil, meer gespannen zij; eindelijk moet men in agt neemen, dat de punt van den troicar de binnendeelen niet kwetse, gelijk het eenen Heelmeester gebeurde, van denwelken de heer MORAND (\*) verhaalt. De Heelmeester plaatst zig op eenen stoel over den lijder, voorziet zig van eenen troicar, die in eene pijp of buis zit, en welken hij in olie moet dopen; dan stoot hij denzelfden op eens in den buik, trekt hem uit de pijp (cc), en het water, 'het welk men in eenig vat ontvangt, loopt af. Als de lijder niet in staat is, te zitten, laat men hem op de zijde, daar men de doorboring wil doen, op den kant van het bed liggen en den buik door eene matige drukking spannen, het welk een helper verrigt. Naar dat het water meer of minder sterk afloopt, moeten de helpers den buik op zijde sterker of zagter drukken, ten einde het water door de pijp te drijven en deszelfs uitvloeijing te bevorderen (dd).

(\*) *Opusculs de Chirurgie, Tom II. p. 179.*

(cc) [Wanneer men den troicar uit zijne buis wegneemt, moet men met de linke hand de buis vatten en ondersteunen; anderszins zoude dezelve ligtelijk, zo door het uitrekken van den troicar, als door het aanperzend water, uit de opening geraaken, en aan den Heelmeester nieuwe moeite en den lijder pijn veroorzaaken.]

(dd) [Om de uitvloeijing van het water te bevorderen

Indien het mogt opstoppen, brengt men eene geknopte sonde in de pijp, om de deelen, die zomtijds de opening bezetten, terug te stooten. Zo dra het water ophoud met loopen, neemt men er de pijp uit, en om dit met minder pijn te doen, legt men de linke hand op den buik, dat de pijp tusfchen de twee voorste vingers doorgaat, en de hand tegen den buik drukkende, trekt men dezelve met de regte hand daar uit.

De plaats, die men tot het doen van deze doorboring moet verkiezen, is juist het middenpunt der lijn, die van den navel tot de voorste kam van het darmbeen, het zij aan de linke of aan de regte zijde, kan getrokken worden. Zomtijds is men genoodzaakt, de doorboring op eenige plaats van den omtrek des onderlijfs te maaken, waar men duidelijk de beweeging van eenige vloeibaarheid bespeurt, als bij voorbeeld, in eene zakwaterzugt, daar men zomwijlen twee, ja zelfs drie doorboringen op verscheiden plaatzen moet doen, om de onderscheiden met vogten gevulde zakken te ontledigen (\*).

Tot het verband na de aftapping van het water behoren eenige compresfen, een lijfband en een fchouderband.

en tevens te verhoeden dat de lijder zo ligt niet flauw worde, neemt men eenen langen op twee hoofden opgerolden breeden zwagtel, welks midden van agteren boven de lendenen word aangelegd, zo dat de rollen van voren elkanderen verwisfelen kunnen; en na maate het water ontlaf, word toegehaald. Dit geschied zo lang tot dat de geheele buik van boven tot onderen bewonden is. — Anderen neemen hier toe een servet, welke zij van tijd tot tijd meer toehaalen.]

(\*) *Opuscles de chirurgie, Part. II. p. 213.*

Als deze operatie gedaan word, zo als ik ze beschreven heb, is dezelve op geenerlei wijze gevaarlijk of aan kwaade gevolgen onderhevig. Wanneer veele waterzugtige lijders, bij dewelken het water zig in de holte des buiks uitgestort heeft, het gunstig gevolg niet ondervinden, dat zij er zig van beloofd hadden, is het gemeenlijk, wijl zij dezelve te lang hebben uitgesteld en te laat doen onderneemen. Zo dra men bescpeurt, dat het water zig uitgestort heeft, sta ik de paracenthesis voor, en veele waterzugtigen, die mijnen raad volgden, zijn geneezen: gelijk ik verscheiden voorbeelden daar van zou kunnen bijbrengen (ee).

(ee) [Wij kunnen bij deze gelegenheid niet afzijn, aan alle jonge Heelmeesters de voortreffelijke spreuk: *de ziekte wel gekend, is half geneezen*, te herinneren, en bij gevolg nimmer eene operatie te onderneemen, voor dat aan hun het gebrek en de noodzaaklijkheid derzelve blijkbaar is. — Een ongelukkig gevolg, door dit te verzuimen, hebben wij aan een bejaard man gezien, bijwelke de verstopping en ophooping van het darmkanaal voor een buikwaterzugt wierd aangezien en behandeld. De Heelmeester stelde op aanraaden van den Geneesheer .... de operatie in het werk. Dan wat was het gevolg? de trocar, die met veel moeite en pijn in de holte van den buik wierd ingebracht, gaf door zijne buis geen water uit: men onderzocht met een Stilet naar de oorzaak, en men vond voor deszelfs punt een gespannen vliesagtig lichaam, dit dagt men een bijzondere zak der waterzugt te zijn, dan de Heelmeester was egter zo voorzigtig, dezen niet te openen, en staakte dit vrugtelooze werk. — Het darmgestel gangreneerde, en na weinige dagen ontlastten zig de excrementen door den stoelgang in zo eene verbaazende hoeveelheid, dat wel dra de opgezette en gespannen buik weg zonk, en de lijder spoedig in de eeuwigheid overging.]

Men pleegt de doorboring met een troicar ook in eene waterbreuk van eenen aanmerklijken omtrek te onderneemen; maar, als het gezwel klein is, bedient men zig liever van een lancet. Deze doorboring schijnt gemeenlijk het ongemak slegts voor eenigen tijd wegteneemen; doch om het volkomen te geneezen, is het beter, naar aanleiding van MORAND, hellschen steen op het gezwel te leggen (\*).

(\*) Behalven den troicar, het lancet en het bijtmiddel, welk de heer ELSE voornaamlijk aanbeval en gebruikte, zie *An essai on the Cure of the Hydrocele of the tunica vaginalis testis* by JOSEPH ELSE, Lond. 1770., en OLOF AKRELS *chirurg. vorfälle*, 2. B. S. 443., bedient POTT zig tot de oorspronkelijke geneezing der waterbreuk van een haarsnoer. Zie *The chirurgical works of PERCIVALL POTT. Vol. III. Lond. 1779, 8. p. 1.*, en RICHTERS *chirurg. Bibliot.* 1. B. 4. Stuck. S. 22. SCHMUCKER genas eenige waterbreuken van het scheedevlies door de doorboring en door de kort daar op ondernomen snede. Zie *Chirurg. Wahrnehmungen*, II. Th. Berlin, 1778, S. 310. Ik heb volgens de wijze van ELSE en ook volgens die van POTT waterbreuken van het scheedevlies der ballen zien geneezen, egter zoude ik die, daar men het ongemak door de snede onderneemt te geneezen, hoven dezelve verkiezen. De elastieke troicar, door den heer ANDRE' onlangs voorgelagen, verdient niet veel gebruikt te worden. Zie *Account of an elastic trochar — For tapping the Hydrocele or watery rupture — by JOHN ANDRE', Lond. 1781. 8.* THEDEN maakt onder aan het gezwel eene opening en steekt tusschen de ballen en de scheede eene zachte wiek. Zie *Neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunst. II. Th. Berlin 1782. 8°. L.*

[De Engelsche Heelmeester VAUX geeft verscheide proeven op, welke hij met de *Seton* van POTT en het brandmiddel van ELSE gezien en zelve gedaan heeft; doch in allen behaalde het laatste, zo om de minder verwekte pijn, ontsteeking, koorts e. z. v. als wel om deszelfs spoediger en



Het gebeurt zomwijlen, dat het water van eenen waterzugtigen den weg neemt, dien anders de darmen in breuken pleegen te neemen, zig in den balzak verzamelt en eene waterbreuk vormt. (\*) In zulk een geval maakte ik de doorboring en tapte agt pinten water uit het onderlijf, het welk door den buikring afliep; want de lijder had eene breuk gehad, welke ingebracht was, en zedert dat hij waterzugtig was, niet meer uitging.

Men kan de doorboring met den troicar ook in de borstwaterzugt doen. De plaats, daar men de doorboring moet doen, moet dezelfde zijn, welke men bij de operatie der etterborst verkiest, van dewelke ik hierna zal spreken.

Men maakt ook van de doorboring met den troicar gebruik in de pisblaas, wanneer het in geval van het ophouden des waters niet mogelijk

zekerder geneezing, de voorkeur. In *the works of ELSE* publisf. bij G. VAUX. 1782. p. 92. vinden wij eene waarneming van eenen lijder, bij wien PORT de waterbreuk door de Seton herstelde, doch het toeval keerde wel dra weder, en de lijder nam zijne toevlugt tot den heer ELSE, die door het brandmiddel dezen lijder gemakkelijk en volkomen genas. Dit middel van den heer ELSE bestaat uit een mengfel of pap, zamengesteld van *Zeepefaders loog, Heul-fap en levende kalk*. Zie hier verder over het *agfte deel* der *Geneesk. Biblioth.* van den Hoogleeraar SANDIFORT. De wijze van den heer THEDEN, betrekkelijk dit onderwerp, gelooven wij, behoudens de agting, die wij voor dien beroemden Duitschen heelarls hebben, dat meer in een toevallig geluk, dan wel op wisse gronden haaren steun heeft. — Dan in alle deze gebreken moet de aart van het gebrek, gepaard met eene bedaarde oordeelkunde, de keuze, om de operatie op de eene of andere wijze te verrigten, den Heelmeester leiden.]

(\*) *Opuscles de Chirurgie, Part. II. p. 180.*

is, de sonde in te brengen. Hier van zal ik in het twaalfde hoofdstuk afzonderlijk spreken.

## TIENDE HOOFDSTUK.

### *Van de fistels aan den Aars (ff).*

**E**R zijn tweeërlei wijzen om de fistel aan den aars te opereeren. De eerste wijze is, dat men door de uitwendige opening der fistel eenen stom-

(ff) [De aarsfistel is *volkomen* of *onvolkomen*. Volkomen zegt men, wanneer de opening zo wel in den omtrek van den aars als binnen den regten darm (*intestinum rectum*) gevonden word; onvolkomen is zij van tweeërlei aart, als onvolkomen met eene inwendige opening, die alleen in den darm uitkomt, en onvolkomen met eene uitwendige opening op de eene of andere zijde van den aars, zonder gemeenschap met den regten darm te oefenen. — Het is hier de plaats niet, om over de oorzaaken e. z. v. dezer pijpzwereen te spreken, de werken der meeste Heelkundigen geeven hier genoegzaame kenmerken van op. Dan tot gemak van min belezenen, zal ik de korte, doch klare en volledige beschrijving der tekenen dezer onderscheiden fistels van den heer D. VAN GESSCHER overneemen. „ De „ eerste wordt gekend, zegt hij, aan den doorgang van „ het Tentijzer, of van eenig ingespooten Vogt tot in de „ holte des Endeldarms, en de ontlasting van drekstof door „ de uiterlijke opening der Pijpzwear. De tweede, aan „ eene ontlasting van etter door den Endeldarm, gevoegd „ bij eene roode vlak, verharding, of ettergezwel in eenig „ gedeelte van den omtrek des aars. De laatste, aan het „ doorgaan van het Tentijzer tot aan de buitenste oppervlakte des Endeldarms, en het niet uitwerpen van eenige „ drekstof door de opening der Pijpzwear”. *Hedend. algemeene oeffenende Heekunde. deel I. §. 399.*]

pen, geknopten en wél gegloeiden draad, welke flap en buigzaam is, in brengt; en tevens den voorsten vinger der regter of linker hand in den aars steekt en het einde van den draad door de opening voert, welke inwendig in den darm is (gg).

Zo dra het einde van den draad aan den vinger sloot, welke in den aars is, is men verzekerd, dat deze door de inwendige opening der fistel gegaan is; men sloot dien derhalven met de hand, waar mede men hem houd, verder door, zo dat men hem met den vinger, die in den aars is, gemakkelijk ombuigen en met zijn einde er uithaalen kan. Nu sloot men den draad zo ver voort, dat hij met zijn einde uit den aars komt, voegt daar op de beide einden zamen, vat ze met de linke hand, trekt ze een weinig naar zig, en snijdt met een incisiemes, dat eene bolle snede heeft, alles weg, wat zig tuschen de luts van den draad bevind, ja zelfs een weinig van den darm, welke boven de inwendige opening der fistel is, door welke de draad ging; men snijdt zelfs tot in het vleeschig deel van den aars, zo dat men eene kleine insnede maakt in de gedaante van eene groeve, die ter afvloeiing bestemd is. Als er harde of eeltagtige deelen zijn, neemt men die insgelijks weg. De wond vult men dan met zagt plukzel,

(gg) [Onze schrijver veronderstelt hier en veelal doorgaans in dit Hoofdstuk eene *volkomen* aarsfistel te behandelen. Dan indien dit zo niet was, en de opening wel binnen, doch niet buiten gevonden werd, moet men op de meest tekenende plaats met het lancet eene opening maaken, en dus de onvolkomen alvorens in een volkomen fistel veranderen.]

en eenige compresen en het T verband maaken de toebereidzelen tot het verband uit.

Het is niet altijd mogelijk, de inwendige opening te vinden, den draad door te haalen en de luts te vormen, van dewelke ik gesproken heb. In dit geval raaden zommige Heelmeesters aan, zig van eene puntige sonde te bedienen, met dewelke zij den darm doorboren ter plaatze, daar dezelve het dunste en van zijn celledweefzel het meest ontbloot is, het welk men met den vinger ontdekt, die men in den aars brengt, en tegen denwelken men de punt der sonde sloot, daar de darm het dunste is.

De zwarigheid, om met het einde der sonde de opening te vinden, daar de darm zig met den fistelzak vereenigt, heeft eenige oefenende Heelmeesters overreed, als of in dit geval de fistel in het geheel geen gemeenschap met den darm had en zij hebben uit dien hoofde zulk-eene fistel eene zig *inwendig eindigende* genoemd: doch de ondervinding en waarneemingen hebben geleerd, dat in eene waare darmfistel de darm altijd doorboord moet zijn en dat de zwarigheid, om er eenen draad in te brengen, alleenlijk van de wijze dezer doorboring afhangt. Deze begint gemeenlijk in de binnenvlakte der darmen met eene kleine opening, welke als het begin van den hals eens tregters gevormd is, den aarsdarm langs deszelfs dikte doorboort en zig vervolgens eenige lijnen in het celledweefzel verlengt en als in den fistelzak zweeft. Ik heb deze tregtervormige fistel, welke FOUBERT voor mij waargenomen heeft, in het lijk van iemand, die aan eene borstontsteking overleden was, en eene darmfistel had,

waar-



waarover hij mij om raad had gevraagd , waar-  
 genomen en onderzocht. Men kan derhalven  
 gemakkelijk bevroeden, dat het moeilijk, ja zelfs  
 onmogelijk is, met het einde van den draad, wel-  
 ken men door de uitwendige opening der fistel  
 inbrengt, de kleine opening te vinden, welke de  
 tregtervormige fistel sluit, om den draad hier door  
 in den darm te trekken. Deze zwarigheid, ge-  
 lijik FOUBERT aanmerkt, heeft aanleiding gegee-  
 ven, om te gelooven, dat men geen door-  
 boorde plaats kon vinden, en dat de fistelzak in  
 het geheel geen gemeenschap met den aarsdarm  
 had. Als men de opening, welke uit den darm  
 in den fistelzak gaat, zonder veel moeite vind,  
 komt zulks daar van, dat het celledweefzel, uit  
 het welk de tregtervormige loszwevende fistelzak  
 ontstond, door de verettering vernietigd is. Als  
 het gat, het welk men met de sonde moet ma-  
 ken, in het geval, waar van wij nu spreken,  
 boven de opening gemaakt is, zal men de fistel  
 kunnen geneezen; maar, als het onder dezelve  
 gemaakt is, zal men de opening met de snede van  
 het incisiemes niet kunnen wegneemen en de fis-  
 tel zal ook niet kunnen toeheelen. Wijl men nu  
 geen vasten regel heeft, volgens welken men den  
 darm regt boven de opening kan doorboren, is  
 de volkomen geneezing der fistel, wanneer men  
 zig van deze wijze wil bedienen, ten hoogste on-  
 zeker; want, als men de plaats niet weet, waar  
 de opening is, dan kan men het gat te hoog of  
 te diep, of ook op zijde maaken; ook heeft de  
 ondervinding zelve getoond, dat zo dikwijls men  
 den draad door het fistelgat van den darm heeft  
 gebragt, de fistel volkomen geneezen is, en dat

veeltijds fistels overgebleven zijn, wanneer men den darm met de sonde doorboorde, wijl men waarschijnlijk het gat boven of op zijde van de opening gemaakt had. Het is derhalven eene wezenlijke zaak in deze operatie, den draad door de opening te brengen, door dewelke de winden en vloeibaare vuiligheden uitgaan, welken in den fistelzak schieten; zonder dat kan men op geen zekere geneezing der fistel staat maaken. Doch wijl men het leven en de gezondheid der menschen niet aan het bloot toeval mag onderwerpen, moet men de wijze, volgens welke men, om de fistel te geneezen, een gat door den darm boort, geheel verbannen.

Misfchien zullen er nog eenige Heelmeesters gevonden worden, welken verzekeren, dat zij op deze wijze veele fistels geneezen hebben. Ik zou hun even zo veele gevallen kunnen verhalen, in dewelken ik, nog niet beter onderrigt zijnde, deze operatie, in dewelke men met de sonde den darm doorboort, met goed gevolg heb ondernomen; maar, schoon ik dit geluk gehad heb, zo geloof ik egter, dat ik het altijd aan het blind geval te danken heb gehad.

Doch, om den draad er te kunnen inbrengen en in den darm te voeren, moet men door het uitwendig fistelgat inspuitingen met laauw water maaken, ten einde de fistelzak zig uitzette en verwijde, en deze inspuitingen moet men eenige dagen agter een herhaalen, en als men het noodig oordeelt, op zommige dagen twee of driemaal. Het snel in den fistelzak gespoten water, wanneer men, zo veel mogelijk, deszelfs uitvloeijing door de plaats, daar het den minsten tegenstand vind,

belet, poogt er uit te loopen; of, wyl men het door de uitwendige opening of daar men het einde der spruit ingezet heeft, niet laat uitloopen, moet de plaats, daar het den minsten tegenstand vind, juist in den darm zijn; daar het tregtervormig beweeglijk fistelëinde is. Dit gebogen en als door de daar op drukkende masla van water zamen gerold tregtervormig einde, word naar de plaats des darms, daar het zig opent, gedreven, keert zig even als de vinger van eenen handschoen om en gaat in den darm; als men er nu op nieuw water in spuit, schiet het door en komt in den aarsdarm uit. Men kan dan met weinig moeite den draad door de naauwe tregtervormige fistel brengen, welke alsdan eene vrije opening aanbied, die gemakkelijk te vinden is.

Om deze operatie behoorlijk te verrigten, moet men den lijder eene gevoeglijke houding doen neemen. Zommige Heelmeesters leggen hem op den voet van een bed, zo dat de voeten op den grond komen, doch het lichaam op de kussens rust: anderen leggen hem op den kant van het bed, op dezelfde wijze, als wanneer men iemand eene klijfsteer zet; als de fistel aan de regter zijde van den aars is, legt men den lijder op de regter zijde, en als dezelve aan de linker zijde is, legt men hem op de linker zijde. In deze laatste houding moet de helper op het bed dicht bij den lijder knielen, met beide handen den bil des lijders vatten en opligten, ten einde de deelen vrij te maaken en ze des te beter aan het oog van den Heelmeester bloot te stellen. Wanneer de fistel ter zijde van het staartbeen of omtrent den bilnaad is, legt men den lijder op den voet van het

bed, zo dat de voeten op den grond komen, doch het lijf op het bed blijft liggen, en dan moeten twee helpers, de eene ter regter, de andere ter linker zijde, de billen van een sperren. Deze verschillende houdingen kunnen naar de onderscheiden gevallen haare voordeelen hebben en derzelve keus hangt van de bekwaamheid des Heelmeesters af.

Zommige Heelmeesters pleegen ook, na dat zij het eerste verband geligt hebben, eene soort van wiek in de wond te brengen, welke zij nu uit meer, dan uit minder lang plukzel vervaardigen en op eene geknopte sonde of eene tang, die van eenen ring voorzien is, leggen, om dezelve, met digestief bekleed, des te gemaklijker in den aars te kunnen steeken. De ondervinding heeft mij geleerd, dat deze enkel uit naast elkan- der liggende plukzeldraaden zamengestelde en gemaakte wiek tegen het oogmerk is, waartoe men ze in de wond brengt, en dat deze veel eerder heelt, wanneer men slegts een weinig droog plukzel daar op legt en een zagt dotje plukzel onder eenige compresen en het T verband vast- maakt (*bb*). Al de volgende verbanden moeten

(*bb*) [Men is somtijds verplicht den darm zeer hoog, ja in deszelfs vleeschige gedeelte te doorsnijden; hier bij kan het ligt gebeuren, dat er eene meer dan gewoone bloeding volgt. In zo een geval bedient men zig van eenig bloedstempend middel, waar meê de wicken bestrooid of vogtig gemaakt worden: dan dit niet genoeg zijnde, maakt men gebruik van het voorschrift van den heer POUTEAU, namelijk, men neemt eene drooge spons aan een sterken draad vastgemaakt, en brengt dezelve boven de wond zo hoog op in den aars als mogelijk is, vervolgens vult men de wond en den aars met droog, doch zagt plukzel, stijf op, dan



op de zelfde wijze gemaakt worden, zonder dat men zalf of digestief gebruikt.

De tweede wijze, om de fistel aan den aars te opereeren, is die met de onderschepping, welke CELSUS en AMBROSIUS PAREUS beschreven hebben, doch FOUBERT op nieuw aanbevolen en verbeterd heeft. Zij bestaat daarin, dat men eenen looden draad door het uitwendige fistelgat en van daar door het inwendige in den darm brengt, uit den welken men hem door den aars uittrekt; men voegt daarop de beide einden zamen, draait ze in een, trekt deze luts allengs door het om-draaijen der draaden meer zamen en snijdt het overtollige van den looden draad met eene schaar af.

Om den draad door te trekken, bedient men zig van een zilveren steeltje, het welk aan het eene eind een knopje heeft en aan het andere een oog van vier of vijf lijnen groot en zo wijd, dat men er het eene eind van den looden draad door kan haalen. FOUBERT noemt dit instrument zijnen lardeerpriem (*larδοιρε*). Om dezen looden draad in dezen priem vast te maaken, is het genoeg, dat men het oog van denzelven met kleingestoten lak vult en het einde aan de vlam van eene kaers houd, zo dat het lak smelt. Als het gesmolten is, steekt men het eind van den looden draad in het oog van den priem en zo dra het lak koud geworden is, is de draad zo vast daar in, dat hij niet los zal gaan.

trekt men de spons door middel van den draad terug, terwijl men met de andere hand het plukzel steunt; verzekerende dat alles verder door genoegzame compressen en het T verband.]

Als men de fistel met de sonde onderzoekt, om te weten, hoe dezelve gesteld is, en haare opening, welke den darm doorboort, niet kan vinden, moet men inspuitingen maaken, gelijk ik dit bij de eerste wijze heb voorgeschreven: want in deze wijze van opereeren is het volstrekt noodzaaklijk, den looden draad door het inwendige fistelgat te brengen, even zo als men in de eerste wijze den draad er door trekt. Naar maate de luts, welke de looden draad maakt, door de verettering, waar door de sleuf, in dewelke dezelve ligt, verteert, slapper word, het welk men om de twee, drie of vier dagen duidelijk kan bespeuren, maakt men deze luts naauwer, door den draad nog meer in een te draaijen; alleenlijk moet men zig wagten, denzelven niet al te veel zamen te draaijen, ten einde geen pijn te veroorzaken, op dewelke eene ontsteking zou kunnen volgen. Indien het uitwendige fistelgat te ver van den aars verwijderd ware, maakt men, om het afvallen van den looden draad des te gemaklijker te maaken en de fistel des te eerder te geneezen, eene kleine incisie van dit gat naar den aars, of men ligt er veelëer de huid ter breedte van een paar lijnen een weinig af, om den looden draad te leggen. Eene compres en het T verband maaken het geheele verband uit.

Bij het verband moet men egter ook inzonderheid op de zindelijkheid agt geeven, en de wond bij elken stoelgang met eene spons of eenen nat gemaakten doek afwaschen en behoorlijk reinigen (ii).

(ii) [Voor dat men deze operatie verrigt, is het altoes

Het zagtlijk zamentrekken en de verettering, welke deze soort van doorgetrokken draad (*Seton*) veroorzaakt, verteert allengs het geen met den draad onderschept is, zo dat deze den vijftienden, twintigsten, of vijf en twintigsten dag van zelve afvalt en de fistel volkomen geneest.

Gedurende de behandeling kan de lijder gaan, wandelen, zijne zaaken verrigten en behoeft geen strengen leefregel in agt te neemen, waar op bij de eerste wijze van opereeren naauwkeurig gelet moet worden.

Ik heb verscheiden fistels op deze wijze geneezen; onder anderen genas ik eenen leerjongen van eenen snid, welke eene fistel had met verscheiden fistelkanaalen en eeltagtige deelen verzeld, in minder dan eene maand, zonder dat hij eenen bijzonderen leefregel hield, en zonder het smeeden en paarden beslaan te behoeven na te laten.

De Heelkunst en het menschdom moeten het den heer FOUBERT met erkentenis dank weeten, dat hij deze wijze van de fistel te opereeren vernieuwd en tot volmaaktheid gebragt heeft.

Men kan zekere soorten van fistels met bijtmiddelen behandelen en geneezen, anderen met den looden draad, en wederom anderen met het snij-dend instrument. De keus, om het behoorlijk

goed den lijder de eerste wegen doorbekwaame *Purgantia* of *Clysmata* te ontlasten. En wanneer dezelve na de operatie ter stoelgang genoopt word, moet men het verband alvorens afneemen, en na de ontlasting de wond met eene spons, in laauw water en wijn gedoopt, zuiveren en op nieuw verbinden.]

middel aan te wenden , hangt, gelijk MORAND (\*) aanmerkt , af van de bekwaamheid des Heelmeesters en van de soort van fistel , die men moet opereeren (\*\*).

(\*) *Opusc. de Cbir. II. Partie, p. 156.*

(\*\*) Veelen houden het in de operatie der fistels aan den aars met de onderschepping, anderen met de snede. Zo veel is zeker: de snede eindigt op eens de operatie, de onderschepping houdt de geneezing op en veroorzaakt meer en aanhoudende pijnen. Als de fistel niet hoog is, is zulks het best: men vat ze op eenen zilveren draad en snijd ze met den draad gelijk weg; maar als zij hoog is, zal de onderschepping eerder aan te raaden zijn en men zal in dergelijke gevallen den draad nog hooger, dan de inwendige opening ligt, moeten doorboren. Een voornaam gebrek bij de geneezing der fistels is, dat men gemeenlijk bij het verband te veel wicken en plukzel gebruikt en daar door de geneezing pleegt te hinderen. POTT (*chirurgical Works, Vol. III, p. 3.*) bedient zig van een krom geknopt incisiesmes, het welk in de meeste gevallen gebruikbaar is. Verscheiden instrumenten tot operatie van de aarsdarmfistel, welken men allen niet kan aanbeveelen, kan men vinden in *Jo. Alex. Brambilla Instrumentario chirurgico Viennensi Fol. Tab. LI. & LII. L.* [Men ontmoet somtijts Pijpzweeren, welke met de blaas door middel van den Pisweg gemeenschap hebben. Eene voorgaande *Gonorrhœa Virulenta*, het graveel, scheurbuikige ongesteldheid der vogten, of wel het een of ander gebrek van den Pisweg moet als de oorzaak hier van aangemerkt worden. Verscheide gaatjes in den omtrek van den aars bij den bilnaad, waar door de pis zig ontlast, zijn er de kenmerken van. Dan deze soort van fistels, zijn gewoon den Heelmeester veel moeite tot derzelver geneezing te verschaffen; en moeten, na dat altoorens de bron der ziekte is weggenomen of verminderd, door de operatie en in den pisweg gebragte verwijdende kaarsjes geholpen worden.]



## ELFDE HOOFDSTUK.

*Van het Catheterismus, of de wijze om de sonde in de blaas te brengen.*

**M**EN vind dikwijls beletzelen, welken het inbrengen der sonde hinderlijk zijn. De oogen van onze gewoonlijke Catheters beletten zomwijlen, dat zij niet in de blaas kunnen gebragt worden. Wanneer de pisbuis [*urethra*] zig over de sonde zamentrekt op het oogenblik, dat men er dezelve inbrengt, voornaamlijk in eene opstopping van het water, zet zig het binnenvlies der pisbuis, het welk slap en rimpelig is, in de holle oogen der sonde. De overleden PETIT, welke dit gebrek der gewoone fonden kende, bedagt er eene voor zig zonder oogen. Hij liet aan het einde van den draad, die op den mond der sonde paste, een knopje vast maaken, door middel van het welke hij de sonde nauwkeurig kon sluiten en openen. Zo dra hij ze in de blaas gebragt had, stiet hij den draad voort, waar door het knopje zig van den mond der sonde verwijderde en de pis, schoon de draad in de sonde bleef, uitvloed: zo dra de blaas ledig was, trok hij den draad een weinig te rug, om door deszelfs knopje den mond der sonde behoorlijk te doen sluiten, en deze naar zig te kunnen haalen, zonder nadeel te doen. Maar, dewijl de blaas, wanneer zij ledig is, zamen valt, zo is het wel gebeurd, dat het

knopje, wanneer men den draad terug trok, kleine verslapte en rimpelige deelen van het binnen-vlies dezes ingewands vatte en met zig voerde, welken op deze wijze aan den mond der sonde waren geklemd. Nu was het in dit geval onmogelijk, de sonde er uittrekken, zonder het vlies te scheuren, aan het welk zij vast hield. De overleden LA CHAUD, Heelmeester te Parijs, verbeterde derhalven den catheter van PETIT, ten einde dit ongemak te vermijden. Hij liet namelijk deze sonde zó maaken, dat de draad met een knopje voorzien was, het welk door de holte der sonde tot aan derzelver mond kon gebragt worden, zo dat het knopje denzelyen zeer naauwkeurig sloot en met zijn eind de gedaante van eenen ongeldroffel maakte en dus even als de gewoone catheter gevormd was (kk). Deze sonde, welke het gebrek der eersten niet heeft, brengt men in de blaas, trekt er dan den draad uit en de pis loopt af. Zedert dat ik de sonde van LA CHAUD ken, bedien ik mij van geen andere en verkies ze altijd voor de gewoone catheters (\*).

(kk) [Zie eenen zodanig verbeterden Catheter van den heer LA CHAUD bij J. Z. PLATNER *Handl. tot de chirurgie*, pl. III. fig. 35.]

(\*) In het voorbijgaan moet ik hier evenwel ook melding maaken van den buigzaamen catheter van den heer THEDEN, welken hierin de zilveren overtreffen, dat zij gemakkelijk in het gebruik zijn en zonder eenig ongemak eenen geruimen tijd in de pisbuis kunnen gehouden worden. Zie *Sendschreiben an den Herrn Prof. Richter in Göttingen die neue erfundenen Catheter aus der resina elastica betreffend von dem Königl. Preuss. General-Chirurgus Theden*, Berl. 1777. 8. Te Parijs heb ik bij den heer BEA-

Als ik de sonde in de blaas wil brengen, laat ik den lijder op zijn bed, of op den kant van het

NARD dergelijken gekogt, die ze voor de zijnen en dus voor eene Fransche uitvinding uitgaf. Een bewijs van de weinige letterkundige kennis der Franschen. In Engeland hebben zij ze ook reeds. De meeste oefenende Heelmeesters, welken ik over deze uitvinding heb hooren spreken, houden ze niet voor zeer gebruikbaar, en de reden, die zijer van geeven, dat zij namelijk in de warmte uitzetten, dat zij breeken en stukken in de blaas kunnen terug laten, schijnt mij veel gewigt te hebben. L. [Het gevaar, dat de heer LUDWIG in het gebruik der buigzaame Catheters schijnt te stellen, blijkt bij ons zo volledig niet. Wel is waar, dat de wijze, waar op de heer MACQUER dezelve allereerst vervaardigde, zie *Hist. de l'Acad. R. des Sciences de Paris, Année 1768. pag. 209. & suiv.*, zeker niet geheel van gevaar ontbloot was; dan hier in heeft de beroemde THEDEN voorzien. Zie den aangehaalden brief (door LUDWIG) aan den Hoogleraar RICHTER; en tot beter gebruik daar van heeft de konstminnende D. VAN GESSCHER dezelve tot meerder volmaaktheid gebragt. — Deze Catheters worden bereid uit de *veerkragtige harst van Caijenne*, welke in de *naphtha vitrioli* of in de *Spiritus Aetherens Frobenii* ontbonden is. Met deze ontbinding bestreken de heeren MACQUER en THEDEN hunne daar toe bereide vormen; dan de spoedige drooging dezer harst deed hunne Catheters altoos eenē ongelijke gedaante aanneemen. Dit gebrek heeft de heet GESSCHER dusdanig verbeterd, „ Ik vulle, zegthij, eene „ glazen buis, die de lengte heeft van een voet, en eene „ middenlijn van 9 of 10 lijnen, met de ontbonden harst „ van *Caijenne*, een gouden draad, die met zijde bekleed, „ en om een ijzeren staaf van behoorlijke dikte en lengte, „ slangirekkig, en met de uiterste naauwkeurigheid gewonden is, doe ik bij herhaaling in deeze buis nederzakken, „ en daar uit gaan, tot de gansche oppervlakte der metaalen buis, gelijkelijk, en dik genoeg gedekt is met de harst. „ Het een en ander, ik wil zeggen, de Metaalen buis en „ de Staaf, aan een draad opgehangen, laat ik zoo lang „ vereenigt blijven, tot het harstagtig bekleedzel der eerste, „ eenen genoegzaamen trap van vastheid gekreegen heeft. Do



bed of van eenen stoel plaatzen, vat de manlijke roede met de linke hand, en met de regte hand breng ik de wél met olie bestreken sonde in de

„ staaf als dan daar uitgenomen zijnde, wordt deszelfs  
 „ plaats bekleed door een dunne zilveren draad, wiens eene  
 „ einde geknopt is, en in het geheel gelijk aan die van de  
 „ Catheter, door den zeer beroemden PETIT uitgevonden.  
 „ De zeer groote uitrekbaarheid deezer gedeeltelijk metaa-  
 „ len, gedeeltelijk harstagtige blaassonde, gevoegd bij de  
 „ noodzaaklijkheid, om den Lijder, die daar van gebruik  
 „ maakt, te bevrijden van eene geduurige ontlasting der pis,  
 „ langs de holte van dit werktuig, maaken het gebruik van  
 „ den geknopten draad onvermijdelijk. Zie *Heelkundige  
 Mengelstoffen* bladz. 384 en volg.

Het is te bejammeren, dat deze Catheters door onze Heelkundigen niet meer gebezigd worden: het voordeel, dat dezelve boven de gewoone zilveren Catheters hebben, is te aanmerkelijk om ze niet aan alle oefenende Heelmeesters aan te prijzen; men zie hier over de taal van den beroemden THIEDEN in het zo even genoemde werk. — Dan mogelijk is de moeite en koste om dezelve te bereiden, oorzaak van het weinig gebruik derzelven. Men vind in *Esprit des Journaux* Fevrier 1780. pag. 356., dat de heer BERNARD te Parijs Catheters van deze harst ten gebruike voor Heelkundigen zamenstelt; ook heeft de heer THIEDEN te Berlijn zig hier toe aangediend, en wij twijffelen geen oogenblik of ons Nederland levert ook mannen op, die uit liefde voor de konst en ten nutte van hunnen evenmensch, dit werk, namelijk het zamenstellen van Catheters, voor min geoefenden op zig zouden willen neemen: ook vertrouwen wij, dat de heer A. GOBELS, zeer beroemd instrumentmaker te Amsterdam, door de onderrigtingen van den heer GESSCHER genoegzaam tot derzelver bereiding zal in staat gebragt zijn. — De geheele Historie van deze harst kan men vinden in de *diff. Chem. Inaug. de resina elastica Cajanensi*. Traj. ad Rhen. 1780. van den te vroeg door den dood weggerukte heer A. JULIAANS. Zie ook een uittrekzel hier van in het *genees-natuur en huishoud-kundig kabinet, tweede deel, bladz. 332 en volg.*]



pisbuis en draai haare bogt naar boven. Terwijl ik het roedenhoofd om hoog ligt, ga ik in dien stand voord, met de sonde, zo ver als mogelijk is, in te brengen, en als haar eind tot omtrent den bilnaad gekomen en digt bij den hals der blaas is, maak ik eene halve wending met de sonde van de linke naar de regte hand, dat is, ik maak het geen men de *meesterlijke wending* noemt; druk dan de bogt der sonde naar den lijder toe, en vervolgens keer ik die weêr naar mij toe en maak op deze wijze kleine bewegingen, op dat het einde der sonde op de bogt der pisbuis zou kunnen komen en in de blaas glijen. Want juist hier aan den hals der blaas is het voornaamlijk, waar het einde der sonde beletzels vind, welken haar hinderen, wanneer men ze inbrengen wil.

Het vlies, het welk de pisbuis inwendig tot aan de sluitspier bekleed, is eene verlenging van dat, het welk de blaas inwendig bekleed, is ook even als dit uit een flap, verslensd celledweefzel zamengesteld en gerimpeld. Nu stoot de punt der sonde ligtlijk op zulk eene plooi, wikkelt zig en blijft in eenen kleinen dus gevormden zak hangen en kan haaren weg niet anders vinden, dan wanneer men ze voordschuift en het geen zig haar tegenstelt, aan stukken stoot. In dit geval, hoe weinig geweld men gebruikt, maakt men het geen men eenen valschen weg pleegt te noemen.

In eene opstopping van het water vind men dikwijls zulke plooiën van het voorste gedeelte der voorstaanders tot aan de sluitspier der blaas, en hier is het juist ook, dat de sonde den meesten tegenstand ontmoet, wanneer men ze wil inbrengen; want zo dra zij tot aan de sluitspier ge-

bragt is, kan men ze, schoon de zamentrekking, welke in eene opstopping van het water hier plaats heeft, tamelijk groot is, egter met weinig moeite in de blaas brengen, wijl zij door geen plooijen meer tegen gehouden word.

Zo dra ik derhalven merk, dat de punt der sonde stuit en niet verder voord kan, wagt ik mij zorgvuldig, om mij met geweld tegen het weêrstand biedende te verzetten. Ik doop den voors-ten vinger der regte hand in olie en breng dien in den aars; als dan houd ik de sonde met de linke hand, trek ze een weinig terug, ten einde haar uit de plooi te brengen, die haar tegenhoud, en door kleine bewegingen met de sonde en met den vinger in den aars te maaken, bewerk ik, dat zij tot aan de sluitspier geraakt. Als ik bespeur, dat zij zig niet laat voordstooten, span ik met den duim der regte hand, welke zig op den bilnaad moet bevinden, en met de vingers der linke hand de pisbuis over de sonde uit en ontplooi op deze wijze het vlies, het welk den hals der pisblaas inwendig bekleed, zo dat deze plooijen hier door weg gemaakt worden. De vinger, dien ik in den aars heb, en met welken ik de sonde door de daar tusfchen liggende deelen voel, helpt mij ook nog de plooijen uit dit vlies doen en maakt den weg naar de blaas voor de sonde gemaklijker.

Eene voornaame zaak, die men bij het inbrengen der sonde in de blaas in het oog moet houden, is, in het geheel geen geweld te gebruiken, zodra de lijder pijn voelt. Want in deze pijnlijke oogenblikken, welken het inbrengen der sonde veroorzaakt, verstijft de lijder en krijgt eene kramp; al de deelen zijns lichaams trekken za-

men, de sluitspier en de spiervezelen, die de pisbuis omgeeven, trekken zig ook zamen, zo dat de sonde door al de deelen gekneld is, en dienvolgens niet voordgestooten kan worden, en indien men deze belerzelen slegts een weinig met geweld uit den weg wilde ruimen, zou men de pisbuis beschadigen, het bloed zou er uitloopen, en men zou eenen valschen weg baanen. Om nu dit kommerlijk toeval te vermijden, moet men het oogenblik der verslapping afwagten, het welk op de verstijving volgt en den lijder de strengste rust aanbeveelen. Want als dan gaat de sonde, als zij niet meer beklemd is, gemakkelijk in de blaas.

Indien de pisbuis door verhardingen, knobbels of dergelijken zo zeer vernauwd mogt zijn, dat men er in het geheel geen sonde kon inbrengen, moet men zig van waschkaarsjes bedienen. En in dit geval moet men, wanneer de toevallen van opgehouden water te dringende zijn, tot de doorboring der blaas overgaan.

Wanneer men in eene ophouding van het water, die van eene ontsteking verzeld is; de sonde in de blaas heeft gebragt, moet men ze niet op ééne plaats laten blijven, ten minsten niet, wanneer zij niet buigzaam is, gelijk onze sonden; maar zij moeten oogen hebben, zo dat haare punt, welke een knopje maakt, de blaas niet beledigt. Ik heb verscheiden toevallen van opgestopt water zien aanhouden, waar van niets anders, dan het verblijf der sonde in de blaas oorzaak was. Om die reden moet men in deze gevallen niet eens eene buigzaame sonde in dezelve laten (11).

(11) [ Tot het verrigten dezer Operatie heeft men onder



---

 TWAALFDE HOOFDSTUK.

*Van de doorboring der blaas.*

**I**N eene opstopping van het water, in dewelke de banden en verdere middelen vrugtloos aangewend worden, en het onmogelijk is, de sonde in de blaas te brengen, blijft er geen ander middel over, om het leven van den lijder te behouden, dan de doorboring der blaas [*punctura Perinæi*].

Onder al de wijzen van doorboring der blaas is er geen beter, dan die van FLEURANT, welke POUTEAU (\*) beschreven heeft. Ik heb ze met goed gevolg met den troicar van den heer FOUBERT gedaan, wijl ik die van FLEURANT, welke

scheiden soorten van Catheters: als daar zijn grooten, middenmaatigen, kleinen, dikken, dunnen, stijven, slappen e. z. v. alle na de gesteldheid der voorwerpen, en waar van de keus aan het oordeel des Heelmeesters, naar de omstandigheid van het onderwerp, moet afhangen. Dan wij kunnen niet afzijn, aan te merken, dat men het gebruik der dunne Catheters, zo veel mogelijk is, vermijde; de *urethra* verwijd zig genoeg voor het inbrengen eener middenmaatig dikke sonde, en zal hier door minder gekwetst worden, dan men van eene dunne te wagten heeft.

De Schrijver maakt in dit Hoofdstuk geen gewag aangaande het sonderen bij vrouwen. Dan, dewijl de behandeling hier omtrend niets bijzonders in zig heeft, zullen wij dezelve met stilzwijgen voorbijgaan; wijzende den Lezer, onder anderen, voornamelijk naar de werken van de heeren LE DRAN, SHARP, HEISTER, PLATNER enz.]

(\*) *Mélanges de Chirurgie.*



welke oneindig beter daar toe geschikt is, voornaamlijk zedert dat hij denzelven nog meer verbeterd heeft, niet had. Ik geloof derhalven niet beter te kunnen doen, dan wanneer ik de behandeling, zo als deze Heelmeester ons die bij deze operatie beschrijft, in haar geheel met zijne eigen woorden voordraag.

Een man van zeven en vijftig jaaren werd door eene opstopping van water hevig aangetast, en de heer FLEURANT verrigtte in tegenwoordigheid van den heer CHARMETTON, zijnen amptgenoot, aan denzelven de doorboring der blaas op de volgende wijze. Dit was de derdemaal, dat hij dezelve met gewenscht gevolg in het werk stelde.

„ Ik leg den lijder ” (dit zijn de woorden van den heer FLEURANT) „ bijna in evenwigt „ op den kant van het bed, laar hem zijne beenen buigen, van elkander verwijderen en door „ de helpers houden, als dan breng ik den voort „ ten vinger der linke hand, welken ik met olie „ bestrijk, in den aarsdarm, zo ver als het mij „ mogelijk is; als ik tegen over de blaas ben, daar „ dezelve voornaamlijk van water opgezet is, „ vat ik met de regte hand eenen krommen troicar, welken ik insgelijks met olie bestrijk, en „ verberg deszelfs punt geheel in het buisje, breng „ hem langs mijnen vinger tot aan de blaas, sloot „ de greep van den troicar onbeschroomd voor „ waard, zo dat de punt er uit komt, en nu laar „ ik den steel en het buisje te gelijk, ten minsten „ een duim lang, in de blaas gaan; daar op trek „ ik den vinger uit den aars en den troicar uit „ het buisje en zo loopt het water tot den laas.

„ ten droppel uit door het buisje, het welk ik vast  
 „ houde. Wyl men bij zulk eene gewenschte  
 „ hulp de vraag deed, waar men dit buisje kon  
 „ vastmaaken, bediende ik mij ten eersten, van  
 „ twee garen koordjes, die ik te weerszijde door  
 „ de doorgebroken zijden van het paviljoen trok  
 „ en voor en agter aan eenen lijfgordel, dien ik  
 „ tot dat einde aangedaan had, vastbond. Den  
 „ volgenden dag, toen de lijder, welke slegts  
 „ zeer weinig pijn gevoelde, wilde opstaan, viel  
 „ het buisje inwendig te rug en ik lei er derhal-  
 „ ven een T verband, het welk van den balzak  
 „ af dubbeld was, nevens eenige dubbel gevou-  
 „ wen compresen op, het welk de gewenschte  
 „ werking had.

„ Als de lijder ter stoel wilde gaan, nam ik  
 „ het T verband af en hield het buisje, het welk  
 „ ik in de hoogte schoof: maar, daar het zo  
 „ moeilijk is, aan alle wenschen ten eersten te  
 „ voldoen, klaagde de lijder, welke zig een dag  
 „ te voorengelukkig agtte, wanneer hij maar een  
 „ weinig water kon lozen, thans, dat het water on-  
 „ ophoudelijk liep. Met weinig moeite verhielpen  
 „ wij dit ongemak door middel van een houten  
 „ stop, die de opening van het buisje digt sloot en  
 „ dien men er slegts vier of vijfmaal's daags uitnam.

„ Van het oogenblik der operatie af bevond de  
 „ lijder zig steeds beter, de halve baden, week-  
 „ maakende en verzagtende inspuitingen in de blaas  
 „ en eenige glazen cassiedrank bevorderden de  
 „ geneezing nog meer; den derden dag begon de  
 „ pis haaren gewoonen uitgang te neemen, den  
 „ vierden nam ik er het buisje uit en behalven

„ eenige weinige droppels pis, welken daar bij  
 „ er uitvloeiden, liep naderhand niets meer door  
 „ den aars uit.

„ Een voornaame regel bij deze operatie is,  
 „ dat men de nabij gelegen deelen behoorlijk in  
 „ agt neemt. Onder dezen zijn er, die zonder  
 „ groot nadeel beledigd kunnen worden, anderen,  
 „ welker belediging dodelijk is en waarbij het ge-  
 „ vaar zig oogenbliklijk vertoont: doch, er zijn  
 „ nog anderen, die in het eerst niet gevaarlijk  
 „ schijnen en welken, schoon beledigd zijnde,  
 „ niet te min aan het oogmerk, dat men zig van  
 „ de operatie belooft, hinderlijk zijn en waar van  
 „ de gevolgen zig eerst naderhand vertoonen; het  
 „ zij door de zwarigheid, om het ongemak vol-  
 „ komen te geneezen, of de stremming der werkin-  
 „ gen, welken deze werktuigen volbrengen. Der-  
 „ gelijken zijn bij deze operatie de zaadblaasjes:  
 „ men weet, dat dezen aan den aars en de beneden  
 „ deelen der blaas liggen, daar deze zig met den  
 „ aarsdarm vereenigt, zo dat men ze zeer ligt  
 „ kan doorbooren, wanneer men op deze plaats  
 „ den troicar in de blaas stoot. Het ongemak  
 „ hiervan zou juist niet groot zijn, het zou niet  
 „ onmogelijk wezen, dat al deze openingen zig  
 „ weer toefloten en dat de afgescheiden sappen  
 „ derzelver gewoonlijken uitgang hielden; maar  
 „ het zou ook kunnen gebeuren, dat er zig een wei-  
 „ nig pis in zette en dit toevallen veroorzaakte, of  
 „ het zaad zou eenen tijd lang daar uit ontsloopen  
 „ kunnen. Het behoort derhalven tot de volko-  
 „ menheid dezer operatie, dit ongemak, indien  
 „ mogelijk, te vermijden, en dit kan men doen,  
 „ wanneer men omzigtig is en den voorsten win-

„ ger, welke tot een leider dient, zo dra moge-  
 „ lijk, in den aars juist in het midden brengt; want  
 „ alsdan raakt men de blaas boven de zaadblaas-  
 „ jes en men behoeft den troicar slegts tot aan het  
 „ eind van den vinger te brengen. Ik heb reeds  
 „ gezegd, dat, wanneer men het instrument be-  
 „ hoorlijk wil aanbrengen, men de scherpe punt  
 „ van den troicar moet terug trekken, op dat de  
 „ punt, geheel en al in het buisje verborgen, den  
 „ darm niet kwetse. Dit vordert ook, dat wij  
 „ de voorzigtigheid gebruiken, de greep van het  
 „ puntig ijzer niet voord te stooten, voor dat men  
 „ daar mede aan de blaas gekomen is. Om dit  
 „ te bereiken, vat ik het instrument zó, dat ik,  
 „ de greep in de hand houdende, den steel daar  
 „ van tusfchen den voorsten en middenften vin-  
 „ ger laat doorgaan, en hem tevens met den  
 „ duim houde; de andere vingers en de binnen-  
 „ vlakke der hand dienen om het instrument voord  
 „ te schuiven, waar van men ten minsten het buisje  
 „ zeven of agt lijnen mag instooten, ten einde  
 „ het zelve niet zo ligtlijk uit de blaas zou kunnen  
 „ vallen.

„ Maar ten aanzien der deelen, die der ope-  
 „ ratie onderworpen worden, behoeft men niet  
 „ te vreezen, dat die kleine wond van gevolgen  
 „ kan zijn. De plaats, daar men ze maakt, het  
 „ zij in den aarsdarm of in de blaas, word een  
 „ weinig dikker en vleeschiger, gesteld men na-  
 „ dert de sluitspier, daar de vleeschvezelen zig  
 „ in groote menigte vereenigen. Ook heeft men  
 „ geen gevaar van eene bloedstorting te vree-  
 „ zen (*mm*).

„ (*mm*) [ Dat de heer FLEURANT het geluk gehad heeft,



„ Na de operatie heeft men verder geen voor-  
 „ schriften te volgen, dan dat men het buisje te  
 „ deeg vast maakt, op dat het niet uit de blaas  
 „ valle, voor dat de pis weërhaaren natuurlijken  
 „ weg genomen heeft, en dat men den lijder voor-  
 „ schrijft, daar op te letten, wanneer de grove  
 „ stoffen door den aarsdarm gaan. Hij kan het  
 „ dan vast houden, het welk des te eer kan ge-  
 „ schieden, wijl hij een gedeelte der banden, die  
 „ het verzekeren, moet afneemen. De overige  
 „ nog nodige behandeling betreft het hoofdonge-  
 „ mak, het welk men volgens de vereischte re-  
 „ gelen moet heelen.

„ Zou men „, zegt de heer FLEURANT einde-  
 „ lijk „, deze operatie ook niet aan vrouwsperfoonen,  
 „ in geval van eene onoverwinlijke opstopping  
 „ van het water, welke door gezwollen in de  
 „ pisbuis zou kunnen ontstaan, in het werk kun-  
 „ nen stellen. De moederschede, welke men in  
 „ dit geval moest doorbooren, zou tot geen meer  
 „ gevaarlijke toevallen gelegenheid geven, dan

van nimmer eene aanmerkelijke bloedstorting bij deze ope-  
 ratie waar te neemen; is niet genoeg om een besluit op te  
 maaken, dat men voor dezelve geen vrees behoeft te  
 hebben: het tegendeel is ons, daar deze operatie door de  
 hand van een ervaren Heelmeester verrigt was, gebleeken.  
 Een heer van aanzien kon, bij een onvoorzien toeval, vol-  
 strektlijk noch door de natuur noch door de konst eenig  
 water uit de blaas door de *urethra* ontlasten. De toeval-  
 len wierden dringende, en men besloot tot de *Punctura*  
*Perinæi*. Een onzer beroemdste Heelmeesters verrigte de ope-  
 ratie; doch met dat gevolg, dat eene aanmerkelijke bloed-  
 storting, die onmiddelijk volgde en eenigen tijd aanhieldt,  
 het leven van dezen lijder met den dood deed verwis-  
 selen.]

„ de darm , en de afgang der vuiligheden zou  
 „ ook niet kunnen hinderen ”.

Voor dat ik dit hoofdstuk eindigde, schreef ik aan den heer FLEURANT, om te verneemen, of hij ook eenige verbeteringen aan zijnen krommen troicar, welken hij tot de doorboring gebruikt, gemaakt had, en hij vereerde mij met het antwoord, dat hij in plaats van een vast buisje zig thans van een buigzaam en doorgesneden bediende, het welk eveneens gemaakt was, als de buisjes van onze slappe catheters. Hij verzekerde mij, dat het buisje door deze verandering meer geschikt word, om zig naar de gedaante van den aarsdarm te rigten, en dat deze buigzaamheid maakt, dat het niet zo ligt uit de blaas valt, gelijk hem eens met het vaste buisje gebeurd was. Verders heeft hij ook de gebogen plaat, welke van geen nut was, weggedaan en in derzelver plaats er twee kleine ringen aan laten maaken, (zie pl. I. de 5 afbeeld.) welken dienen, om door twee gaten koordjes aan het T verband verzekerd te worden. Hij heeft ook opgemerkt, dat het bij volwasfen lieden zeer moeilijk valt, den troicar hoog genoeg te brengen om de zaadblaasjes behoorlijk te vermijden, om die reden heeft hij het instrument een duim langer laten maaken, dan de afbeelding op zijne plaat. Hij berigtte mij verder, dat hij van deze verbetering den hoogleeraar CAMPER te Groningen kennis gegeven had, welke bekend is door zijn voortreflijk werk: *PETR. CAMPERI Demonstratt. anatomico-pathologicarum*, Amst. 1760. fol., waarin hij dit instrument, van het welk hij zig met gewenscht gevolg bediende, heeft laten afbeelden. Ook zal deze nog eene verhandeling over die

verbetering aan den heer LOUIS, secretaris van de koningl. akademie der Heelkunde zenden, welke in het vierde deel der *Memoires* zal geplaatst worden (\*).

Het instrument is op de eerste plaat bij fig. 5 volgens de verbeteringen van den heer FLEURANT en naar de voorschreven lengte afgebeeld.

Ik heb juist tegenwoordig met den troicar van den heer FLEURANT de doorboring der blaas door den aars aan eenen man van drie en zeventig jaaren, in tegenwoordigheid van een' geneesheer en twee heelmeesters, ondernomen. De lijder had reeds in vijf dagen geen droppel waters geloosd. De onmogelijkheid om eenen catheter in de blaas te brengen, welke als een bal uitgezet was, de verstijfde leden, een aanhoudende hik en de nadering des doods deden mij besluiten tot de doorboring naar het voorschrift van den heer FLEURANT. Bij deze operatie tapte ik twee kannen zwartagtige pis af. De toevallen verminderden, het lichaam kreeg behoorlijke openingen de lijder werd van den dood gered (nn).

(\*) Ik heb deze verhandeling in de prijschriften niet kunnen vinden. L.

(nn) [ Men heeft van alle tijden deze operatie op onderscheiden wijzen verrigt: meestäl doorstak men met een tweesnijdend mesje, lancet of met een troicar het *Perinaeum* tot in den hals der blaas. Daarna nam de heer FOUBERT tot de zijdelijke doorsteeking zijne toevlugt, zie zijne *nieuwe manier van steensnijden* medegedeeld in de *memoires de l'Academie R. de Chir.* ned. vert. 2. st. bl. 278. en volg. De heeren SHARP, HEISTER, ULHOORN en meer anderen, doorsteken in een zodanig geval de blaas boven het schaambeent; de plaats daar men gewoon is den steen door den hoogen



---

 DERTIENDE HOOFDSTUK.

*Van de steensnede aan Manspersoonen.*

**H**ET hoofdoogmerk in de steenoperatie is, den steen uit de pisblaas te haalen. Voor dat

toestel te opereeren; en schrijven aan deze wijze veele voordeelen toe. Zie den krommen troicar tot deze operatie door den heer ULHOORN in zijne 13. pl. fig. 10. en 11. (geplaatst agter de *Heelk. onderw.* van L. HEISTER) afgebeeld. — Dan wij bekennen, dat de wijze, waar op de heer FLEURANT deze operatie verrigt, bij ons merklijk boven de anderen de voorkeur verdient: het water ontlast zig hier veel gemakliker uit de blaas, en de spieragtige gesteldheid van dit deel ter dezer plaatse verschafft eene veiliger en spoediger geneezing: beiden genoeg, om ons veelêr de operatie door de *anus*, dan boven het schaambeent te doen verkiezen. — In gebreken aan den hals der blaas, of in een of ander deel, waar op de werking van den heer FLEURANT moet verrigt worden, zou zij zomwijlen in derzelver uitvoering zo niet onmogelijk, egter zeer moeilijk kunnen zijn. In zo een geval, moet men de doorbooring boven het schaambeent, als de eenigste plaats tot redding, verrigten. Men zie de wijze dezer operatie bij SHARP *Oordeelk. Aanmerkingen*, bl. 225.

Om te weeten, of de troicar tot in de blaas is doorgegaan, maakt men volgens den heer FOUBERT, (zie de hier voorge-  
melde verhandeling, bladz. 295.) een sleufje in dezelve, waar door, zo dra de troicar in de blaas is, de pis langs en uitloopt: of, dat nog beter is, men maakt aan het eind van het kleine buisje, waar in de troicar bevat is, eenige kleine gaatjes, door welken, wanneer het zelve in de holte van de blaas gebragt is, het water in, en dus onder bij het handvat moet uitloopen. Zie J. DENIJS *obs. Chir. de Calculo*  
pag. 142. tab. XI.]



men tot de operatie zelve overgaat, moet men zig van de aanwezigheid des steens verzekeren, en zo veel mogelijk deszelfs grootte trachten te ontdekken. Dat er een steen in de blaas is, ontdekt men door de sonde, en om de grootte te bepaalen, brengt men den vinger, zo dra men de sonde in de blaas gebragt heeft, in den aars; door den vinger en de sonde is men in staat om van deszelfs grootte te oordeelen (oo). Als de steen

(oo) [ De kentekenen, dat er een steen in de blaas is, zijn niet altoos even zeker: eene geduurige perzing tot pisloozing, die zomwijlen met een straal, doch veelal drupsgevijs en met pijn uitkomt; zomwijlen loopende afgebroken ophoud; eene ontlasting van bloed, etter enz. door den pisweg; drukking op den aarsdarm; eene verligting van pijn na het drukken op den bilnaad; het gevoel van een hard, zwaar en beweeglijk lichaam in de blaas; jeuking aan het roede hoofdje; de waterloozing zomwijlen niet dan in eene zekere houding van den lijder; alle toevallen, die enkel of zamengesteld de aanwezigheid van den steen doen vermoeden: dan de zekere kenmerken zijn het werkelijk onderzoek door de sonde. Men brengt namelijk de sonde in de blaas, even als in het 11. hoofdstuk gezegd is, men doet den lijder overend staan, brengende den vinger in den aars, en ligt zo veel mogelijk is met denzelven de blaas op, daarna laat men de sonde verder doorglijden, en door eene beurtelingse beweging met de sonde en ingebragten vinger, zal men genoegzaam van de aanwezigheid, en zomwijlen zelve van de hoedanigheid en grootte des steens, door het gevoel en geluid op den zelven, kunnen oordeelen.

Men moet nimmer deze operatie onderneemen, voor dat men volledig van de aanwezigheid des steens overtuigd is. — Er zijn voorbeelden, dat men door de sonde den steen meende te voelen, men deed de operatie, en vond met de tang een hard vast lichaam, dat met geen mogelijkheid kon afgehaald worden, daarna bleek het, dat de lijder geen steen had, en het vastzittend lichaam de zeer binnenwaards staande punt van het staartbeen was. — De be-

van eenen aanmerklijken omtrek is, gelijk die, welken vier, zes, agt, tien en twaalf oncen weegen, zal men besluiten, om er hem met den hoogen toestel uit te haalen (pp). Wyl men deze onderzoeking niet altijd behoorlijk in het werk stelde, is het dikwijls gebeurd, dat de Heelmeesters, wanneer zij zulke steenen met den laagen toestel wilden uithaalen, hun oogmerk niet bereikten, door dien de steen te groot zijnde, niet door de nauwe opening van het bekken konde. Ik heb gevallen gezien, waar in men, om den lijder van den steen te ontlasten, welken hij ernstig verzocht er uit te haalen, denzelven met den hoogen toestel er moest uitneemen en dus den lijder twee operatiën doen ondergaan.

## §. I.

*Van de steensnede met den hoogen toestel.*

**O**M de steensnede met den hoogen toestel [*apparatus altus*] te verrigten, bereid men den

dem van de blaas is zomwijlen zo hard, dat wanneer dezelve tegen de sonde stuit, men ligtelijk zoude geloven, dat er een steen plaats had, zie hier van een voorbeeld bij J. DENIJS *Heelk. aanmerk. over het Steensnijden &c. bl. 19.* LEDRAN heeft alleen op dit verschijnsel lijders vrugteloos zien opereeren. *Operatiën der Heelk. blad. 213.* — SERMES verhaalt, dat hij, na dat hij een opening in de blaas gemaakt had, den steen meenende te vatten, een hard gezwel aantroef; het welk breekende veel etter uitgaf. Zie zijne aanm. op de *Lithotomia Douglassiana &c. pag. 4. S. 2.*

(pp) [Men vind, in het *Recueil de Medicine &c. tom. III. pag. 237. & tom. XVI. pag. 106.* waarneemingen van steenen, die twee ponden en meer zwaar waren.]

lijder eenige dagen van te voren, en wel door aderlaaten, afdrijvende middelen, als men die nodig oordeelt, door eenen verzagtenden en verdunnenden leefregel, halve baden en veel drinken van een aftrekzel van maluwe bloemen en andere verzagende kruiden; en dit geschied, om de vezelen der blaas te verzagten en derzelver rekbaarheid te bevorderen.

Den avond voor de operatie legt men eenen kleinen band om de pisbuis, gelijk bij voorbeeld dien van FOUBERT (qq), om zo veel mogelijk het water in de blaas op te houden, ten einde deze vliesige zak zig allengs uitzette. In geval er bij de operatie zelve water uit de blaas mogt zijn gelopen en wel zo veel, dat dezelve boven de schaambeenen geen zichtbare verhevenheid meer maakte, zo brengt men er eenen catheter in en vult met eene spuit door denzelven de blaas met afkookzel van maluwe, om dezelve zo veel mogelijk uittezetten; maar de manlijke roede laat men door eenen helper houden, om te beletten, dat voor de opening der blaas niets van de vloeibare stof, die dezelve bevat, uitloope.

Men moet de inspuitingen met veel voorzigtigheid doen; want eene blaas, die zedert langen tijd eenen steen besloten heeft, is gemeenlijk zamengerimpeld en rekt zig niet ligt uit (\*). Haa-

(qq) [Zie dezen band afgebeeld in de *Memoires de l'Acad. R. de Chirurgie*, vert. door TROUT 2 st. pl. I. fig. 4.]

(\*) Een bekwaam Heelmeester verhaalde mij een zeer leerzaam geval, het welk hier toe betrekkelijk is: het boven-deel der blaas namelijk was boven eenen grooten steen zo zamengerokken, dat de blaas door de benedenwaard ontstaane vereeniging als in twee holten verdeeld werd. De



re vezelen zijn minder leenig, dan die van eene blaas, welke niets of weinig geleden heeft, en kunnen gemeenlijk door de inspuitingen niet uitgezet worden, zonder de hevigste pijnen daar door te veroorzaaken. Doch in dit geval moet men in de operatie zo handelen, als ik hier onder zal opgeeven.

Men zal nu hier uit wel zien, dat ik niet van het gevoele van zekeren steensnijder ben, welke beweert, dat het voordelig is, de blaas, voor dat men tot de operatie komt, leedig te maaken, ten minsten niet, om hier uit te oordeelen, hoe veel men in de blaas moet spuiten, om dezelve op te vullen. Wij zouden hem met eene menigte gestaafde getuigenissen het tegendeel kunnen bewijzen, en hem door genoegzaame redenen, welken op de zamenstelling, schikking en het maakzel der deelen gegrond zijn en die de ondervinding en de waarneemingen bevestigen, kunnen toonen, dat zijn gevoele bedrieglijk is en hij zelf dwaalt.

De nodige toestel gemaakt zijnde, legt men den lijder op de tafel, die tot het steensnijden bestemd is, en bind hem vast, legt het hoofd en de borst verheven, op dat de regte spieren des buiks,

dood des lijders kwam, na eene moeilijke reis, de steenoperatie, welke juist stond ondernomen te worden, gelukkig voor; en bij het openen van het lijk bevond men, dat dezelve niet wel had kunnen in het werk gesteld worden. Men vind meer dergelijke gevallen waargenomen. Zie CHRISTIANI ZUBER *Disf. de vesicae urinariae morbis*, Argent. 1774. 4. c. f. [LEDRAN *operatiën der beelkonst*, bl. 201.] Men vind schier altijd in lijken, welker blaazen steenen bevatten, dezelve zamen gerimpeld en kleiner, dan naar gewoonte. Zie JO. SIG. MÜLLER *rarae de calculo vesicae observationem*. Arg. 1768. 4. c. f. L.



welken niet te zeer gespannen moeten zijn, door twee helpers zouden kunnen gehouden worden; een derde helper, die tegen over den lijder moet staan, brengt een' of twee vingers, met olie bestreken, in den aars, om den steen, op begeerte van den Heelmeester, die de operatie doet, op te ligten (\*); de Heelmeester, die aan de linker zijde van den lijder staat, vat de huid boven de schaamliden, om er eene dwarsvouw van te vormen, welke hij zelf met de linke hand aan de eene zijde vast houdt, en aan de andere door eenen helper, die aan de regte zijde van den lijder staat, laat vast houden, en met de regte hand, in dewelke hij een incisiemes met eene bolle snede heeft, snijdt hij deze plooï tusschen de vingers van den helper en de zijnen zo door, dat, wanneer de vouw wegvalt, men eene langwerpige snede van drie of vier vingeren breed heeft, welker onderste einde juist op de vereeniging der schaambeenderen eindigt. Hieropscheid hij met het zelfde instrument de regte en piramiedvormige spieren omtrent even zo ver, als hij de insnede in de huid gemaakt heeft, om de blaas te ontblooten. Als dan voelt hij met den vinger der linke hand de bijna geheel ontbloote blaas, welke als een gezwel te voorschijn komt, wanneer zij door pis of door middel van inspuitingen uitgezet is, en maakt met de punt en snede van het instrument,

(\*) Hier toe moet de helper gekozen worden, die de langste vingers heeft. Deze moet ook met de linke hand de manlijke roede houden, op dat de pis of het inspuitzel, gelijk ik boven gezegd heb, er niet uitloope. Men begrijpt ligtlijk, dat dit alleen plaats vind, wanneer de steen van eene zekere grootte is.

het welk hij met den vinger der linke hand bestuurt, onder den boog van het schaamlid eene kleine opening in de blaas: ik zeg eene kleine opening; want men moet wél letten, dat men ze naar evenredigheid van de grootte des steens maake, om redenen, die ik hierna zal bijbrengen, wanneer ik van de rekbaarheid der slappe vezelen van de blaas zal spreken. De pis of het ingespoten vogt ontlast zig dan door deze opening en de blaas valt zamen. In dit oogenblik beveelt hij den helper, welke een' of twee vingers in den aans heeft, den steen op te ligten; brengt dan aanstonds den voorsten vinger der linke hand door de opening in de blaas, raakt den steen aan, en brengt langs dezen vinger het verwijddend instrument (Pl. II 4. afb.), het welk hij met de linke hand houdt, tot in de blaas, en den vinger der regte hand brengt hij op de sleuf van het instrument, het welk naar het schaamlid gebogen is, in de blaas. Nu verwijdd hij allengs de kleine wond, die hij in de blaas gemaakt heeft, door de greep van het instrument met de linke hand, in dewelke hij het houdt, toe te drukken, en brengt den vinger der regte hand steeds verder in de blaas naar mate dat hij dezelve verwijdd. Als hij nu denkt, dat zij behoorlijk uitgezet is, verzekert hij de armen van het verwijddend instrument door eene schroef op dezelfde wijdde, als hij het uitgespannen heeft; en zet op de sleuf van het zelve den haak, met welchen hij den steen omkeert, ten einde dezelve met een van zijne einden voor de wond kome. Het verwijddend instrument, het welk nu van geen nut meer is, neemt hij er uit en brengt er eenen arm der tang in, welke naar een vroedmeesters

tang gelijkt; zo dra hij dezen arm aangelegd heeft, brengt hij er den tweeden in en omvat met beiden den steen, zo dat hij hem met de tanden en punten der tang grijpt. Als dan vereenigt hij de beide armen en verzekert ze met eene schroefmoer, welke op de spil der schroef A past (Pl. III. 3 afb.), op dezelfde wijze, als men de beide armen der kromme tang van LEVRET vereenigt, wanneer men het hoofd van een kind omvat, het welk tusschen de beenderen van het bekken gekneld is. Als men nu den steen in zijn kleine middenlijn wél gevat heeft tusschen de bladen van de tang, gelijk men in de derde afbeelding op plaat III. kan zien, trekt men van langzaamer hand den steen er voorzigtig uit. Onder het uithaalen van den steen moet een helper met de handen de randen der wond houden, om te beletten, dat dezelve geen lange puntige opening maake, en dat men bij het uithaalen van den steen de blaas niet van haare banden en celleweefzel, waar mede zij aan het bekken vast is, losscheure. Want dit zou gevaarlijke ettergezwollen kunnen veroorzaken; en men doet het ook om de traspwijze uitspanning der vezelen, welke bij het uithaalen noodzaaklijk is, en allengs de kleine wond der blaas van elkander spert, des te gemakliker te bewerken.

Een steen van tien tot twaalf onzen vult gemeenlijk de gansche holte der blaas, zo dat eene gewoone tang er niet dan met veel moeite ingebragt kan worden, wijl in dit geval de blaas den steen omvat, en van alle zijden omsluit. Als men er de gewoone tang inbrengt, kan men dezelve niet open doen, om den steen te vatten, zonder de

blaas te ftooten en te beledigen, welke zig niet ligt laat uitzetten, wyl zij in dit geval weinig rekbaar is. Om nu de toevallen te vermijden, welken uit deze behandeling zouden volgen, heb ik in plaats der gewoone tang die gekozen, welke op Plaat III. No. 3 afgebeeld is. Met dit instrument haal ik zonder moeite met den hoogen toefstel eenen steen van elf oncen uit, gelijk ik Plaat III. fig. 3. eenen dergelijken tusfchen de tang heb laaten afbeelden.

Als men zig van deze tang wil bedienen, moet men, gelijk ik reeds gezegd heb, de beide deelen van dezelve, het eene na het andere, tusfchen den steen en de wanden der blaas brengen, om den steen behoorlijk te omvatten, alsdan beiden door de fchroefmoër, welke op de fpil der fchroef past, en de beide armen, zo men wil vereenigd, zamenvoegen. Daar en boven heeft de ondervinding mij geleerd, dat het zeer gemaklijk is, het eerste stuk der tang er in te brengen; maar, dat het des te moeilijker valt het tweede aan te leggen, inzonderheid, wanneer de steen zeer groot is, en de wanden der blaas hem overal omfluiten. Om derhalven de operatie te bekorten en deze zwarigheden weg te neemen, heb ik een instrument laaten maaken naar den hoofdtrekker [*tire-tête*] van LEVRET, het welk op de III. Pl. fig. 1. en 2. afgebeeld is.

Zo dra men den steen met den haak omgekeerd heeft, om hem, geijk ik reeds gezegd heb, met een van zijne einden naar de wond te keeren, zo dat men hem kan vatten en in zijne kleine middelijn er uithaalen, breng ik de drie deelen van het instrument, welken vast bij elkander moeten liggen,



gen, gelijk men zulks op de III. Plaat, fig. 1. kan zien, tusſchen den ſteen en de wanden der blaas, zo als den eerſten arm van eene tang, en laat het allengs zo ver naar onder zakken, tot dat zijn eind aan het andere eind van den ſteen gekomen is, zo dat nu de ſteen van het eene einde tot het andere in den kring ligt, welken de deelen van het inſtrument moeten beſchrijven. Hier op maak ik de beide beweeglijke armen van het inſtrument los, den eenen naar de regte, den anderen naar de linke zijde, zo dat de ſteen op deze wijze door de drie deelen van het inſtrument omvat word, even als het hoofd van een kind, dat in de baarmoeder gebleven is, door den trekker van LEVRET omvat word. Als ik dan den ſteen zo gevat heb, haal ik er hem langzaam uit, even als of ik hem met de tang gevat had.

De buigzaamheid der armen van dit inſtrument maakt, dat de middenlijn van deze ſoort van ſlinger zig, onder het uithaalen van den ſteen, naar de grootte en geſtalte des ſteens als vormt. Men ziet hier uit ook, dat de middenlijn van den ſteen-trekker [*tire-pierre*] een weinig grooter moet zijn, dan die van den ſteen, dien men uithaalen wil, op dat de omtrek des ſteens het losmaaken der beweeglijke armen van het inſtrument niet verhindere, wanneer men het naar de linke en regte zijde buigt, om den ſteen te omvatten (\*).

(\*) Het is niet zonder reden, dat de heer hofſtaad RICHTER over dit werktuig van den heer LE BLANC niet voldaan is; hij zegt van hetzelfde in de *Chirurgiſche Bibliothek* I. L. S. 399. „Ja hij bedient zig zelfs, om den ſteen te vatten, en uit te haalen, zomwijlen van een inſtrument, het welk

In deze operatie is het dienstig, zig van twee of drie steentrekkers te voorzien, die van onderscheiden grootte moeten zijn, op dat men er éénen kunne kiezen naar de grootte van den steen. Maar, wijl de armen van deze steentrekkers buigzaam en niet gehard zijn, kan men dezen slinger, dien zij vormen, zo groot maaken als men wil, en naar de grootte van den steen, dien men vatten en uithaalen wil, inrigten.

Maar het is te verwonderen, hoe zeer de vezelen der blaas op de plaats, daar men de steensnede met den hoogen toestel wil doen, zig laten uitrekken, en hoe zeer zij verlengd kunnen worden, zonder te breeken. Om deze groote rekbaarheid dier vezelen sta ik voor, eene kleine incisie in de blaas te maaken, voornaamlijk, wanneer zij nog in een' gezonden staat is; want als zij reeds zamengerimpeld is, moet men ze grooter maaken, wijl de vezelen als dan minder rekbaar zijn, en om het scheuren dezer vezelen te verminderen, moet men er den steen geheel voorzigtig uithaalen, dewijl, indien men er hem te schielijk wilde uithaalen, de vezelen, in plaats van zig uit te rekken, zouden breeken. Ik heb in eene dergelijke operatie met alle omzigtigheid meer dan tien minuten lang aan eenen steen getrokken. Dezelve woeg meer dan elf oncen, en ik heb

„ naar den driebladigen hoofdtrekker van LEVRET gelijk.  
 „ Welk gemak en voordeel men zig van dit instrument kan  
 „ beloven, is voor mij duister ". Ik zou om die reden  
 deze plaat in de Hoogduitsche overzetting ook niet gevoegd  
 hebben, indien de schrijver in den tekst niet telkens naar  
 dezelve gewezen had. L.

hem op Plaat III. fig. 3. tusſchen de tang laten afbeelden.

Schoon nu de incisie in dit deel der blaas zeer klein is naar mate van den omtrek des ſteens, kan men er nogthans de grootſte ſteenen op dezewijze met meer gemak uithaalen, dan middenmatig grooten met den kleinen toefſtel; waar uit volgt, dat het celleweefzel van dit deel der blaas flapper en losſer moet zijn, dan het geen de ſluitſpier van dit werktuig uitmaakt, en dat het zig uit dien hoofde gemakliijker laat uitrekken.

Een kind van veertien of vijftien jaaren, het welk in het zesde jaar zijns ouderdoms de operatie van den ſteen ondergaan had, werd in ons ziekenhuis gebragt, om zig daar van den ſteen te laten ſnijden. Na dat ik door de ingebragte ſonde en door den vinger in den aars te brengen ontdekt had, dat de ſteen zeer groot was, en de geheele blaas ſcheen te vervullen, ja dat men hem zelfs met den vinger voelde, dien men boven het ſchaambeek hield, beſloot ik, hem met den hoo-gen toefſtel te opereeren.

Na dat ik een groot ſtuk van dezen brozen ſteen, welke, niet tegenſtaande al mijne voorzigtigheid, in de tang brak, nevens verſcheiden enkele ſtukken uit de blaas gehaald had, en de lijder zeer afgemat was, volgde ik den raad van FRANCO en MARET (\*), en deed den lijder weêr te bed leggen, wagtte, tot dat de ettering volkomen gemaakt was, om dan den ſteen, dien ik in de blaas gelaaten had, er uit te haalen. Eindelijk

(\*) *Disertation ſur la taille à deux tems*, welke gevonden word in de *Memoires de l'Acad. de Dijon*, Vol. I.

haalde ik er den vijftienden dag met weinig moeite eenen vasten steen van eene andere hoedanigheid uit, welke veel ouder scheen te zijn, dan de eerste, en over welchen de zagte steen zig aangezet had. Deze jongeling ons verhaalende, dat hij zig voor de tweede maal, eene maand na de eerste operatie, had willen laten opereeren, en dat hij zedert die operatie veel pijn van den steen geleden had, beslooten wij hier uit, dat de Heelmeester dezen steen toen in de blaas had gelaaten. Deze lijder bevond zig onder al de anderen het best, had niet eens eenen aanval van de koorts en de wond was den agtsten dag na het uithaalen van den harden steen volkomen hersteld.

Deze waarneeming en veele anderen, die ik zou kunnen bijbrengen, gelijk ook die, welchen andere Heelmeesters verhalen, moeten dezulken, die eenige bedenking maaken, om de steenoperatie met den hoogen toefstel te onderneemen, weêr daartoe aanmoedigen. Zij is ook tevens een nieuw bewijs, dat het in veele gevallen voordelig kan zijn, wanneer de operatie op twee onderscheiden tijden gedaan word, gelijk MARET voorsfelt. LOUIS heeft eene verhandeling over de steensnijding op twee onderscheiden tijden in eene akademische vergadering voorgelezen, waarin hij derzelver voordeelen aantoot. Ik hoop, dat hij dezelve in het licht zal geeven. (\*) (rr).

(\*) Deze verhandeling is tot heden, voor zo veel ik weet, nog niet in druk verschenen. L.

(rr) De Hoogleeraar CAMPER heeft aan de heeren GESSCHER, SWAGERMAN, MARTENS en HUSSEM, alle beroemde Amsterdamsche Heelmeesters, de wijze, waar op



Deze operatie met den hoogen toefel kan men nog veel gevoeglijker aan kinderen, dan aan be-

de heer LOUIS zijne operatie op den steen verrigt, in eenen brief medegedeeld, zie de *Heelk. Mengelstoffen* van J. VAN GESSCHER *bladz.* 71.

De voordeelen van de bewerking dezès Heelmeesters komen ons zo overtuigend voor, dat wij niet kunnen afzijn een klein uittrekzel van dezen brief mede te deelen: „ De blaas „ des lijders, ” zegt de heer CAMPER, „ ondergaat immers, „ tot het snijden toe, de allerhevigste prikkelingen, door „ de moeilijkheid van het wateren voor eerst, en ten an- „ deren, door het inbrengen des snijstafs, en meer andere „ werktuigen; waar door de geduurige toetrekking der ge- „ prikkelde deelen zoo sterk wordt, dat men op dit oogeen- „ blik niet dan met geweld in de blaas kan koomen, om den „ steen te vatten, en gevat zijnde, uit te haalen. Ook kan „ ik zeggen, hier op zeer zwaare toevallen te hebben zien „ volgen, zoo onder het uithaalen van den steen, als na- „ derhand: ofschoon zeer kundige en ervaarene handen de „ konstbewerkingen uitvoerden.

„ De heer LOUIS verzekerde mij, sedert eenigen tijd, „ geene lijders, aan die, anderzints zoo gevaarlijke konst- „ bewerking verlooren te hebben, om dat hij den steen „ niet langer aanstonds uithaalde; maar op den dag tot de „ Heelkonstige geneezing bestemd, alleenlijk op de wijze „ van HAWKINS, de uit- en inwendige snede tot in de blaas „ deedt. Deeze verrigt zijnde, dat hij als dan den lijder, „ als reets genoeg hier door afgemat, te bedde bragt, die „ door de opening in de blaas onderwijlen, aanstonds dit „ groot voordeel ondervondt, van het water gemakkelijk, en „ zonder smert te loozen; en derhalven geene hevige prik- „ keling en persing meer te gevoelen. ”

Verder vervolgt de heer CAMPER: „ des daägs na deeze „ bewerking, beschouwt hij de wonde naauwkeurig, en „ merkt zorgvuldig op, welke poogingen de wijze natuur „ reets gedaan heeft, of werkelijk doet, om den steen voort „ te stuwen. Hij wagt somwijlen tot den *derden*, *vierden*, „ zelfs tot den *vijfden dag*, eer hij met eenig werktuig den „ steen voorthaalt; 't welk als dan meestal zoo gemakkelijk,

jaarde lieden doen, wijl de blaas bij de kinderen nog zo diep niet in het bekken gezonken is; het is uit dien hoofde gemaklijker, boven het schaambeentje in de blaas van een kind, dan in die van een' bejaard' persoon te komen, en dat PIETER FRANCO bij de eerste steensnijding, die hij op deze wijze verrigtte, gemaklijk in de blaas kwam, zulks was, wijl hij de operatie aan een kind deed, welks blaas nog niet in het bekken gezonken was, schoon dezelve reeds eenen steen van de grootte van een hoendereij in zig besloot (ss).

„ en met zoo weinig smert voor den lijder gelukt, dat het „ alle geloof te boven gaat.

„ Zijn'er meer steenen dan één, zoo gebruikt hij dezelfde „ de voorzigtigheid, en wagt op de gunstige gelegenheid „ om wel te slaagen e. z. v. ”

Niet alleen is deze wijze van opereeren door de heeren MARET en LOUIS, zo als onze schrijver aanmerkt, verrigt; maar verscheide zo oude als hedendaagsche Heelkundigen, als de heeren, FRANCO, HILDANUS, MANGET, COLOT, HEISTER, SAVIARD, MOREAU, BERTRANDI en MARQUET hebben volgens het getuigenis van de heeren CAMPER en VAN GESSCHIER dezelve voorlang reeds voorgesteld en geöfend. Ook toonen de twee laatstgenoemde uitmuntende Heelkundigen voor dezelve te zijn. Zie ook een voorb. in de *Holl. maatsf. der wet. te Haarlem, d. XIX. st. 1, bl. 427.* door den heer G. TEN HAAF mede gedeeld. Wenschelijk ware het derhalven, dat deze wijze, die in alles de natuur zo regelmatig volgt, een gewigtig onderwerp voor verdere heelkundigen mogt uitmaaken.]

(ss) [ De operatie van den hoogen toefel is door PIETER FRANCO aan een tweejaarig kind, na dat hij alvorens de gewoone operatie vrugteloos verrigt had, het eerst ondernomen. Zie *traité des bernies à Lyon* 1561. Doch vervolgens door den heer ROSSET in zijne verh. *de partu Caesarea* 1590. met kragt voortgezeten aangedrongen, egter is dezelve tot in het begin dezer eeuw als slaapende gebleven, wanneer de heeren DOUGLAS, CHESELDEN, MORAND, LE CAT en meer anderen dezelve op nieuw na eenige verbeteringen in gebruik gebragt en geöfend hebben. — Er is zedert dien

Zo is ook de pisblaas der vrouwsperfoonen niet zo diep in het bekken gezonken, als die der mansperfoonen, en men komt gemaklijker boven de schaambeenen in de blaas van een vrouwsperfoon, dan in die van een' mansperfoon. Dienvolgens kan men ook veel gevoeglijker de operatie met den hoogen toefstel aan de eersten, dan aan de laatsten doen. Aan beiderlei geslacht is de operatie beter te doen aan dezulken, die groote blaazen hebben, dan aan de geenën, welker blaas niet groot is. Ik verkies altijd den hoogen toefstel, zo dra de steen van eene zekere grootte is. In het algemeen kan dezelve, schoon de omstandigheden anders dezelfden zijn, aan zo veele toevallen niet onderworpen zijn, als de steensnijding in den bilnaad (*perineum*) (\*) (*tt*).

Het buikvlies, het welk de blaas van boven overtrekt, moet met het instrument, dat men er inbrengt, niet beledigd worden. Als de blaas door inspuiting gevuld is, ligt het opperste gedeelte derzelve zig boven het schaamlid om hoog, zo dat het buikvlies, het welk haar overtrekt,

tijd veel getwist over het voor- of nadeel dezer operatie: veele beroemde mannen hebben hunne aandacht hier mede bezig gehouden. Wij zullen derhalven alleenlijk aanmerken, dat ingevalle de steen mogt geoordeeld worden zeer groot te zijn, wij als dan gelooven, dat deze operatie gemaklijker, spoediger en veiliger dan een der andere wijzen, kan verrigt worden.]

(\*) *Opuscles de Chirurgie de Mr. Morand. Part. II.*

(*tt*) [Zie over de voordeelen dezer operatie, en derzelver tegenwerpingen wederlegt, de *lithotomia Douglassiana*, vert. door SERMES, bl. 57. en volg. als ook SHARP Oordeelkundige aanmerkingen, bladz. 309. en meer anderen.]

ook mede om hoog geligt word, en daar door ontstaat tusſchen het ſchaamlid en de plaats, daar dit buikvlies vaſt is, eene ruimte, welke twee of drie vinger breed, en naar mate van de rekbaarheid der blaas meer of minder groot is, zo dat men eene incisie in dezelve kan maaken, zonder dat men den zak van het buikvlies raakt.

Als de blaas zamen gerimpeld is, zo dat men ze door inſpuitingen niet kan uifpannen, en geen merklijke verhevenheid boven de ſchaambeenen kan maaken, gelijk die was, uit dewelke ik den ſteen haalde, die op Pl. III. No. 3. tusſchen de bladen der tang afgebeeld is, en die van den jongeling, van wien ik boven geſproken heb, aan welken ik de operatie met den hoogen toefſtel deed, zo moet men met veel voorzigtigheid eene incisie boven het ſchaambeen maaken, en wel agt geeven, dat men het buikvlies niet kwetze, ten einde eene breuk te vermijden, die daar op zou volgen. Om dit nu te verrigten, belaft men eenen helper, welke een oft twee vingers in den aars van den lijder moet hebben, na dat men de regte en de piramiedvormige ſpieren doorgesneeden heeft, den ſteen om hoog te ſtooten. Hier op onderscheid men met den vinger der linke hand, welken men in de wond en onder den ſchaamboog brengt, zeer ligtlijk den ſteen door zijnen wederſtand en zijne hardigheid door de blaas, welke hem bevat, en dan maakt men even boven den ſteen, zo dicht als mogelijk is bij den ſchaamboog, de incisie in de blaas. Op deze wijze vermijdt men, den zak van het buikvlies te openen.

Zo dra ik er den ſteen uitgehaald heb, maak ik met het afkookzel van maluwe, door de wond,



Insputingen in de blaas, leg slegts een stukje fijn linnen over de wond, en hier over nog een zagt dotje van ruuw plukzel, doch over den geheelen buik leg ik een flanellen lap, dien ik in het zelfde afkookzel gedoopt en te deeg uitgedrukt heb; verders bedien ik mij nog van eenige compresen en den buikband, om dit alles te verzekeren. Met de insputingen houd ik vier of vijf dagen aan, en laat den lijder op de zijde, of zelfs, zo veel als het mogelijk is, op den buik liggen. Als nu den vierden of vijfden dag de pis niet meer door de pisbuis uitloopt, breng ik eene flappe sonde tot in de blaas, en dan loost zig de pis door de sonde, en de lijder kan op den rug blijven liggen. De wond sluit zig hierop spoedig, en de pis loopt er niet meer door. De volgende verbanden worden elk met geschaafd plukzel op dezelfde wijze gelegd. Ten tijde der toeheeling leg ik nog over het geschaafd plukzel de gemeene gomplaaster (\*).

(\*) Het zal hier niet ongepast zijn, iets van de nieuwe wijze van FRÈRE COME te zeggen. Wilt de hooge toefstel, voornaamlijk, wanneer er een gebrek in de pisbuis of in het perineum is, of de steen te groot is, veel voordeel boven den zijdelijken toefstel heeft, sloeg FRÈRE COME dezelve onlangs weêr voor. Doch de wijze van FRÈRE COME is van de oude voornaamlijk onderscheiden door dat hij de ledige blaas boven de schaambeenen, zonder eenige insputing te doen, opent. Zonder de afbeelding der hiertoe nodige instrumenten is het alleenlijk eenen RICHTER mogelijk, eene juiste verklaring van de handgreepen dezer operatie te geeven. Ik wijze derhalven mijne leezers naar de *Chirurgische Bibliothek. V. Band, S. 307.* FRÈRE COME verrigte deze operatie aan zes en dertig mans- en zes en veertig vrouwsperfoonen, van dewelken de meesten geluk-

## §. 2.

*Van de steensnijding met den laagen toestel.*

**D**E laage toestel is naar de onderscheiden wijzen van dien aan te wenden en naar de verscheidenheid der deelen, welken bij de operatie in aanmerking komen, in verscheiden soorten verdeeld.

CELSUS is de eerste geweest, welke eene wijze, om den steen met den laagen toestel uit de blaas te neemen, beschreeven heeft: men heeft denzelven den kleinen toestel genoemd [*apparatus parvus*]. Men bedient er zig niet ligt van, dan alleen in geval, wanneer een steen uit de blaas geschoten, geklemd en als in haaren hals besloten is, en voor zulken, die zomwijlen in het celledweefzel van den hals der pisbuis en in de nabij gelegen deelen ontstaan, het zij na de uitwendige toeheeling der wond, welke men bij het steensnijden in den bilnaad maakt, alwaar, wanneer het binnenste celledweefzel niet volkomen geheeld is, de pis indringt en zig in het celledweefzel zet, of dat het een gevolg is van eene etteragtige of

lig geneezen werden. *Nouvelle methode d'extraire la pierre de la Vessie urinaire par desus le Pubis, qu'on nomme vulgairement le haut appareil dans l'un & l'autre Sexe, sans le secours d'aucun fluide retenu ni forcé dans la Vessie à Bruxelles & à Paris 1779. 12. L.*

ontstekingagtige verplaatsing in de deelen , welke tot de vergadering der pis gelegenheid geeft , of ook wel eene pisverplaatsing zelve , gelijk ik verscheiden voorbeelden daar van gezien heb.

Om te verhoeden , dat de pis zig na de operatie met den laagen toestel niet ophoope , en daar door gelegenheid geeve tot het vormen van eenen steen in het celledweefzel der deelen om de wonde heen liggende , heeft de ondervinding getoond , dat het gebruik van waschkaarsjes [*bougies*] de binnenvlakte der wond , welke men in den hals der blaas gemaakt heeft , opheelt , en de pis belet , zig in het celledweefzel te zetten.

In geval een steen zig in den hals der blaas vast gezet heeft , is het genoeg , den vinger der linke hand , na dat men den zelve in olie gedoopt heeft , in den aars te brengen , ten einde den steen tegen de algemeene bekleedzels der huid te drukken , zo dat hij moet uitsteeken. Alsdan maakt men boven dit gezwel , het welk de steen vormt , eene incisie , en neemt er den steen met den haak , steenlepel en de verdere instrumenten uit. Als de steen zig in het celledweefzel vast gezet heeft , vat men hem met de vingers der linke hand , en snijdt met een incisiesmes met eene bolle snede boven den steen zelve in , ten einde de deelen , die hem bedekken , te scheiden , en dan neemt men er hem met den haak en steenlepel uit. Op dezelve wijze kan men eenen steen opereeren , welke op eenige plaats langs de pisbuis ingesloten is. De wond zelve word gelijk alle eenvoudige wonden verbonden (*uu*).

(*uu*) [ De steensnijding met den kleinen toestel allereerst

De tweede wijze is die met den grooten toestel [*apparatus magnus*] of de wijze van MARIANUS, welke zelden of nooit meer dooreenen Heelmeester gevolgd word, ten ware, dat hij er aan gewend was, en dat hij zig van geen andere wilde bedienen. Men heeft in plaats van dezelve de wijze met de zijdelijke snede [*lithotomia lateralis*] ingevoerd, ik meen de wijze van CHESELDEN, welke MORAND in Frankrijk het eerst bekend gemaakt heeft (vv). Van deze wijze zal

door CELSUS *lib. VII. cap. XXVI.* beschreven, word thans om deszelfs onvolkomenheid, door geene Heelkundigen, zo veel ons bewust is, geëfend: dezelve kan ook niet wel dan bij kinderen plaats hebben, ten ware dat de steen in den pisweg, gelijk onze schrijver voorstelt, gelegen was, om dat de vingers veelal te kort zijn om dezelve bij een bejaarden zo ver in den aars te brengen, dat men den steen vatten en bepaalen kan; buiten het welke egter de operatie niet te verrigten is. — Wanneer de steen zig bij een kind in de blaas bevind, en men verkiest aan hetzelfde deze operatie te doen, zo laat men het kind op den schoot van een sterk man zitten, zó, dat de billen van het zelve genoegzaam vrij zijn en de kniën zo veel mogelijk van een kunnen gehouden worden; men brengt den met olie gedoopten voorsten of middensten vinger der linke hand zo hoog in den aars als mogelijk is, en met de regte hand drukt men den buik zagtelijk even boven het schaambeene, om den steen naar den hals der blaas te stuuwen; daar zijnde, drukt men denzelven door den vinger, die in den aars is, naar den bilnaad, en maakt op deszelfs toonende verhevenheid, door een rondsnedig mesje eene genoegzame ruime opening door welke de steen als dan met een haakje, tang of lepel kan uitgenomen worden.]

(vv) [Het is niet de heer CHESELDEN, maar FRÈRE JAQUES, die de eerste inrigter van deze zijdelijke operatie geweest is. Men vind de geheele historie van dezen steensnijder bij DIONIS *Chir. Operatiën bl. 175. en volg.* De gelukkige uitkomsten der wijze van opereeren van dezen Mon-



ik thans spreken, en het is die, welke ik altijd volg naar de lesfen van MORAND, inzonderheid zedert dat LE CAT (\*) mij bewezen heeft, dat de groote wonden der pisblaas fchier altijd dodelijk zijn, en dat de verlenging der vezelen en zelfs derzelver fcheuring, wanneer zij maar eenigzins gematigd is, boven de groote en zelfs boven de kleine incifiën te verkiezen is.

Volgens deze felling is het klaar, dat men geen incisie in het lichaam der blaas moet maaken, om er den fteen uit te haalen, ten ware in geval van de uiterste noodzaaklijkheid, gelijk bij den hoogen toefstel, en hier zelfs moet men ze nog zo klein maaken als mogelijk is, gelijk ik zulks uitdruklijk voorgefchreven heb, toen ik gelegenheid had hier van te fpreken. Doch het is voornaamlijk door de verlenging der vezelen, welken de inwendige wrong of de fluitfpier der

nik deed de hoogleeraar RAU befluiten, na eenige aanmerklijke verbeteringen, dezelve te volgen. De verspreide gerugten van de gelukkige en voortreffelijke wijze van fteensnijden door RAU geoeffend, gepaard met de *bedenkingen* over deze operatie door den heer MERRIJ in zijne *obs. sur la maniere de tailler dans les deux sexes, pour l'extraction de la pierre, pratiqué par FRÈRE JAQUES, à Paris 1700*, hebben den beroemden engelfchen Heelmeester CHESELDEN aangespoord, na nog eenige verbeteringen aan dezelve toegebragt te hebben, proeven van deze operatie te neemen, en welke volkomen aan zijne verwagting beantwoordden. Dit wierd wel dra door de fransche Heelmeesters LEDRAN, LE CAT en meer anderen op voorftelling van den heer MORAND, gevolgd, en waar uit verder door verfchillende en beroemde fteensnijders verfchillende en onderscheidene wijzen van opereeren zijn voortgevloeid.]

(\*) *Recueil des pieces concernant l'operation de la taille &c.*

blaas uitmaaken, dat men ze zo wijd uitspannen kan, dat het uithaalen van den steen met den kleinen toestel plaats vind. Die hier aan eene snede, aan eene incisie of aan de opening met het lancet den voorrang wilde geeven, zou zig in gevaar stellen, de incisie, onder het uithaalen van den steen, door eene verscheuring tot in het lichaam van de blaas zelve te verlengen, en zou onfeilbaar dezelfde toevallen veroorzaaken, welken met groote wonden en kwetzingen van het lichaam der blaas gepaard gaan, waar van de ondervinding mij reeds zo dikwijls overtuigd heeft.

De voornaamste hinderpaal tegen het uithaalen van den steen met den kleinen toestel is de prostata, welke den hals van de blaas als omgeeft. Zij is op verre na zo rekbaar niet, als de sluitspier van dit deel. De Heelmeesters, welken het steensnijden oefenden, hebben verscheiden instrumenten uitgevonden en anderen verbeterd, om deze klier zeer juist door te snijden, en dus dezen hinderpaal uit den weg te ruimen. Onder deze instrumenten vind men anderen, die van binnen naar buiten snijden, gelijk als de *gorgeret cystotome* van LE CAT, en de *urethrotome* van POUTEAU en HOIN.

Ik heb opgemerkt, en LE CAT heeft het voor mij waargenomen, dat bij elke operatie van den steen, welke men met het verborgen incisiemes [*lithotome caché*] het zij aan een lijk of aan een levend' persoon doet, dit instrument de prostata van binnen naar buiten opsnijdt, waar door de gedaante der wond piramidaal word, of de vorm van eenen geknotten kegel neemt, welks grondvlakke zig in de blaas, doch de top in de alge-

meene bekleedzelen bevind, dienvolgens naar de blaas toe wijd en naar de huid toe nauw is. Maar klooft men in tegendeel deze klier van buiten naar binnen, dan heeft de geknotte kegel, welken deze incisie vormt, deszelfs grondvlakte in de algemeene bekleedzelen en den top in de blaas. Met de kegelvormige incisie, daar de grondvlakte in de blaas is, word dikwijls eene slagader, welke onder de prostata naar haar bovengedeelte loopt, gekwetst, waar uit eene bloedstorting ontstaat, welke moeilijk te stelpen is; een toeval, het welk zig dikwijls opdoet in de operatie met het *lithotome caché*. Anders zijn alle omstandigheden dezelfde, doch het uithaalen van den steen gaat bij deze incisie ook zo gemakkelijk niet, als bij die, daar de grondvlakte des kegels in de algemeene bekleedzelen is. Volgens deze waarneeming nu, welke verscheiden steensnijders gemaakt hebben, verkies ik de incisie van binnen naar buiten altijd boven die van buiten naar binnen.

Maar deze incisie moet op geenerlei wijze de sluitspier der blaas beledigen, en zig derhalven niet verder dan de prostata uitstrekken. De vezelen, welken de sluitspier uitmaaken, zijn zeer rekbaar, en laten zig door elke langzaam en allengs werkende kragt uitspannen, zonder dat zij scheuren of aan stukken springen, zo dat de middenlijn dezer opening langzaamerhand genoeg kan uitgerekt worden, om er den steen door uit te haalen. Bij het vergrooten van deze opening, welke men door het uitrekken bewerkt, worden de vezelen in den omtrek van dezelve liggende, verlengd en uitgespannen, zo dat zij allen even sterk voor de haar uitspannende kragten wijken, en op

deze wijze doet elke enkele vezel door haare verlenging iet tot deze vergrooting.

Doch zo is het niet, wanneer de incisie de sluitpier kwetst. Eene kleine incisie, eene ligte kwetzing verdeelen in een punt de vezelen, welken haar zamenstellen; nu vind de kracht van het uitspannend lichaam weinig tegenstand in dit punt, of daar, waar de incisie gemaakt is, deze verlengt ze dus door eene scheuring, welke zig naar de grootte des steens rigt, zomwijlen meer dan een duim breed naar het lichaam der blaas, door dien de vezelen, die in den omtrek der sluitpier zijn, zig niet uitrekken, en maar zeer weinig tot deze uitzetting en vergrooting doen, en wel om reden, dat zij niet allen even sterk dit oogmerk bevorderen, en dat het uitspannend lichaam minder op al de vezelen der sluitpier, dan op het gescheiden gedeelte werkt. De ondervinding heeft dit zo wel aan lijken, als aan levende personen bevestigd. Ik heb verscheiden lijken geöpend, welke na de operatie van den steen met het *lithotôme caché* overleden waren, en bevonden, dat de Heelmeester de sluitpier der blaas slegts oppervlakkig, als of het zijn voorneemen was geweest, gekwetst had; ik vind hier geen andere oorzaak des doods, dan de incisie, of veelëereene scheur, welke begon ter plaatze, daar de vezelen maar een weinig gekwetst waren geweest, en zig meer dan een duim ver in het lichaam der blaas uistrekke, en onder het uithaalen des steens scheen ontstaan te zijn.

Het is dus een wezenlijk stuk in de zijdelijke steensnijding, dat men de prostata slegts zeer ligt splijt, en de incisie in de uiteinden of grenzen van de-  
zelve



zelve eindigt, want de sluitspier laat zig zeer uitrekken, als men flegts geduld genoeg heeft, om haar langzaam en trapswijze uittespannen.

Om nu deze incisie zo te maaken, dat alleenlijk de prostata gekwetst word, zonder de sluitspier te raaken, bedien ik mij van het verwijdend instrument (Pl. II. fig. 1.), tusfchen welks armen en deszelfs verheven zijde eene groeve is met overgebogen stompe randen (fig. 2. H.H.), in dewelke ik de *urethrotome* met de dwarsplaat (fig. 3.) breng, om alleen de prostata door te fneiden. Met dit instrument, welks einde door middel van de dwarsplaat niet uit de groeve kan wijken, is een bekwaame fteensnijder in staat, de prostata te verdeelen, en ze aan haar voorste gedeelte in twee te fplijten, maar het agterste gedeelte of haar punt mag hij flegts even raaken, wijl hij, terwijl hij het met de hand ftuurt, zeer gemaklijk de deelen voelt, en onderscheid, over welken hij de fmede van dit instrument beweegt. Daarenboven fplijt deze klier ook veel gemakliker en juister, als zij door den gorgeret uitgespannen is, dan wanneer zulks niet gefchied.

Om het voordeel aan te toonen, dat een eenvoudig instrument, het welk door eene bekwaame hand zo beftuurd word, dat het geen verkeerde rigting kan neemen, boven een zeer zamengefteld heeft, hoe fraai hetzelve ook uitgedagt mag wezen, zullen wij, gelijk LE CAT reeds voor ons gedaan heeft, eene vergelijking maaken tusfchen een pennemes en het zonderling werktuig, waarmede men eene pen in ééne fmede kan verfneiden, en tusfchen eene pen, die met het pen-

nemes , en eene andere, die met dit werktuig versneden is. Het zonderlinge van dit werktuig was oorzaak, dat men het bewonderde en boven het pennemes stelde, doch de ondervinding leerde, dat de pen, die met het pennemes versneden was, regelmatigers versneden en beter was, dan die met het fraaije werktuig was versneden, het welk derhalven nu ook geheel buiten gebruik is geraakt. Even eens is het gelegen met de fraaije instrumenten met veeren, welken men uitgevonden heeft, om de incisie te doen: dezen hebben ook in het eerst door derzelver bijzonderheid de Heelmeesters verlokt, doch de ondervinding heeft hun ras 'de oogen geöpend, en zij hebben zelfs deze zo kunstig uitgedagte instrumenten schielijk verworpen, en een eenvoudig instrument, dat zij zelve met de hand regeeren, daar voor verkozen. Zo is ook het instrument, waar van ik mij bedien om de prostata zeer juist op te snijden, zonder de sluitspier der blaas in het minste te raken.

Men moet den lijder tot deze operatie verscheiden dagen voorbereiden, even als tot de operatie met den hoogen toefstel.

Wanneer men nu de tafel, tot het steensnijden bestemd, gereed gemaakt en behoorlijk in het daglicht geplaatst heeft, zo dat het licht wél op de deelen valt, die men wil opereeren, en op eene kleine tafel, die men met klampen aan den voet der tafel vastmaakt, of op eene voetbank een kop met olie en de instrumenten, welken men tot de operatie verkozen heeft, gereed gelegd heeft, zo dat alles behoorlijk bij de hand is, bind ik den lijder met de banden van LE DRAN op de ta-

fel (ww) en plaats de nodige helpers. Alsdan breng ik eenen gegroefden snijstaf in de blaas, buig de greep naar de regte lies, op dat het bolle gedeelte van dèszelfs bogt op de linke zijde in de driehoekige ruimte, welke tusschen de verhevenheid van het zitbeen en den bilnaad is, behoorlijk fluite. Bij de plaatzing, die ik den snijstaf geef, let ik voornaamlijk, dat zijn eind behoorlijk in de blaas zij en dat hij er niet uitga, voor dat de gorgeret er in gebragt is, want dit zou gelegenheid tot eenen valschen weg kunnen geeven; en rigt den zelven zo, dat het holle gedeelte van zijne kromte onmiddellijk naar den schaamboog gekeerd is. Men kan den snijstaf deze plaatzing gemaklijk geeven, wanneer dezelve, gelijk dien van LE CAT, eene groote kromte heeft. Als ik den snijstaf nu in dezen stand heb, laat ik hem vasthouden door eenen helper, welke aan de regte zijde des lijders staat; deze vat en houd hem vast met de linke hand, en met de regte houd hij den balzak om hoog, als het nodig is. Nu ga ik op mijne regte knie op den grond liggen, span de huid over de sleuf des snijstafs uit met de linke hand, vat in de regte een gegroefd incisiemes, het welk op dezelfde wijze als dat van LE CAT gemaakt is, houd dit even als eene schrijfspen, snijde er mede van boven naar beneden en begin de incisie te maaken, daar men ze bij den hoogen toefstel eindigt; verleng ze naar de verhevenheid van het zitbeen toe en maak ze omtrent drie of vier

(ww) [Zie LE DRAN vergelijking van verscheide wijze van steensnijden, vert. door den heer SWAGERMAN, *Amst.* 1765. bl. 33.]

vinger breed lang, waarin men zig egter altijd naar den ouderdom en de lichaamsgesteldheid van den lijder e. z. v. moet rigten; met de eerste snede snijd ik de huid en het vetvlies door, als dan zoek ik met den vinger der linke hand de sleuf van den snijstaf, ten einde de pisbuis op deze sleuf, zo na mogelijk aan de prostata, op te snijden. De nagel van den voorsten vinger der linke hand moet tot een geleider van het incisiemes dienen, om des te zekerer in de pisbuis te komen. Als ik nu in de sleuf des snijstafs ben, snijd ik op de linke zijde van den lijder met dit instrument in het voorste gedeelte der prostata, houde hetzelfde in deze sleuf wel verzekerd met de linke hand vast, en neem in de rechte den gorgeret (Pl. II. fig. 1.), welks ronde punt ik in de sleuf van het incisiemes, het welk ik in de linke hand houde, tot in de sleuf van den snijstaf laat afglijden: alsdan leg ik het incisiemes weg, vat met de linke hand de greep van den snijstaf, welke de helper vast hield en nu moet loslaten, en nu leide ik met de rechte hand den gorgeret voorwaard in de blaas, welken ik op de sleuf van den snijstaf tot zo verre gebragt heb. De pis loopt nu op de uitgehoolde sleuf van den gorgeret weg en ik haal de snijstaf, welke nu van geen nut meer is, er uit. Ik houde den gorgeret met de linke hand, draai deszelfs met stomperanden voorziene sleuf links naar den lijder; met de rechte breng ik in deze sleuf de *urethrotome*, met welke ik, zonder de sluitspier te raaken, de prostata steeds op dezelfde wijze opsplijre. Nu leg ik de *urethrotome* weêr weg en rigt den gorgeret zo, dat zijne groef naar boven kome te staan,



maak de schroef, welke de beide deelen van den gorgeret zamenhoud, los, en breng den in olie gedoopten vinger op de groef van den gorgeret in de blaas. Terwijl ik dien er inbreng, span ik de sluitspier allengs uit en voel met den top des vingers den steen, om te zien, of hij niet gekneld is, te zelfden tijde druk ik de greep van den gorgeret met de linke hand zamen en met het verwij-dend instrument en den vinger maak ik allengs de uitspanning. Als ik nu denk, dat ik de deelen genoegzaam uitgespannen heb, vat ik de tang, doop ze in olie en breng ze op de groeve van den gorgeret langzaamlijk in de blaas en geef tevens agt, dat de beide bolle [gepolijste vlakten haarer beide deelen zo gerigt zijn, dat het eene naar den schaamboog, het andere naar den aars gekeerd is, zo dat haare beide openingen naar de zijden en uitgehoolde vlakten van den gorgeret zien. De tang in de blaas gebragt hebbende, leg ik den gorgeret weg en vat den steen in deszelfs kleine middenlijn met de tang. Indien ik zwarigheid ontmoet, zo dat ik den steen niet wél kan vatten, vul ik de blaas door de wond met eene spuit met afkookzel van maluwe; hier door zetten de wanden der blaas zig uit en word de handgreep gemaklijker gemaakt om den steen in deszelfs kleine middenlijn te vatten. Den steen met de tang gevat hebbende, trek ik hem er langzaam uit, zo dat ik, als ik vier minuten tijds nodig gehad heb, om, van het eerste oogenblik af gerekend, dat ik de incisie in de huid maak, de steensnijding te volbrengen, drie en eene halve minuut besteede, tot het uithaalen van den steen, en als hij slegts van eenigen omtrek is, heb ik vijf, zes

ja zelfs zeven of agt minuten nodig, om er hem uit te haalen (xx). Ook let ik bij het uithaalen, dat de gepolijste holle deelen der tang zo gebogen zijn, dat het eene naar de schaamleden, het andere naar den aars gekeerd is. Als ik denk, dat de steen slegts van eenen kleinen omtrek is, bij voorbeeld de grootte van eenen arbrikoozen- of perzikensteen heeft, split ik de prostaat niet met de *urethrotome*, maar vergenoeg mij alleen met de incisie, welke ik met het incisiemes in het voors- te gedeelte der prostaat maak. Het gebeurt zeer dikwijls, dat het moeilijk valt, eenen kleinen steen te yatten: om nu te maaken, dat hij in de blaas los word en zig laat vatten, vul ik de blaas met het afkookzel van maluwe door middel van eene spuit. Zo dra ik den steen uitgehaald heb, maak ik ook eene inspuiting met het zelfde afkookzel, en ik heb altijd bevonden, dat dit zeer goed was.

Ik heb menigmaal opgemerkt, dat, wanneer de steen te groot was, men moest ophouden met

(xx) [De heer LE CAT zoude zig ten uiterste geschaamd hebben, wanneer hij vijf, zes of meer minuten tot deze operatie had besteed. Deze steensnijder oefende deze operatie met eene buitengewoone vlugheid; men vind hier van bewijzen in de aanmerkingen van den heer MAUPELLIER, dat hij, namelijk LE CAT, in den tijd van zeventien minuten zeven lijders van den steen opereerde. Ook vind men in de *verzameling van stukken betrekkelijk het steensnijden*, pag. 121. van dezen Heelmeester, dat men hem somtijds de operatie in één minuut en nog minder heeft zien verrigten. Dan, n mer moet een operateur zig aan eenigen tijd bepalen, om niet door zig te haasten het werk vrugteloos of wel voor den lijder doodelijk te zien eindigen. *Sat cito, qui sat bene.*]

trekken, zo dra de lijder door zijn gefchreeuw te kennen gaf, dat hij veel pijn leed. Wanneer men dus bij de hevigste pijnen ophoud met trekken, om den lijder te laten uitrusten, en men langzaam trekt, zo dra dezelve ophouden, zo verlen-gen de vezelen zig allengs en breiden en rekken zig langzaamerhand uit, zonder te fcheuren en zig van een te fcheiden; het welk onfeilbaar zou gebeuren, wanneer men den fteen gedurende de hevige pijnen wilde uithaalen, want op dien tijd trekken de vezelen zamen, in plaats, dat zij zig bij de uitfpanning zouden rekken. Dit zijn juist zulke gevallen, waarin men vier, vijf, zes, agt tot tien minuuten tijds nodig heeft, om eenen grooten fteen zonder gevaar met den laagen of kleinen toefstel uit te haalen; terwijl men, indien men hem fchielijk en op eens wilde uittrekken, den lijder om het leven zou brengen.

Verder moet men bij het uithaalen wél agt gee-ven, dat men met de tang, met welke men den fteen gevat heeft, geen halve buigingen van de lin-ker naar de regter zijde maakt, want door deze onvoorzigtige handgreep zou men den hals der blaas ter zijde van deszelfs verëeniging kunnen af-scheuren. Om nu dit toeval, welks gevolgen zeer gevaarlijk zouden kunnen zijn, te vermijden, moet men den gevatten fteen alleenlijk van onder naar boven beweegen, en de buiging van het hei- ligbeen en het ftaartbeen volgen.

De vergelijking, welke HOIN (\*) tufchen het haalen van een kind en het uithaalen van den fteen

(\*) *Memoires de l'Académie de Dijon. Tom. I. p. 202. & fuiv.*

gemaakt heeft, toont ons, dat wij in de meesten van onze operatien, doch inzonderheid bij het steensnijden, zo veel mogelijk den loop der natuur moeten volgen. Zedert dat LE CAT den heer HOIN overtuigd heeft, „ dat groote wonden, welken men in het lichaam der blaas maakt, schier „ altijd dodelijk zijn, en dat de verlenging haarer vezelen en derzelver niet al te groote uitspanning voor de groote, ja ook zelfs voor de „ kleine incisien te kiezen is”, heeft hij in plaats van eene incisie in de sluitspier te maaken, om het uithaalen van den steen te bevorderen, zo wel als ik, gepoogd, middelen uit te vinden om eene langzaam uitspanning te bewerken, en een gelukkig gevolg heeft onze pogingen en handgreepen begunstigd.

Om bij het vatten en uithaalen te vermijden, dat de steen, als hij week is, niet gedrukt worde, leg ik, zo dra ik hem met de tang gevat heb, een stukje lijnwaat tuschen haare armen, en terwijl ik dezen omtrent het slot omwind, belet ik op deze wijze, dat de tanden den steen onder het uithaalen niet vermorzelen. Op deze wijze kan men eenen weeken steen geheel uithaalen zonder hem te breeken en men behoeft de tang niet meer dan eens in de blaas te brengen. Ik agt dit middel beter dan de tang van LE DRAN, om het breeken van den steen te verhoeden (\*).

(\*) Hier bedoelt LE BLANC ongetwijfeld die, welke men op het einde der *suite du Parallele des differentes manieres de faire l'extraction de la pierre* — à Paris 1756. 8., afgebeeld vind. L. [Zie nederduitsche vertaling door den heer SWAGERMAN, Amst. 1765. pl. VI.]



Indien het egter gebeurde , dat , onaangezien deze voorzorg , de steen brak , en enkele stukken in de blaas bleeven , moet men , om dezelve los te doen worden , inspuitingen maaken met afkookzel van maluwe en dan kan men ze er met de tang of den steenlepel , of met den haak gemakkelijk uithaalen. Indien er nog kleingruis mogt in blijven , kan men het gemeenlijk door eenige inspuitingen uitspoelen. Zo men nog mogt vreezen , dat eenige stukjes steen , niet tegenstaande deze aangewende middelen , in de blaas mogten gebleeven zijn , moet men op de volgende dagen door de wond inspuitingen in de blaas maaken en eene regte of geknopte sondeer inbrengen , om te onderzoeken , of er nog iets mogt ingebleeven zijn , ten einde het er uit te doen. Het is gebeurd , dat men deze voorzorgen verzuimende , een stuk steen , het welk men bij het eerste zoeken niet gevonden had , tot een kern van eenen nieuwen steen heeft gediend , en dit bragt den lijder in de droevige noodzaaklijkheid om zig nog eens te laaten opereeren. Men moet derhalven altijd nauwkeurig onderzoeken , of na het uithaalen van eenen steen , geen anderen in de blaas gebleeven zijn. Wanneer de uitgehaalde steen eene of meer vlakten heeft , is hij de eenigste niet in de blaas (yy).

(yy) [ wanneer er meer dan één steen in de blaas is , zullen zij meestal op die zijde , daar zij tegen elkander liggen , eene meer dan gewoone gladde vlakte hebben , dit zien wij aan de vier steenen , welke door HELVETIUS in eene menschelijke blaaze gevonden wierden. Zie de *Phyf. math. med. vol. III. pag. 1.* — Dan dit is egter niet altoos zeker ;

Zo dra ik eenen steen uit de blaas gehaald heb; pleeg ik altijd, gelijk ik reeds gezegd heb, aanstonds eene inspuiting te maaken van afkookzel van maluwe. Vijf of zes uren na de operatie laat ik den lijder een half bad neemen van het afkookzel van maluwe, en zomtijds laat ik hem, na dat het geval is, dit verscheiden dagen des morgens en des avonds herhaalen. De vier of vijf eerste dagen leg ik in het geheel geen verband op de wond, maar verzeker alleenlijk de kniën van den lijder aan elkander met eenen band, om het opspalken van de lippen der wond te beletten. Als dezelve den vijfden, zesden of agtsten dag nog niet gesloten is, leg ik een dotje ruuw plukzel op de wond en hier over eene compres, welke tot een *suspensorium* of draagband dient, maar het gansche verband verzeker ik met een T verband of met den zwagtel; ten besluite der behandeling bedien ik mij van een weinig geschaafd plukzel, eene kleine gewoone gomplaster of een stukje Engelsche plaaster. Als het lidteken zig niet behoorlijk wil vormen, bijt ik de wond een weinig met hellschen steen en leg er geschaafd plukzel en de plaaster op. Zomwijlen moet men tot den tienden, vijftienden en twintigsten dag het geschaafd plukzel op de wond met het wél aangelegd T verband of den zwagtel verzekeren.

Iosliggende en rollende steenen zullen zelden eene bepaalde kennelijke gladde oppervlakte hebben: De ondervinding bevestigt genoegzaam dit gezegde. Zie ook de *uitgezogene verbandelingen*, vijfde deel, bl. 272. waar men vind, dat vier steenen uit de blaas van één mensch te gelijk gesneden waren, zonder dat men eenige gladde of kennelijke oppervlakte aan dezelve kon bespeuren.]

Maar in het algemeen moet men de wond vrij laten en er niets opleggen, voor dat de pis haaren natuurlijken weg begint te neemen en de wond aanvangt toe te heelen (zz).

Indien zig na de operatie eene koorts of eene pijnlijke spanning in den buik, voornaamlijk omtrent de blaas, openbaart, moet men deze toevallen door herhaald aderlaaten, door halve ba-

(zz) [De groote omslag van werken en veelheid der werktuigen van onzen schrijver, komt aan alle Heelkundigen niet even smaaklijk voor. De heer GESSCHER zegt van dezelve: „ De heer LE BLANC, een opvolger voorheen „ der manier van LE CAT, heeft naderhand eene wijze „ van steensnijden uitgedagt en geoëffend, gegrond op de „ puinhoopen van deeze, en, uit hoofde van haare groot- „ tere saamengesteltheid, minder aanprijgbaar”. *Heelk. Mengelstoffen*, bladz. 33.— Dan ook ieder schrijver, welke deze operatie behandeld heeft, geeft meestāl aan zijne geliefkoosde wijze den voorrang: allen bijna hebben haare voor- en nadeelen in; allen kunnen zij zomwijlen door onderscheide geöëfenden nagevolgd worden en gelukkige uitkomsten opleveren. Dan het is en blijft eene zekere waarheid, dat de éénvoudige en van weinig omslag benodigde wijze verre de beste, ja de zekerste is.

De verbeterde wijze van steensnijden, door FRÈRE JAKQUES eerst geoëffend, heeft eene algemeene toejuiching gekregen; dan ook deze is het, die bijna door ieder steensnijder onderscheidenlijk verrigt word; het zal onnodig zijn hier van getuigen bij te brengen, de registers van onderscheide en vergelijkende werkingen bij dezulken, die deze operatie beschreven hebben, leveren genoegzame bewijzen mijner gezegdens op.— Een Heelmeester derhalven, welke den steen wil opereeren, moet zig bij eene hem het best voorkomende wijze bepalen, en die wijze bij alle gelegenheden aan lijken als anderzins in het werk stellen; daar door zal hij eene zekerheid in deze operatie erlangen, die hij, wanneer hij dan de eene, en dan eene andere wijze volgt, te vergeefs zoude zoeken.]



den en door flanellen in afkookzel van maluwe gedoopt en wél uitgedrukt, warm op den buik te leggen, tragten te verzagten. In het algemeen moet men zorgvuldig op den leefregel letten. Als er geen toevallen komen, laat ik den lijder van den derden dag af telkens een weinig eeten, voornaamlijk, wanneer hij trek tot eeten heeft (\*).

(\*) Behalven de berigten, welken LE DRAN, GUNZ, PORTAL, HEUERMANN en anderen ons van de verscheiden wijzen van steensnijden gegeven hebben, vind men insgelijks veele nuttige aanmerkingen hier over in F. S. MORAND *Vermischten chirurgischen Schriften*, nevens eene voorrede van den heer ERNST PLATNER, Pr. te Leipzig. Leipzig 1776. 8. Over de wijze van HAWKINS schreef onlangs de heer Pr. HAUSMANN te Brunswijk. Twee niet algemeen bekende schriften over deze wijze zijn: ANT. LOUIS & PETRUS FAGUER *Disf. de methodi Hawkinsianæ in calculosorum sectione præstantia*, Parisis 1769. 4. c. f. en ANT. LOUIS & PETRUS JOSEPHUS DESAULT *Disf. de calculo vesicæ urinariæ, eoque extrahendo, prævia sectione, ope instrumenti Hawkinsiani emendati*. Paris. 1776. 4. Op cene dergelijke wijze heeft de heer CRUICKSHANK den zelfden gorgeret veranderd, dien namelijk vlakker gemaakt en voorwaard en zijdwaard de snede een weinig naar voren gebragt. L.

[ De wijze van den heer HAWKINS, waar van LUDWIG hier spreekt, heeft algemeen veel gerugt gemaakt en groote navolgers gekregen. Zie hier de bewerking van dezen beroemden Engelschen Steensnijder: nadat hij den lijder waterpas op een tafel gelegd heeft, laat hij de dijën en beenen buigen, oplichten, van elkander brengen en door twee helpers vasthouden; hij brengt een gegroefden snijstaf in de pusbuis, latende deszelfs handvat naar de regter zijde gekeerd, door een helper, die tevens den balzak oplicht, vasthouden, hier door word de pusbuis tegen de schaambeenen bepaald, zó, dat de bogt van het werktuig tuschen den knobbel van het zitbeen en den aars zig bevind: hij maakt verder, even als CHESELDEN, door een klein bolsne-



## VEERTIENDE HOOFDSTUK.

*Van de steensnijding aan Vrouwsperfoonen.*

**I**NDIEN het nuttig is, zig bij het steensnijden der mansperfoonen van de grootte der blaas te verzekeren, om te bepaalen, volgens welke wijze men den steen zal uithaalen, is het niet minder noodzaakkijk, bij het steensnijden der vrouws-

dig en onbeweeglijk incisiemesje, voor een gedeelte met vlas bewonden, eene insnijding van de linker zijde des bilnaads schuin tot tuschen den aarsen zitbeens knobbel; spannende alvootens met den duim en voorsten vinger der linker hand de bekleedzelen over den snijstaf uit: wanneer eene insnijding niet genoegzaam tot op en in de sleuf des snijstafs doorgaat, hervat hij dezelve, en laat onmidlijk in de wond een vinger der linker hand glijden, om de rigting van den snijstaf des te zekerer te ontdekken. Daarna brengt hij op geleide van den snijstaf een gorgeret in de blaas, welks regterrand snijdende is, en scheid door het zelve in een buitenwaardsche schuine rigting de prostata en hals der blaas door; hier op doet hij den snijstaf uitgaan, en brengt op den gorgeret eene gewoone steentang binnen, wanneer hij ook als dan den gorgeret wegneemt, zoekt en vat vervolgens den steen, en door welken voorzigtig uit te haalen, hij de operatie volbrengt. Zie meer aangaande deze operatie in de disertatie van den beroemden PALLAS *de variis calculos secandi methodis*, 1754. — Dan de gorgeret van dezen bekwaamen steensnijder heeft veele veranderingen ondergaan: men zie daar over de *aanmerkingen* van den heer DU PUI in het *tweede deel van het Provinciaal Utrechts genootschap enz. bl. 355. en volg.*]

perfoonen deszelfs grootte te bepaalen, om daar uit op te maaken, op welke wijze men de operatie wél zou kunnen onderneemen. De sonde, die men gebruikt voor vrouwen, moet bijna geheel regt zijn en geen oogen hebben, gelijk die, welke LEVRET uitgevonden en (*Essai sur l'abus des regles générales &c.* 1766. p. 144. fig. 1 et 2.) beschreeven heeft.

Men heeft twee wijzen, om vrouwen van den steen te opereeren, namelijk die met den hoogen en die met den laagen toestel. De hooge toestel word bij grootte steenen, de laage bij kleinen of middenmatigen gebruikt.

Ik heb reeds in het vorige hoofdstuk gezegd en herhaal het hier weder, dat, wijl de blaas der vrouwsperfoonen niet zo diep in het bekken ligt, als die der mansperfoonen, men gemakliker boven het schaambeene in de blaas van een vrouwsperfoon, dan in de blaas van een' mansperfoon kan komen. Schoon alle omstandigheden dezelfden zijn, is egter de hooge toestel bij de vrouwen altijd gevoeglijker gebruikt, dan bij de mansperfoonen. Wanneer men nu hier nog bij rekent de grootte des steens, welke onaangezien de grootste omzigtigheid, die men bij het langzaam en trapswijze uithaalen gebruikt, nogthans de sluitspier der blaas te zeer uitrekken, haare veerkracht verzwakken en eene geheele of gedeeltelijke lekkings veroorzaaken kan, zal men voorzeker aan den hoogen toestel den voorrang geven, voornaamlijk, wanneer de steen eenigzins van eenen grooten omtrek is.

Om van de grootte des steens te kunnen oor-

deelen, brengt men de sonde in de blaas en den vinger in de schede der lijfmoeder, en met den vinger en de sonde onderscheid men gemakkelijk, of de steen groot of klein is.

Voor dat men de eene of de andere wijze in het werk stelt, moet men de nodige voorbereidzels laten vooraf gaan, zo als wij dit bij het steensnijden der mansperfoonen beschreeven hebben.

### §. I.

*Van het steensnijden aan Vrouwspersfoonen met den hoogen toestel.*

OM den hoogen toestel in het werk te stellen, legt men het vrouwspersoon, even als de mansperfoonen, op de tafel, die tot deze operatie bestemd is. De Heelmeester, die de operatie zal doen, en de helpers neemen dezelfde plaats. Men maakt dan inspuitingen in de blaas van afkookzel van maluwe, om zo veel als mogelijk is eene verhevenheid boven het schaambeent te krijgen. Om nu te beletten, dat de blaas zig niet ontledige en zamenvalle, voor dat men de incisie maakt, moet een bekwaame helper den vinger in de schede der lijfmoeder brengen en de pisbuis naar den schaamboog toe drukken, ten einde het uitvloeijen der inspuitingen en het zamenvallen der blaas, terwijl de Heelmeester de incisie maakt, te beletten. (\*). Zo dra nu deze in de blaas komt, moet de helper met den vinger in de schede den steen naar boven stooten.

(\*) HALLERI *Disfertat. chirurgicarum. Tom. II.*

De overige handgreepen, welken wij reeds in het dertiende hoofdstuk beschreven hebben, daar wij leerden, hoe men een' mansperfoon den steen met den hoogen toestel moet uithaalen, zijn dezelfde, die men bij een vrouwsperfoon moet gebruiken. Ik wijs derhalven mijne leezers naar dit hoofdstuk, om onnodige herhaling te vermijden (\*).

## §. 2.

*Van het steensnijden aan Vrouwsperfoonen met den laagen toestel.*

**O**M deze operatie te doen, leg ik het vrouwsperfoon op de tafel, die tot deze verrigting bestemd is. Twee helpers, de eene ter regter en de andere ter linker zijde, houden elk een been en de knie der lijderes; een derde agter de tafel houdt haar de schouders vast; hierop breng ik door de opening der pisbuis tot in de blaas het eind van het verwijdend instrument (Pl. II. fig. 4.), laat het er langzaam en allengs ingaan, en terwijl ik de groef van het instrument naar de linker zijde der lijderes keere, breng ik in dezelve langs de sleuf de urethrotome (fig. 3.), om enkel ter zijde de opening der pisbuis en een gedeelte der pisbuis, zonder de binnenste wrong te spleeten; scheide met dit instrument alleenlijk de opening

(\*) Men herinnere zig hier het geen ik van de nieuwe manier van FRÈRE COME, bladz. 157, gezegd heb. L.



ning maar even en de daar aan grenzende pisbuis. Deze scheiding kan men ook met een incisiemes, dat eene bolle snede heeft, verrigten. Zo dra dit geschied is, laat ik zeer langzaam den gorgeret nog dieper zakken; deszelfs holte naar het schaambeek wendende, maak ik de schroef B los, en de greep met de linke hand zamendrukkende, verwijd ik het en vermeerder deze uitspanning langzamerhand. Ik doop den vinger der regte hand in olie, breng hem allengs op de groef van den gorgeret tot in de blaas en maak met dit verwijdend instrument, door de greep met de linke hand zamen te drukken, en met den vinger eene zachte uitspanning, ja ik raak zelfs met den vinger tevens den steen. Zo dra ik de uitspanning genoegzaam oordeele, breng ik op de groef van den gorgeret de in olie gedoopte tang in de blaas. Deze moet er zo ingebracht worden, dat de beide gepolijste bolle deelen van haare lepels zo gesteld worden, dat de eene naar boven, de andere naar onder staat en dat haare beide openingen naar de zijdeelen van het verwijdend instrument gerigt zijn. Hierop leg ik den gorgeret weg, zoek den steen en vat hem alsdan in zijne kleine middenlijn. Zo het mij moeilijk valt, hem te vatten, wijl hij, gelijk dit dikwijls plaats heeft, als hij te klein is, uit de lepels der tang schiet, maak ik eene inspuiting, ten einde de wanden der blaas uittespannen, op dat de steen los worde en ik hem dus te gemakliker zou kunnen vatten, waar op ik hem dan langzaam uit de blaas haal.

Men ziet ligtlijk, dat de scheiding, die ik in de pisbuis maak, in geenen deele de binnenste

wrong der blaas beledigt. Deze, gelijk ik niet breedvoerig behoef te herhaalen, lijd eene aanmerkelijke uitspanning, als men geduld genoeg heeft om ze langzaam en allengs uittespannen. Dienvolgens kan men ze openen en uitspannen, zonder haar te scheuren. Maar met de opening der pisbuis en met de pisbuis zelve is het niet eveneens; dezen zijn anders gevormd en kunnen tot zulk eenen hoogen trap niet uitgerekt worden, zonder dat derzelver vezelen niet van elkander scheiden en scheuren. Dit is de reden, waarom ik altijd de uitspanning voor het doorklieven van de pisbuis vooraf laat gaan; ten minsten als de steen klein is, vergenoeg ik mij alleenlijk met de uitspanning, zonder de deelen op te snijden (a3).

(a3) [De steensnijding is bij vrouwen, uit aanmerking dat derzelver pisweg kort, regt en zeer uitrekbaar is, zeldzaam nodig. De natuur is bij dezen meestal vermogen de genoeg, om de steenen, alvorens dezelve tot eene aanmerkelijke grootte zijn aangegroeid, door den pisweg uit te werpen. Dan wij zien ook zomwijlen het tegendeel hier van gebeuren, het zij dat de werkzame natuur door bijzondere omstandigheden is belet geworden, of wel dat de steen spoedig en door verscheide beginzels zijn bestaan heeft gekregen, en de moeijelijkheid, om van zelve eenen uitgang door den pisweg te neemen, hier door benomen word. — Alvorens men in een dusdanig geval toevlugt tot de operatie dersnijding neemt, tragt men den steen door middel van de verwijding des piswegs uit te haalen. Zie hier toe deze éénvoudige wijze: de vrouw wel geplaatst zijnde, brengt men in de *urethra* een regte sleuffsonde, hier op den gorgeret, en na de sonde uitgehaald te hebben, verwijd men door den gorgeret zeer langzaam den pisweg, dit genoeg voor de grootte des steens oordeelende, brengt men een kleine steentang binnen; men neemt den verwijder weg, vat en trekt den steen voorzigtig uit. — Men kan hier toe ook de wijze van TOLET, ALGHISIUS, LE DRAN

Het goed gevolg van den steen op deze wijze uit de blaas der vrouwsperfoonen te haalen, hangt voornaamlijk van de trapswijze pogingen af, welken men aanwend, om hem er uit te haalen, dien volgens van de uitspanning, welke men allengs bewerkt en waar bij men tevens de piswegen zo veel mogelijk vermijdt. In eene steenoperatie, welke ik den 25. van wintermaand 1770., in tegenwoordigheid van veelen mijner amptgenooten, aan eene vrouw van twee en veertig jaaren ondernam, heb ik twaalf minuten besteed, om de uitspanning en de uithaling van eenen hoekigen steen te bevorderen, welken meer dan vier duim in den omtrek van zijne kleine middenlijn had, in welke ik hem vatte; onder welke twaalf minuten moeten geteld worden de tusschentijden, die ik der lijderes liet om uitterusten, als zij te veel pijn scheen te hebben. De lijderes had in het geheel geen toevallen en kon van den vierden dag af haar water ongehinderd loopen, en den agtsten dag was zij reeds weér volkomen gezond. Een ander vrouwsperfoon van vier en veertig jaaren, welke ik den 16. van herfstmaand 1771. in ons gasthuis opereerde, heeft van het oogenblik der operatie af ongehinderd haar water geloosd en er ook niet het minste ongemak van gehad. Daags na de operatie kon ik haar niet meer in het bed houden, zij ging zelfs uit het huis. De heer

of wel die met de bereide spons van DOUGLAS werkstellig maaken. Egrer moet men bij de verwijding van den pisweg agt geeven, denzelven niet te veel, en dus buiten den bepaalden kring zijner veerkragt uit te rekken; dit zoude zomwijlen gelegenheid tot eene geduurige onwillige pisloozing kunnen geeven.]

DE LA CROIX, mijn amptgenoot, welke reeds zedert 30. jaaren den steen geopereerd had, sneed nog denzelfden dag, van de bijzondere nuttigheid van den verwijdenden gorgeret bij het steensnijden der vrouwsperfoonen overtuigd zijnde, met het gelukkigste gevolg een meisje van den steen met dit instrument. Dit gelukkig gevolg nu moet men, gelijk ik reeds gezegd heb, aan het langzaam uitspannen toeschrijven, het welk men met het verwijdend instrument bewerkt, of door den steen zeer langzaam uit te haalen en den lijder, wanneer hij te veel pijn voelt, te laten uitrusten.

HOIN vergelijkt derhalven niet te onregt het uithaalen van den steen met de moeilijke geboorte van een kind (\*).

Wijl ik veel minder gevaar loop, met een *cystitome* eenen valschen weg te maaken, dan met den gorgeret *cystitome* van LE CAT, verkies ik ook altijd den eersten en heb hem op de tweede plaat laten afbeelden (\*\*) (b3).

(\*) *Memoires de l'Académie de Dijon. Premier vol. p. 202. & suiv.*

(\*\*) Men vind eene nauwkeurige beoordeeling van de verscheiden manieren, om den steen bij vrouwsperfoonen te snijden, in het leezenswaardig geschrift van den heer profr. ERNST PLATNER, *Historia literario chirurgica Lithotomiae mulierum. Lips. 1770. 4°. L.*

(b3) [FRÈRE JAKES bezigde op de vrouwen ook de zijdelijke steensnijding, doch doorsneed dus veelal de schede der lijfmoeder. Hierom heeft de hoog leeraar RAU, en andere navolgers van FRÈRE JAKES, niet goed gevonden, deze wijze te volgen, dan alleen bij kinderen, of bij de zulken, waar in de schede nog niet zeer verwijd was. Zie HERTIUS *disf. de variis lithot. administrandi modis & Raviane praestantia*, §. 33.

Er is ook nog eene andere manier, om vrouwen van den



## VIJTIENDE HOOFDSTUK.

*Hoe men zig van de tegenwoordigheid eens vastzittenden steens in de blaas verzekeren en denzelven er als dan uitbaalen kan.*

**S**CHOON deze soorten van steenen eenigzins zeldzaam zijn, vind men dezelve egter wel eens bij lijders. De waarneemingen, welken HOUTET ons in het eerste deel der *Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie*, p. 395. (c3) geleverd heeft, en het geschrift van LE CAT over de steenen, welken gevonden worden in de blaas vast te zitten (*Parallele de la taille latérale* 1766.), bewijzen genoegzaam de aanwezigheid van zulke steenen (\*).

steen te opereeren; de doorsnijding namelijk van de schede der lijfmoeder en den hals der blaas. Zie hier van een geval in *nov. act. Physico-med. tom. I. p. 18. seqq.* Alwaar verhaald word: dat een steen van ten minsten drie oncen zwaar, gelukkig op deze wijze wierd uitgehaald. — Dan wij zouden nimmer aanraden dusdanige operatie te verkiezen, dan in geval er beletzelen in de Urethra waren en de hooge toestel niet konde verrigt worden.]

(c3) [Zie nederduitsehe vertaling door J. TROUT. 2. st. bladz. 20 en volg.]

(\*) Hier over verdienen ook nog nagelezen te worden: JO. FR. LOBSTEIN en JO. G. PFAHLER *de calculis vesicae urinae cysticis* Arg. 1774. 4°. c.f. Hier in onderscheid men de steenen, welken in de pisblaas vast zitten, zeer juist in zulken, welken geheel door de viezen der blaas omgeeven worden; in zulken, welken voor het grootste gedeelte omwikkeld zijn, en in zulken, welken slegts vast

Veele ſchrijvers hebben hier over geſproken , en de meesten hebben deze ſoort van ſteenen voor ongeneeslijk gehouden. Doch zommige Heelmeesters , als LE DRAN , DE LA PEYRONIE , HOUSTET , GARENGEOT , LE CAT en meer anderen , hebben als vrienden van het mensdrom gepoogd , middelen te bedenken , om de hinderpaalen te boven te komen , welken zig tegen het uithaalen van deze ſteenen opdoen , en het gelukkig gevolg heeft den ſteenſnijderen moeds genoeg gegeven , om deze operatie te onderneemen.

Zedert meer dan dertig jaaren , geduurende welken tijd ik de operatie van den ſteen gedaan heb , heb ik nu en dan op verſchillende wijze vastzittende ſteenen gevonden. Zo ontdekte ik eens , na dat ik eenen jongeling van 18. jaaren eenen ſteen afgehaald had , dat er nog een andere in de blaas was. Ik had verſcheiden maalen de blaas met inſpuitingen opgevuld , en evenwel kon ik den ſteen niet los krijgen , om hem met de tang te vatten en er uittehaalen ; des niettegenſtaande voelde ik denzelven onmiddelijk met den top van den vinger op een punt der oppervlakte , en een nauwkeurig onderzoek gedaan hebbende , vond ik , dat hij ingewikkeld was , en juist in den bodem der blaas onder de opening van den linker pislei-

gehegt zijn aan de wanden der blaas ; verders leeze men *ADR. WEGELIN. Disf. de Dysuria. Arg. 1779. 4°.c.f.* Een dergelijke waarneeming hier over van E. D. NOURSE vind men in N. G. LESKENS uitgelezen verhandelingen uit de *Transact. Philos. 2. Deel , 1775. 8°.* en in NOLTENS *Bemerkungen von steinen , die in den Harngängen zwischen den Häuten der Urinblase gefunden worden. Casfel, 1779. 8°. L.*

der zijne plaats ingenomen had. Ik herinnerde mij aanstonds de operatie, welke GARENGEOT in het jaar 1723. in tegenwoordigheid van QUESNAY gedaan had, en welke HOUSTET beschrijft in de *Memoires de l'Académie de Chirurgie* p. 406. 40. Ik verkoos de waarneeming van dezen grooten oefenenden Heelmeester tot mijn geleider, bragt op nieuw mijnen verwijdenden gorgeret in de blaas, en ten einde ongehinderd mijne urethrotome tot aan dezen zak der blaas te brengen, zonder de sluitspier te raaken, om de plooï, welke den steen besloot en te rug hield, op te spleeten, drukte ik met de linke hand de greep van het verwijdend instrument, en rekte op die wijze de sluitspier uit. Zo dra de uitspanning mij genoegzaam scheen, stelde ik met het om-draaijen van de schroef de van elkander gesperde armen vast, om te beletten, dat zij elkander niet konden naderen. Daar op bragt ik den vinger der linke hand door de groef van den gorgeret tot in de blaas, voelde tusschen de armen van het verwijdend instrument den steen zeer duidelijk; hier op poogde ik den top des vingers tusschen den steen en den kleinen cirkel te brengen, welke den steen omvatte, waar op ik langs dezen vinger de urethrotome zonder veel moeite inbragt, en deze vinger mij tot een geleider dienende, schoof ik het geknopte eind van dit instrument tot op den steen, keerde de snede naar den vinger toe, en draaide dezelve zijdwaard naar de zijde der blaas. Toen bespeurde ik duidelijk, zo als ik het geknopte eind van het instrument tusschen den steen en den kleinen vliezigen cirkel, die den steen besloot, voorwaard

schoof, dat ik een week sijn vlies spleet. Mijn vinger volgde steeds de gemaakte snede, zo dat ik kon bepaalen, hoe ver ik gesneden had, of de snede groot genoeg was, en of hier een gedeelte van de oppervlakte des steens ontbloot was. Terwijl ik dit deed, moest een helper met den vinger in den aars den steen opligten en ondersteunen, om het waggelen van denzelfven gedurende de operatie te beletten. Hier op trok ik het instrument, hetwelk ik tegen den vinger liet rusten, te gelijk met den vinger uit de blaas. Ik maakte de schroef, welke de armen van den gorgeret verzekerde, los, om het instrument weêr te sluiten, deed daar op inspuitingen in de blaas, waar door de steen uit zijne ligplaats gespoeld, en dus los werd; doch op de groef van den gorgeret bragt ik de tang in de blaas, lei dien weg, vatte den steen en haalde er hem uit. Er volgden geen kwaade toevallen, en delijder werd geneezen. Daar ik nu de uitwendige incisie zo diep, als mogelijk was, ter zijde van den aars maakte, en dezelve naar de verhevenheid van het zitbeen verlengde, en de pisbuis alleenlijk omtrent de proflata opende, verkortte ik den weg naar de blaas, zo dat ik met weinig moeite den steen met den vinger, dien ik op de groef van den gorgeret er ingebragt had, kon voelen.

LE CAT onderscheid den zak of de beurs, welke den steen bevat, in twee soorten (\*). „De  
 „ eene word door de dubbele vliezen der blaas  
 „ gevormd, tusfchen dewelken de pisleider door-  
 „ loopt. Een steen namelijk, die uit de nieren

(\*) *Parallels de la Taille*, p. 234, 235.



„afdaalt, en in deze dubbele vliezen steekt, be-  
 „gint hier aan te groeijen, en zet deze vliezen  
 „naar binnen in de blaas of buitenwaard naar  
 „het bekken uit. Alsdan word eene tweede soort  
 „van zülken zak, en welke dikwijler voor-  
 „komt, uit het binnenste vlies der blaas ge-  
 „vormd”. Te regt beschouwt hij deze twee-  
 de soort van zakswijze holte als een gevolg van  
 eene ontsteking der blaas van eenen lijder, die  
 den steen heeft, en bij wien tevens eene verettering  
 van dit ingewand reeds plaats heeft of daar op  
 volgt. De verklaring, die hij van de vorming  
 van deze soort van zakswijze holte geeft, is voor-  
 treffelijk, en ik wijze mijne lezers naar dezelve.

De zak, welke den steen bevatte van den jon-  
 geling, van wien ik even te voren gesproken heb,  
 scheen mij van de eerste soort te zijn. Een ge-  
 deelte gruis of een steentje, het welk door den  
 pisweg afgedaald was, om in de blaas te vallen,  
 was mogelijk aan het einde van dit kanaal, het  
 welk de wanden van dit ingewand schuin door-  
 boort, blijven hangen, en had zig tusschen het  
 celledoek der vliezige en spieragtige huid der  
 blaas vastgezet. De pis, welke zig nu in den  
 kleinen zak, die het zand of gruis besloot, ver-  
 gaderde, vergrootte allengs den omtrek van dit  
 steenagtig groeizel, en zo ontstond door aan-  
 groeiing een steen van twee oncen ( $d_3$ ). Maar

( $d_3$ ) [De heer LITRE heeft al voor lang waargeno-  
 men, dat zomwijlen kleine steenen, die door de pisleiders  
 uit de nieren nederzakken, zomtijds in den uitgang dezer  
 buizen blijven zitten, en in plaats van in de blaas te val-  
 len, zig tusschen derzelver vliezen inschuiven en aldaar een

daar was ook nog ander steenagtig zand in de blaas gevallen, het welk deels hier aangegroeid was, en deels in den blaasvormigen zak herom dreef, dit raakte en wreef de wanden van den vliezigen zak, welke den vastzittenden steen omsloot, en vernielde den zak, daar het dien raakte, zo dat de vastzittende steen aldaar tot eene aanmerkelijke grootte ontbloot was. Daar was het juist, dat ik dezen steen het eerst met den top van den vinger voelde, na dat ik den eersten uit de blaas gehaald had. Ik verbeel mij ten minsten, dat die dingen op deze wijze konden gebeuren, want deze vastzittende steen was glad en gepolijst, en dus niet ongelijk of puntig, zo dat hij het vlies van den zak, waar in hij besloten was, zou hebben kunnen doorboren.

Onder de waarnemingen, welken HOUSTET en LE CAT verhaalen, vind men berigten van steenen, welken in verscheiden punten der blaas vast zaten, zelfs boven in de blaas, daar zij in zakken of vliezige beurzen na lang opgestopte pis, na ontsteking en verettering der blaas bij zulken, die den steen hadden, besloten werden gevonden.

De tweede soort van beurzen bedekken zelden of nooit den geheelen steen. Wijl zulke een steen

vastzittenden steen formeeren. Zie *memoires de l'academie des Sciences*. 1702. — Dan er zijn bijna van alletijden waarneemingen gedaan van steenen, welken aan en in de blaas vast zaten; de oudsten daar van vind men bij TORNABHIRA, HOLLIER, HORATIUS ANGENIUS, SCHENKIUS en veele anderen. Zie de aant. op de verhandeling van den heer HOUSTET in de *werken van de koninglijke acad. der beelkonst* 2. *st. bl.* 28. en *velg.*]

niet geheel omwikkeld is , kan men hem met eene sonde , voornaamlijk met eene bijna geheel regte sonde , zeer wél vinden ; dit is ook de reden geweest , waarom zommige steensnijders gemeend hebben , dat de steen , dien zij met de sonde gevoeld hadden , in de blaas los was , en zij zouden van de zaak niet verzekerd zijn geworden , indien zij niet hadden bevonden , hoe moeilijk het is , eenen steen in de operatie te vatten.

Om nu de toevallen te vermijden , welken ontstaan zouden , door de pogingen om den vastzittenden steen met de tang te vatten en uittehaalen , als men meende , dat hij in de blaas los was , moet men voor alle dingen er de tang nooit in brengen , voor dat men den vinger op de groef van den gorgeret reeds in de blaas gebragt heeft , gelijk ik zulks uitdruklijk aanbevolen heb , toen ik van de zijdelijke steensnijding sprak , ten einde men den steen met den vinger kunne voelen en zien , of hij vast zit en ingesloten is of niet. Als de weg naar de blaas verkort is , gelijk ik hier voor daar van gesproken heb , is het gemakkelijk , den steen met den vinger te voelen.

Een steen , die in de eerste soort van zak , van welken ik gesproken heb , namelijk in zulk eenen , daar de zak zig van het vliezige en spieragtige vlies der blaas vormt , besloten is , veroorzaakt gemeenlijk , zo hij klein is , geen pijn. Ik heb lieden van beiderlei geslagt gekend , welken vastzittende steenen vijf en twintig en zelfs dertig jaaren bij zig gehad hadden , zonder er ongemak van te hebben , en de waarneming , die ik hier onder zal verhaalen , zal er een bewijs van opleve-

ren. Maar, wanneer de steen eenigzins in grootte toeneemt, drukt hij den aarsdarm of de sluitspier der blaas, en hier op volgen perssingen tot stoelgang en andere toevallen van de steenziekte.

Als men eenen vastzittenden steen vermoed, dien men met de sonde, zelfs met eene bijna rechte sonde niet kan ontdekken, door dien hij geheel omwikkeld en door het binnenste vlies bedekt is, en hij naar den bodem der blaas ligt, digt bij de opening van den pisweg, gelijk dit zeer dikwijls het geval is, moet men, om zig van zijne tegenwoordigheid te verzekeren, den met olie besmeerden vinger in den aars steeken, en als de steen maar eenigermate eene zekere grootte bekomen heeft, als bij voorbeeld die van een duivenēi, eene noot of iets meer, zo is het zeer gemakkelijk, zijn aanwezen door den aarsdarm en de wanden der blaas zo als ook zijne gedaante te onderscheiden.

Als men bij een vrouwspersoon eenen vastzittenden steen vermoed, welken men met de sonde niet heeft kunnen ontdekken, is het gemakkelijk, hem zo te voelen en te onderscheiden, dat men niet ligt kan dwaalen, wanneer men, voorondersteld; dat de steen in den bodem der blaas digt bij de opening van den pisweg ligt, den vinger in de moederschede brengt, en dien ter zijde van de blaas om hoog ligt. Bij vrouwspersonen, welken vermoedelijk eenen vastzittenden steen hebben, moet men wél letten, dat men dit ongemak niet verwarre met eene soort van verkeerde plaatsing der baarmoeder, waar van LEVRET spreekt, en waar bij het lichaam van het



verplaatste ingewand eene verhevenheid in de blaas maakte (\*). Ik heb op die wijze bij verscheiden gelegenheden zeer nauwkeurig geoordeeld over de tegenwoordigheid eens steens, dien men met de sonde niet kon ontdekken (\*\*).

Wanneer de zak, welke den steen besluit, boven in de blaas, en de steen in geen punt van zijne oppervlakte ontbloot is, kan men deszelfs aanwezen noch met de sonde noch zelfs met den vinger, dien men in den aarsdarm van een manspersoon of in de moederschede van een vrouwspersoon brengt, niet nauwkeurig bepaalen, wijl de vinger den steen niet kan bereiken, door dien hij zo hoog ligt.

Indien een steen in eenen zak besloten is, naar het bekken toe eene verhevenheid vormt, en ook naar den kant van de blaas niet ontbloot is, mag men de operatie niet onderneemen, wijl in dit geval de spieragtige zak der blaas ter plaatze, daar de steen zig neerzet, aan stukken gewreven zou zijn en zig hier verplaatzingen der pis en der etterige stoffe zouden vastzetten, welken den lijder den dood zouden kunnen veroorzaaken.

Als de steen naar de binnen blaas eene verhevenheid maakt, kan men, schoon de steen niet ontbloot mogt wezen, de operatie doen, en zig met een goed gevolg vleijen, wijl deze steen juist tuschen de vliezige en spieragtige huid der blaas zou zitten, en de laatste niet vernield zou zijn.

(\*) Journal de Medecine, Septembre 1773.

(\*\*) Zie *Oeuvres de Mr. de la Framboisier*, 1624. p. 412; en *Memoires de l'Académie royale des sciences*, année 1702. p. 31. & suiv.

De beroemde Geneesheer DES ROSIERS geloofde op zijn vier en vijftigste jaar, dat hij eenen steen had, en liet mij verzoeken, naar *Blois* te komen, om hem te sondeeren, en als ik het raadzaam oordeelde, te opereeren. Ik reisde derwaard, en vond hem in eenen zeer treurigen toestand. Hij verhaalde mij zijne ziekte en zeide mij, dat hij zedert den ouderdom van zes of zeven jaaren tot zijn veertiende of vijftiende jaar alle toevallen van eenen steenzieken had gehad; dat zijne ouders zijne blaas hadden laten onderzoeken met de sonde, en dat men geen steen had gevonden; dat na verloop van eenigen tijd de pijnen allengs verminderd waren en volkomen opgehouden hadden; dat hij van zijn zeventiende en agttiende tot zijn negen en veertigste jaar geen toevallen van eenen tegenwoordigen steen had bespeurd, en dat hij gedurende deze dertig jaaren eene volkomen sterkte en de volmaaktste gezondheid genoten had, en eerst tegen zijn vijftigste jaar had hij weêr graveelpijnen beginnen te voelen, welken egter zo hevig niet waren, als bij iemand, die eenen losfen steen in de blaas heeft; ook hadden zij hem niet belet, zijne bezigheden te verrigten, zelfs niet gehinderd in het te paard rijden, wijl de beweging van het paard dezelve niet vermeerderden. Ongerust over zijnen toestand, ging hij in bloeimaand 1771. naar Parijs, om met zijnen ouden vriend, den heer VERNAGE, raad te pleegen. Hij deed de reis te paard, zonder er eenig ongemak van te hebben. De heeren GUERIN en MOREAU onderzochten hem te Parijs met de sonde, en vonden geen steen. Hij kwam weêr te huis, en zedert dien tijd namen

de pijnen meer en meer toe. Eene maand voor dat ik hem bezogt, werd hij door eene heupjigt in de regte heup aangetast, het welk de graveelpijnen nog gevoeliger maakte: hij rustte weinig, zijn slaap was afgebroken, hij was niet zonder koorts, en zijne pols was niet zeer gunstig.

Ik kon zonder veel moeite, en zonder hem eenige pijn te veroorzaken, de sonde in de blaas brengen, spuitte door dezelve de blaas op met afkookzel van maluwe. Het uitzetten der wanden van de blaas veroorzaakte hem pijn, doch schoon ik met de sonde alles nauwkeurig onderzocht, vond ik geen vast lichaam in de blaas. Ik bragt derhalven den vinger, in olie gedoopt, in den aars, voelde door den aarsdarm en de huid der blaas zeer duidelijk een vast lichaam, het welk, naar het mij voorkwam, de grootte en den vorm van een zakuurwerk (e3) had, en geen verhevenheid naar de zijde van het bekken maakte. Ik doorzocht met den top van den vinger door den aarsdarm en den spieragtigen zak der blaas den omtrek van dit vast lichaam, het welk mij glad en gepolijst voorkwam, stiet het naar boven en bespeurde, dat het gewillig voor dezen stoot week. Terwijl ik den vinger der rechter hand bewoog, hield ik met de linker den bogt der sonde, welke ik in de blaas gelaaten had en voelde duidelijk, dat een vast lichaam, het welk met eene huid omkleed was, tegen de gebogen sonde stiet en dezelve te rug boog. Nu kon ik

(e3) [*Zakuurwerk*. Hier door moet men een tegenswoordig fransch Zakorlogie verstaan, welken veelal klein en zeer plat zijn.]

den lijder verzekeren, dat hij eenen vastzittenden steen in de blaas had, en dat de operatie kon geschieden, en wijl ik met eenen wêlervaren geneesheer te doen had, stelde ik hem al de gevolgen der operatie voor. Doch, daar hij voor het tegenwoordige niet in staat was om de operatie uittestaan, kwamen wij over een, dat hij, als hij het nodig oordeelde, zig bij herhaling moest doen aderlaaten en halve baden gebruiken, om de koorts te verdrijven en de hevige en ontstekingsagtige beweging des bloeds, welke ik in de blaas vermoedde, te verdeelen. Ik beloofde hem ook, tot het doen der operatie weêr bij hem te komen, of sloeg hem voor, bij mij te Orleans te komen, op dat ik hem dan beter behulpzaam kon wezen. De heupjigt, welke hij in de regte zijde gewaar werd, scheen voort te spruiten uit de tegenwoordigheid van den vastzittenden steen, welke ter regter zijde van den bodem der blaas zat.

Ik vond te Blois den heer DE LAITRE, Heelmeester en opzigter over het soldaaten hospitaal, en bragt hem bij den lijder, ten einde hem te onderzoeken en zig van de tegenwoordigheid des steens te overtuigen. Hij bragt derhalven den vinger in den aars, gelijk ik gedaan had, en verzekerde den lijder, dat hij den steen duidelijk voelde.

De operatie, die ik voornemens was te doen, om den steen uit deszelfs zak te neemen en hem met de tang te vatten en uit te haalen, moest omtrent dezelfde zijn, welke ik aan den jongeling van agttien jaaren deed en hier voor verhaald heb. Na dat ik namelijk den hals der blaas genoegzaam met het verwijdend instrument (Plaat II. fig. 1.) uitge-



gespannen en de armen van dit instrument , door de schroef half om te draaijen , van een gespannen heb , breng ik de urethrotome (fig. 3.) , die ik met de regte hand houde , met de snede naar onder gekeerd en in de lengte tegen den voorsten vinger der linke hand rustende , met den vinger in de blaas. Alsdan beveel ik den helper , die een of twee vingers in den aars moet hebben , den steen naar boven te beweegen en onderzoek , bevoel en onderscheid met den vinger , welke dit klein instrument bestuurt , den steen door den zak , welke hem bevat. Als ik hem nu ten volle ontdekt heb , maak ik met de snede van het instrument , welk ik met den vinger bestuur en tegen denzelven aanleg , regt boven den steen eene langwerpige incisie in den zak. Door deze incisie nu voel ik den steen onmiddellijk met den top van den vinger en oordeel op het gevoel , of de snede groot genoeg is , om den steen uit den zak te brengen , en als dezelve niet groot genoeg is , verleng ik ze. Ik trek het instrument te rug , houdende deszelfs snede naar den top des vingers , die het bestuurt. Daarop breng ik den vinger der regte hand in de blaas en schiel den steen uit den zak. Als dan maak ik inspuitingen in de blaas , om den steen los te maaken , laat de schroef schieten en vereenig de armen van den gorgeret , breng op deszelfs sleuf de tang in de blaas , leg den gorgeret weg , zoek den steen met de tang , vat hem , en haal er hem zeer langzaam uit.

En op deze wijze zou ik den heer DES ROSIERS geopereerd hebben ; doch de koorts hield aan , de pijnen en toevallen vermeerderden en de ziekte nam van dag tot dag toe , tot dat hij den een en

dertigste dier zelfde maand stierf. Eenige dagen voor zijnen dood vloeide met de pis etter uit de blaas en in de laatste vier en twintig uren vloeide de etter van zelve en gaf eene ontstoken verettering der blaas te kennen.

Eene vroegtijdiger ondernomen operatie zou hem hebben kunnen redden (\*) (f3).

(\*) Ik heb de brieven en geschillen, welken hier in het werk van den heer LE BLANC ingevoegd waren en meest voor den Franschen Heelmeester geschikt zijn, met voorgedacht weggelaten, daar zij geen oefenende waarneemingen bevatten, en ook voor de letterkunde van weinig gewigt zijn. Men vind er korte uittreksels van in de *Chirurgische Biblioth.* van den heer hofraad RICHTER, II. Band. 4. St. S. 38. und. 44. L.

(f3) [Wij zullen bij het eindigen van dit Leerstuk der steenziekte nog aanmerken, dat de steenen, welken tusschen de vliezen of wel in de holte der blaas zelve gevonden worden, nimmer eene oorspronkelijke ziekte dier deelen zijn; maar alleen een gevolg daar van. De blaas is in haar gezonden staat in eene geregelde werking, en kan derhalven geene ophooping, vastzetting of iets dergelijks aan steendeelen toelaaten; maar steenen, welke wij in een anderszins gezonde blaas vinden, hebben waarschijnlijk in één of beide de nieren hunnen oorsprong, en neemen in de blaas alleenlijk eene verdere groeiing aan. JUNKER zegt daarom ook: dat de oorsprong der blaassteenen aan eene voorgaande ontsteeking, verettering e. z. v. der nieren is toe te schrijven.

Dan, wat ook ELLER, HELMONT, LISTER, HUNDERTMARK en meer anderen betrekkelijk den oorsprong der blaassteenen mogten zeggen, bekennen wij egter te gelooven, dat eene ontsteeking en verettering der inwendige wanden der blaas, schoon er geen steen tegenwoordig is, egter gelegenheid, en wel tot vastzittende en tusschen derzelve vliezen inschuivende, steenen zoude kunnen geeven. Wij behoeven dit niet op te helderen, een ieder, die de werkdaad en het bestaan dezer deelen kent, zal genoegzaam hier van overtuigd zijn.]

## ZESTIENDE HOOFDSTUK.

*Van de Keizerlijke snede.*

**H**ET goed gevolg van de keizerlijke snede aan levende perſoonen heeft de Heelmeesters moeds genoeg gegeven om dezelve te onderneemen, en ſchoon deze operatie zelden voorkomt, zo is zij egter in zekere gevallen onvermijdelijk, wijl anders moeder en kind zouden omkomen (\*) (g3).

(\*) De gevallen, waarin de keizerlijke snede noodzakelijk is en gedaan kan worden, zijn de volgende: wanneer het kind en inzonderheid het hoofd van het zelve tegen de natuur groot; wanneer het bekken van het vrouwſperſoon te klein of kwalijk gevormd is; wanneer van binnen beenderen of andere uitwasfen in het zelve gevonden worden; wanneer de vrugt buiten de baarmoeder ontvangen is, en wanneer de uitwendige deelen der geboorte door groote uitwasfen het kind het doorkomen beletten. L. [hier bij kan men voegen: dat ook wanfchepzels, eene vaste zamengroeijing van den mond der baarmoeder, een tegennatuurlijk gezwel enz. waar door de doorgang dezer deelen geſtopd word, tot de gelegenheid geevende oorzaaken dezer operatie betrekking hebben.]

(g3) [Rousserus is de eerste geweest, die opzettelijk en ondervindelijk eene volledige en nauwkeurige beſchrijving van deze operatie gegeven heeft, in een werkje genaamd *traité nouveau de le hystérotomotocie*, où *Enfantement Césarien*, Paris 1581. En bijna alle latere ſchrijvers, vinden wij aangemerkt, hebben in hunne ſchriften de grondſtellingen van dezen beroemden man gevolgd.

De omſtandigheden, die deze operatie noodzakelijk maaken, zijn hier voor in de aantekening door den heer LUDWIG en ons aangetekend; dan de gevallen, waar in dezelve al of

Als het bekken van een vrouwspersoon kwalijk gesteld is, of dat hier onverwinlijke hinderpaalen

niet kunnen en moeten ondernomen worden, vinden wij in dit geheele Hoofdstuk niet beschreven. Egter uit aanzien derzelve noodzaaklijkheid zien wij ons genoopt, daar van dit volgend kort verslag te geeven.

De gevallen, waar in deze operatie verrigt word, zijn:  
§. 1. Wanneer moeder en kind beiden leven. §. 2. Wanneer de moeder leeft en het kind dood is. §. 3. Wanneer de moeder dood, doch het kind levende is.

§. 1. Wanneer de moeder nog niet afgemat en door eenen langdnrigen arbeid verzwakt is, eenen genoegzamen trap van kragt bezit; wanneer er nog genoegzame blijken van het leven des kinds zijn, en er volstrekt geene mogelijkheid is, door de natuurlijke wegen te ontlasten, dan, en dan alléén vermag men, met hoop van een goede uitkomst, tot de operatie zijne toevlugt neemen. — Maar zo de kragten van de moeder door veele folteringen en verloop van tijd reeds afgemat en uitgeput zijn, en het leven van het kind niet dan twijffelagtige kenmerken opgeeft, dan mag, onzes bedunkens, de operatie niet verrigt worden: hier door zoude men, als ware het opzettelijk, den dood van moeder en kind verhaasten.

§. 2. Wanneer de moeder leeft en sterk is, en het kind, schoon dood, volstrektelijk noch door den haak, noch door verbreking kan af- en uitgehaald worden, zo blijft er niets dan de operatie tot redding over, en deze is het, welke in dit geval moet ondernomen worden. — Maar zo de tekenen van des kinds dood zo zeker niet waren, (gelijk er menigvuldige voorbeelden zijn, waar in men meende het kind reeds lang dood te wezen, doch na de verlossing het tegendeel daar van blijkbaar was) en men kon het door den natuurlijken weg met de tang of door verbreking afhaalen, mag men dan tot de operatie wel besluiten? — WINSLOW zegt: dat wanneer het kind noch door de natuur noch door de konst kan verlost worden, men als dan tot geene doorbooring of verbreking moet overgaan, maar het zelve door de operatie verlossen. *Quaest. Medico Chirurg. Par.* 1744. Hier tegen zegt CAMPER: waar is het bepaald, dat wij het regt hebben op eene onzekerheid,



zijn, welken het kind, waar van zij zwanger is, beletten, er door te komen, en men dat alles be-

(daar zelfs de meeste waarschijnlijkheid is voor de dood van het kind) de moeder aan zulk een gevaar bloot te stellen? Zie zijne *verhandeling voor de nederduitsche uitgaaf van MAURICEAU*, Amst. 1759. — Dan ook deze verschillende en tegen elkander overstaande gedagten dezer beroemde mannen doen niet dikwerf den onderzoeker hier in verlegen staan, bijna niet wetende in voorkomende gelegenheden, welken te kiezen. Wij bekenen ook, dat wij noch tot het eene, noch tot het andere eene vaste navolging kunnen aanprijzen. — Het strijd tegen alle menschenliefde, dat wij een moeder aan een dreigend gevaar bloot stellen, om een kind te redden, waar van de meeste waarschijnlijkheid den dood voorspeld: dan het strijd ook, dat wij een kind, waar van nog geene zekere blijken van deszelfs dood zijn, zullen verbreeken alvorens het uiterste tot deszelfs behoud te beproeven. Onzes bedunkens, moet in zo een geval, de wil van moeder en bloedverwanten, gepaard met de bijzondere omstandigheden, de keus van den Heelmeester tot leidster verstrekken.

§. 3. Wanneer de moeder dood is, en het kind leeft, dan mag men niet alleen, maar men is verplicht de operatie te verrigten. — Was het in vroeger eeuwen bij de *Romainen* in gebruik, nimmer eene zwangere vrouw met haar vrugt, zonder alvorens het zelve er uit te neemen, te begraven; hoe veel te meer ware het te wenschen, dat deze gewoonte door ons wierd nagevolgd. Dat namelijk, bij het sterfbed van eene, na de zes of zeven maanden zig zwanger bevindende vrouw, altoos een bekwaam vroedkundige tegenwoordig was, om, zo dra het leven de zwangere vrouw ontgaf, deze operatie te verrigten, en het kind, ware het mogelijk, te behouden. — Wij gelooven wel, dat deze operatie in dit geval veelal vrugteloos werkstellig zoude gemaakt worden; dan wij vertrouwen ook aan den anderen kant, dat er gevallen zouden kunnen zijn, waar in men met geluk slagen zou. En wie zoude zig niet verhengen, al ware het ook maar éénmaal in den loop zijner geheele praaktijk, op eene dusdanige wijze een levend schep-

hoorlijk onderzocht, en bevonden heeft, dat het doorkomen van het kind onmogelijk is, moet men uit noodzaaklijkheid tot de operatie komen. Het zou zeer gevaarlijk zijn, wanneer men zo lang wilde wagten, tot dat de kragten der moeder door vrugtlooze weeën, storting en e. z. v. uitgeput waren. Zo dra de eerste weeën komen, welken aanduiden, dat de tijd tot de verlossing van het kind daar is en dat de opening der baarmoeder zich begint te verwijden, moet men aanstonds tot de operatie overgaan, anders zou men zig aan het gevaar bloot stellen, van in zijn oogmerk te misfen. Dit is een van die gevallen, waar in een Heelmeester van het gunstig oogenblik gebruik moet maaken, het welk, wanneer hij het voorbij laat gaan, hem dikwijls de vrugten van zijnen arbeid doet misfen.

Deze operatie feilde gemeenlijk, wijl men ze te laat ondernam.

Als een vrouwspersoon, gelijk ik zo even gezegd heb, een kwalijk gevormd bekken heeft en het dus natuurlijk onmogelijk is, dat het kind er door kan komen, moet men haar tot de operatie overreeden en dezelve, zo dra de eerste weeën zig aankondigen, onderneemen, en niet wagten, tot dat het water gebroken is, anders worden de kragten uitgeput en de operatie valt dikwijls kwalijk uit. De goede staat der vrouw, van dewelke ons de graaf TRESSANT verhaalt, die de operatie der keizerlijke snede zevenmaal met goed gevolg doorstond, hong voornaamlijk daar van

zel uit de kaaken van eenen wissel dood gered te hebben?]

af, dat de bekwaame Heelmeester de operatie niet te lang uitgesteld had (\*).

In het jaar 1740. was ik bij het verband der wond van mevrouw DES MOULIN tegenwoordig, aan dewelke de heer SOUMAIN, een beroemd vroedmeester te Parijs, de operatie der keizerlijke snede met eenen zeer gelukkigen uitflag gedaan had. Deze verzekerde mij, dat hij den gelukkigen uitflag alleenlijk te danken had aan de voorzigtigheid, volgens welke hij niet te lang getoefd, en zig wél gewagt had, de lijderes af te maten door nuttelooze pogingen, om haar te verlossen.

„ Het gevaar bij deze operatie, gelijk de graaf  
 „ TRESSANT ter aangehaalde plaats zeer wél aan-  
 „ merkt, komt daar van, dat men er te laat toe  
 „ besluit. Men gaat gemeenlijk eerst in den hoogst-  
 „ ten nood tot de keizerlijke snede over, wanneer  
 „ al de kragten reeds uitgeput zijn en de baat-  
 „ moeder haare veerkragt verloren heeft, ook  
 „ zelfs wel, wanneer de schede door de aange-  
 „ wende pogingen des vroedmeesters gekwetst is,  
 „ en beschouwt ze als het laatste middel, om de  
 „ moeder en het kind te redden en dan volgt maar  
 „ al te ras de ontsteking. Het zou derhalven,  
 „ zegt de graaf, voor elke vrouw, welke wist,  
 „ dat zij niet wél gevormd was, raadzaam en  
 „ van veel belang zijn, zig door eenen bekwaam-  
 „ men Heelmeester van de eerste maanden haar  
 „ zwangerschap af te laten onderzoeken en  
 „ te besluiten, deze operatie te ondergaan, zo dra  
 „ bevestigd was, dat de tegennatuurlijke vorming  
 „ van het bekken het doorkomen van het kind niet

(\*) *Journal de Medecine, Juillet 1771.*



„ toelaat. Want de oogenbliklijke pijnen van  
 „ deze incisie komen in geen vergelijking bij die  
 „ veel hevigeren in eene moeilijke verlossing ”.

Naar dezen raadzaamen voorslag en het voorschrift , het welk de heer SIMON (\*) ons over deze stof geeft , die onderzoekt , welke gevallen de keizerlijke snede vorderen , moet een Heelmeester besluiten , deze operatie te onderneemen en ze niet lang uitstellen. Zo hij wagt , tot dat het water gebroken is , zullen de kragten der moeder te veel uitgeput zijn , gelijk ik reeds aangemerkt heb , en hij loopt gevaar het kind te beledigen met het instrument , waar mede hij de insnede in de baarmoeder maakt.

De meeste schrijvers , welken deze operatie beschreven hebben , schrijven voor , de incisie op ééne van de zijden des onderbuiks te doen , geeven der linker zijde den voorrang , dringen door het buikvlies heen en snijden ten eersten in de baarmoeder.

Om de plaats , daar men de incisie in de baarmoeder moet maaken , behoorlijk te bepaalen , moet men wél in aanmerking neemen , dat dit ingewand uit peesagtige vezelen zamengesteld is , welken zeer dicht bij elkander liggen ; dat de vezelen , welken het lichaam der baarmoeder uitmaaken , gedurende de zwangerheid door derzelver rekbaarheid zeer weinig doen tot vergrooting van dit ingewand en dat dienvolgens de wanden van deszelfs lichaam , weinig van hunne dikte verliezen , zelfs op het einde der zwangerheid , gelijk

(\*) *Memoires de l'Académie Royale de chirurgie. Vol. II.*  
 p. 308. 4.



de waarneemingen en ondervindingen dit bevestigen, en dat het lichaam van dit ingewand alsdan het bovenste van de baarmoeder uitmaakt; dat daar tegen de hals uit een weefzel van veel slapper vezelen is zamengesteld, welken zo bij elkander liggen, dat zij zig zeer laten uitrekken, dat dus de vergrooting van den omtrek der baarmoeder gedurende de zwangerheid voornaamlijk bewerkt word door de rekbaarheid en verlenging der slappe vezelen, welken den hals van dit ingewand zamensstellen; dat in de eerste maanden de verhevenheden en rimpelen, welken men op de binnenzijde van dit ingewand vind, allengs verdwijnen; dat tegen de laatste maanden de ontwikkeling door het uitzetten van den hals voordduurt, zo dat het gedeelte, het welk door de zwangerheid den hals der baarmoeder vormt en welke van zijn lichaam geheel onderscheiden is, op het einde der negen maanden den bodem en meer dan de helft van de bolvormige gedaante der baarmoeder uitmaakt. Dus is het bolvormig gedeelte, het welk de hals vormt, dunner en fijner, dan het lichaam van dit ingewand.

Volgens deze gronden nu, welken op de ontleedkunde en de waarneemingen gedurende de zwangerheid steunen, moet een kundig oefenend Heelmeester, in de keizerlijke snede, die hij aan een levend persoon wil onderneemen, de incisie bij voorkeur in het dunne deel van dit peesagtig ingewand maaken (\*). De vezelen van dit

(\*) Dus dwaalen de vroedmeesters, die in elk geval de incisie aanraaden, daar zig het hoofd van het kind verloor.

dunne gedeelte, welken flapper en dienvolgens bekwaamer zijn om uitgespannen te worden dan die, welken buiten den tijd der zwangerheid het lichaam van dit ingewand zamenstellen, moeten zig gemaklijker kunnen uitspannen en dus moet het kind hier eerder uitgehaald kunnen worden, dan wanneer men de incisie boven in maakte. Bovendien weet men, dat hoe meer men in een operatie scheid, of hoe meer men de peesagtige vezelen doorsnijdt, hoe meer aanmerkelijke toevallen, voornaamlijk zulken, welken op eene hevige pijn volgen, er zig op doen.

De gronden dus, welken ons de natuurlijke zamenstelling en ligging der deelen, die in deze operatie in aanmerking genomen worden, aanbieden, moeten de Heelmeesters verpligten, de incisie in het onderste en niet in het bovenste gedeelte der baarmoeder te maaken, om zo min, als mogelijk is, de vezelen te scheiden, die dit ingewand zamenstellen.

Onder de schrijvers, die over deze operatie handelen, stelt LA MOTTE voor, de incisie in het bovengedeelte der baarmoeder te vermijden en dezelve liever in het agterste gedeelte digt bij den mond der lijfmoeder te maaken. Wij gelooven egter niet, dat deze incisie mogelijk is. Hij voegt er derhalven ook bij, dat in geval dit niet mogelijk was, men der incisie in het voorste gedeelte digt bij den mond der lijfmoeder den voorrang moet geeven. Deze groote vroedmeester wist dus reeds, hoe gevaarlijk het is, de incisie boven in de baarmoeder te maaken.

Schoon ik het nu voor beter houde, de incisie in den bodem van dit ingewand te maaken,

geloof ik egter niet, dat zij te dicht bij den mond der lijfmoeder moet komen, wijl het onderste eind der incisie bij het uithaalen van het kind zig zou kunnen uitspannen en tot aan den mond der lijfmoeder opscheuren. De mond der lijfmoeder op die wijze opgescheurd, zou zonder tegenspraak hare veerkracht verliezen en hier uit zouden veele toevallen ontstaan.

Ik open derhalven de baarmoeder liever in haaren bodem door eene incisie van drie of vier duim lang, welke omtrent twee of drie vinger breed van den mond der lijfmoeder van dit ingewand begint en naar de uitwendige incisie, van de welke ik zal spreken, om hoog gaat. De opening moet zo groot zijn, dat men er de vingers en zelfs de hand kan inbrengen en de vliezen, welken het water bevatten, scheuren, bij aldien dezen niet reeds door het instrument geopend mogten zijn, en om het kind bij één of beide de beenen te vatten en het er uit te haalen. Indien de opening niet groot genoeg mogt zijn naar mate van de grootte des kinds, zullen de vezelen in den omtrek van deze incisie, wanneer het er voorzigtig en langzaam uit gehaald word, zig verlengen en genoegzaam uitspannen, zo dat aan het kind door eene trapswijze en voorzigtige uitspanning doorgang gegeven word (*b<sub>3</sub>*). Als het kind er uit-

(*b<sub>3</sub>*) [Men moet zorg draagen, dat, wanneer men het kind bij de beenen uithaalt, door de toetrekking van de baarmoeder, de hals van het zelve niet tuschen derzelver gemaakte wond bekneld en het hoofdje geworgd word; dit zoude zomwijlen de operatielangwijlig en moeilijk maken. Door het in de wond brengen van twee of meer vin-



genomen en de nageboorte los gemaakt en er ook uitgehaald is, trekt de ledig geworden baarmoeder, gelijk men weet, zig weêr van zelve met veel kragt zamen. De vezelen van den omtrek der incisie, welken gedurende dat men het kind er uittrok, uitgespannen en verlengd waren geweest, neemen allengs haare natuurlijke lengte weêr aan, zo dat, wanneer wij stellen, dat als de wond, welke in de baarmoeder in haaren uitgespannen staat gemaakt is, drie of vier duim lang is, dezelve omtrent zeven agtsten verminderd word, zo dra dit ingewand door zijne zamentrekking zijnen natuurlijken omtrek weêr inneemt, en de wond, welke ik vooronderstel, drie of vier duim groot te zijn, zal dus als dan tot op de grootte van vijf of zes lijnen gebragt worden.

Schoon de wond, welke in de baarmoeder in haaren uitgerekten staat gemaakt is, drie of vier duim lang is, zo is het egter zeker, dat het instrument maar vijf of zes lijnen der vezelen, welken het ingewand uitmaaken, van een scheid, want deze wond is weêr tot eene ruimte van vijf of zes lijnen gebragt, wanneer de baarmoeder haaren natuurlijken omtrek weêr krijgt. Of wij moeten eene in de baarmoeder, voornaamlijk in het gedeelte van den hals gemaakte wond, in dewelke maar vijf of zes vezelen doorgesneden zijn, voor geen groote wond van dit ingewand en dus

geren der eene hand, waar door men dezelve van elkander verwijdt, terwijl men met de andere hand het kind langzaam uittrekt, kan dit toeval meestâl voorgekomen worden.]



niet voor dodelijk houden. Wanneer wij ons bij onze operatiën moeten wagten, om de incisie niet te groot te maaken, moet dit voornaamlijk verstaan worden van dezulken, die wij genoodzaakt zijn in de peesagtige ingewanden te maaken, als bij voorbeeld in de baarmoeder, in de pisblaas e. z. v.

De uitwendige incisie moet zo gemaakt worden, dat haar onderste einde omtrent twee of drie vinger breed aan den buikring van de groote schuine spier eindigt en moet naar de kraakbeenen der ribben om hoog loopen, zo dat zij zig naar de ligging der aponeurofische vezelen van deze spier rigt, gelijk LEVRET in de wijze van deze operatie te doen voorschrijft. Als men de incisie op deze plaats en naar deze strekking der vezelen maakt, moet de baarmoeder met de zijdedeelen van haar bodem zig voor de opening vertoonen. Indien men de uitwendige incisie hooger maakte, zou het bovenste der baarmoeder zig aan de geopende plaats vertoonen, zo dat het moeilijk zou vallen, de incisie in den bodem te maaken. Als men de strekking der aponeurofische vezelen van de groote schuine buikspier van den buikring af tot aan de kraakbeenen der ribben volgt, blijft de incisie van de witte lijn en de schede der regte buikspier, welke men moet tragten te vermijden, verwijderd (13).

(13) [De beroemde Haagsche Vroedkundige VAN LAAR toont in zijne *korte schets der verloskunde* aan, dat de plaats der witte streep (*linia alba*) de gelchiktste tot de doorsnijding in deze operatie is. — En zo wij met hem in aanmerking neemen, dat de regte spieren ten tijde der zwangersheid aanmerklijk van elkanderen wijken; en derhalven

Het geschiktste instrument tot deze operatië is het incisiemes van LEVRET met de bolle snede. Men vat namelijk de huid op de plaats, welke ik zo even aangewezen heb, en maakt van dezelve eene dwarsvouw, ligt ze aan de eene zijde zelf op en laat ze aan de andere zijde door eenen helper opligten. Deze vouw behoorlijk om hoog geheven hebbende, snijdt men ze met het incisiemes zo door, dat, wanneer men ze los laat, de snede een knoopgat vormt van drie of vier duim lang, doch deze snede mag niets dan de huid en het celledweefzel raaken; alsdan snijdt men met het zelfde instrument de spieren en het buikvlies door, volgende de strekking der aponeurosische vezelen van de groote schuine buikspier. Aanstonds vertoont zig de baarmoeder voor deze opening en men maakt de incisie in haaren bodem, gelijk wij reeds gezegd hebben.

Wanneer eenige deelen, die de buik bevat, te gelijk door de uitwendige wond uitkomen,

niets meer tot de doorsnijding overlaaten, dan de algemeene bekleedzelen, de witte streep en het buikvlies, zo moeten wij derzelve boven alle andere wijzen de voorkeur geven: te meer, wijl na het verrigten der operatie de zamentrekking en inkrumping der spieren de wond merklijk verminderen en beter doen sluiten, dan wanneer de opening aan eene der buiks zijden gemaakt was: — De ruimte, zegt voorn. schrijver, tusfchen den navel en de schaambeenderen, is gemeenlijk genoeg om eene opening ter lengte van zes of zeven duimen toe te staan.

Alvoorens men tot de operatie overgaat, is het zeer nodig, dat men de blaas door de vrouwen Catheter van haar vogt ontlast, om dat in den staat der zwangerheid dezelve veelal buiten het bekken boven den boog der schaambeenderen geperst word, en bij gevolg in deze operatie een werkelijk beletzel zoude uitmaaken.]

moet men ze behoorlijk naar binnen brengen (*k3*):

De wond moet geheel eenvoudig verbonden worden. Ik zou tot in den buik eene languet van gerafeld linnen brengen en dezelve aan het onderste einde der wonde er laten uithangen, ten einde dezelve het bloed en de uitvloeiende vogten inzuige; over deze languet zou ik de lippen der wond met eenige reepjes Engelsche taf e. z. v. met elkander vereenigen, hier op eene genoegzaame menigte ruuw plukzel leggen en dit alles met den lijf band, welke als een agttienhoofdige band moet gemaakt zijn, verzekeren, zo dat elk hoofd kruislings over de wond kan komen en met spelden vast gemaakt worden. Deze manier van de wond te vereenigen en de vereenigde lippen zamen te houden zou ik altijd voor de buikhegting met de naald verkiezen, welke zommige Heelmeesters aanbeveelen (\*). De reepjes van ge-

(*k3*) [Men moet ook zorg draagen, dat geen der ingewanden tusfchen de wond der baarmoeder geraaken; na dien deze ontledigd zijnde, spoedig zamen trekt, en daar door knelling en toevallen aan de tusfchen geschooten deelen zoude veroorzaaken.]

(\*) Ik geloof niet, dat men de hegting van den buik met de naald in alle gevallen kan verwerpen; want zomwijlen werken de darmen en de andere ingewanden zo sterk op de uitwendige wanden van den buik, dat geen vereenigenden band, veel minder reepjes van gegomde taf dezelve kunnen te rug houden, en als dan is het nog devraag, of het niet beter is, de hegting des buiks met de naald te verkiezen, wijl men door dezelve de wond niet volkomen fluit en dus de uitvloeiing der stoffe, zo wel als de geneezing der wond meer bevordert. Ik zag te Parijs een vrouwsperfoon, bij het welk men zig na de keizerlijke snede van de hegting met de naald bediend had, en de wond was volmaakt geheeld. De heer STEIN en veele anderen bedie-

gomde taf en de agttienhoofdige band, wél aanggelegd zijnde, zijn genoeg, om aan de losse deelen het uitpuilen te beletten. De ondervinding heeft ons geleerd, dat groote wonden van den buik op die wijze volkomen vereenigd zijn, zonder dat men dezelve met de naald hegte.

Elk volgend verband moet op dezelfde wijze gemaakt worden, en men moet, zo lang als men het nodig oordeelt, telkens eene nieuwe languet in de wond leggen.

Ik zou de lijderes ook zo veel als mogelijk is, op de zijde laten liggen, daar de incisie is, om het uitvloeijen der stoffen, welken zig zouden kunnen verzamelen en eene etterverplaatzing in den buik maaken, te hulp te komen. In geval men konde vermoeden, dat er bloed of andere stoffen in den buik gebleven waren, zou men inspuitingen moeten maaken, om dezelve te doen uitvloeijen.

Een voordeel van deze wijze is ook, dat, wanneer men de incisie in den bodem der baarmoeder maakt, men het minst gevaar loopt, om de nageboorte met het instrument te treffen op de plaats, daar zij vast zit; want ik ben niet van het gevoele van den heer PIETCH (\*), welke, van de keizerlijke snede aan een levend vrouwspersoon sprekende, zegt, „ dat hij het als onverschillig aan-

nen zig ook van de heging des buiks met de naald. Zie STEINS *Schrift von der Kaijsergeburt. Cassel 1775. 4. L.* [Men vind nogthans in het eerste en derde deel der *Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie* veele waarneemingen, waar in de nutteloosheid der heging in de keizerlijke snede bevestigd word.]

(\*) *Journal de Medecine, Janvier 1772. p. 31.*



„aanmerkt, dat het van geen gevolg is; de incisie te maaken op de plaats, daar de nageboorte vast zit, al sneed men ze zelfs,” voegt hij er bij, „van het eene einde tot andere open.” Men weet, dat zij gemeenlijk bovenaan de baarmoeder vast is, en als men de incisie in den bodem maakt, verwijdt men dezelve: maar, wijl de nageboorte zig dan hier, dan daar vast zet, en ik van oordeel ben, dat het beter zij, de incisie niet te maaken op de plaats, daar zij zig aan de baarmoeder vastzet, moet men, voor dat men de operatie onderneemt, alles onderzoeken en de plaats, daar zij zig heeft vastgezet, behoorlijk tragten te onderscheiden, ten einde haar te vermijden.

Volgens de kentekens, welken LEVRET (\*) ons opgeeft, kan men de plaats, die de nageboorte besloot en daar zij aan de baarmoeder gehegt is, ontdekken en dus de plaats uitkiezen, daar zij niet vast is, om er de incisie te maaken. Als zij boven de baarmoeder vast is, en men de incisie op eene der beide zijden in den bodem maakt, gelijk ik boven daar van gesproken heb, zo vermijdt men haar. Als zij op de regte zijde vast is, maakt men de incisie op de linke, en als zij op de linke zijde vast is, doet men de insnede op de regte zijde. Eindelijk, indien zij voor of agter vast zit, kan men de incisie op eene der beide zijden maaken, zonder haare aanhangende vlakke te treffen, ten minsten zonder het middenpunt der nageboorte te raaken.

(\*) *Suites des observations sur les causes & les accidens de plusieurs accouchemens, à Paris, 1751. p. 128.*

Ik ben zo zeer overtuigd van de voordeelen der wijze om de operatie te doen, zo als ik ze voorschrijf, dat, wanneer ik gelegenheid mogt vinden, om dezelve aan een levend vrouwspersoon in het werk te stellen, ik mij geen oogenblik bedenken zou, om ze op die wijze te verrigten. Zij komt daarënboven volkomen overëen met de manier van LEVRET (\*), die ze met gelukkigen uitslag in het werk gesteld heeft.

Men kan de keizerlijke snede ook aan een levend vrouwspersoon onderneemen en als het eenigste middel van redding beschouwen, het welk nog overblijft, wanneer namelijk het kind zig in den buik bevind, het welk daar ontvangen kan zijn, gelijk wij dergelijke voorbeelden hebben, of door eene scheuring der baarmoeder daar kan gekomen zijn.

Een vrouwspersoon had in haare vijfde zwangerheid eene soort van omkering der baarmoeder, waar van de heer PUZOS een verhaal geeft, en haar buik hong over de schaambeenen op de dijën af. Toen de weeën kwamen en het water gebroken was, ten tijde dat zij overeind stond [om te verlossen], gevoelde zij eene hevige pijn, welke weer plotzeling ophield, waarop eene groote zwakheid nevens verlies van het verstand volgde. De lijdere, welke men in het bed gelegd had, bekwam weêr, de weeën bleeven agter, en zij bragt in dezen toestand drie uren door zonder hulp. Ik kon met den vinger, dien ik in de schede bragt, welke zeer teder en ter grootte van een guldenstuk

(\*) *Observations sur les causes & les accidens de plusieurs accouchemens laborieux.*

verwijd was, in het ingewand zelve niets ontdekken. Men voelde duidelijk door de bekleedzels des buiks de leden van het kind, het welk waarschijnlijk door eene scheur der baarmoeder in het oogenblik der hevige pijn uitgeschoten was. In hoop, dat het kind nog kon leeven, en wijl men geen ander middel wist om het te behouden en de moeder uit de armen des doods te redden, dan de operatie, ging men ten eersten tot dezelve over. Schoon men slegts eene kleine incisie in den buik maakte ter plaatze, daar men een been van het kind ontdekte, om er maar twee vingers te kunnen in brengen, het been te vatten en er uit te haalen, terwijl men het kind langzaam en voorzigtig bij de beenen er door haalde, werden egter het buikvlies, de spieren en de huid door de trapswijze en omzigtige verwijding, welke het lichaam des kinds in het doorgaan door deze kleine wond veroorzaakte, uitgerekt. Het kind en de nageboorte werden er uitgehaald, de wond sloot zig zo, dat men dezelve beschouwende, niet zou hebben kunnen geloven, dat een kind van negen maanden er had kunnen door komen. Hier op bragten wij eene languet tot in den buik, vereenigden de wond met reepjes, die met kleefplasters overtrokken waren, en leiden plukzel, eenige compresen en den agttiendenhoofdigen lijfband daar over.

Dit vrouwspersoon geloofde na de verlossing van het kind, dat zij gered was; een hik, dien zij een uur van te voren kreeg, hield op; de pols, die zwak en gespannen was, verhief zig. Zij bragt den nacht zeer wél door en de kraamzuivering ontlastte zig door de wond en door de schede.

Vierentwintig uren daarna, toen men liet eerste verband ligtte, bespeurde men in het geheel geen verandering, uitgezonderd, eene groote zwakheid, voor het overige leed de lijderes niets.

Den volgenden dag was haar toestand schier dezelfde, maar den derden dag des morgens kwam de hik weder en nam tot den avond toe. Zij stierf des nagts. Toen men het lijk opende, vond men eene scheur in het onderste regter zijde deel der baarmoeder, digt bij derzelver mond, in het zelfde deel, dat gedurende de zwangerheid het duns-te is, door dewelke dus het kind in den buik gekomen was. POUTEAU verhaalt een bijna dergelijk geval, het welk FLEURANT waarnam (\*).

Dit ongeluk nu moet den vroedmeesteren tot eene leering strekken. „Men moet nooit”, zegt PUZOS, „eene vrouw staande verlossen, „welke eenen op de dijen afhangenden buik „heeft; maar men moet ze in het bed leggen en „haar den buik met eenen doek ten tijde der „weeën, door twee personen laten oplig- „ten (\*\*).

(\*) *Melanges de Chirurgie.*

(\*\*) Men heeft zedert eenigen tijd veel over deze operatie geschreeven, inzonderheid heeft men ze ten aanzien van haare gevaarlijkheid en haare voordeelen met de *Synchondrotomie* vergeleken, en ik zou hier eene breedvoerige aanmerking kunnen maaken, indien ik het niet voor gevoeglijker oordeelde, mijne lezers de keurige uittreksel uit de voornaamste hier toe betreklijke geschriften ter leezing aan te bevelen, welken de heer hofraad RICHTER in het vierde en vijfde deel zijner *Chirurg. Biblioth.* geleverd heeft, als mede de *Sammlung der auferlesenen en neuesten Abhandlungen für Wundärzte, Leipzig 1778.* — Alle Heelmeesters behoorden RICHTERS *Biblioth.* en de ge-



melde verzameling te bezitten. Inzonderheid kunnen wij ook aanbevelen: *Comparatio inter sectionem caesaream & dissectionem cartilaginis & ligamentorum Pubis in partu ob pelvis angustiam impossibili suscipiendas. Diss. Praef. C. C. SIEBOLD Resp. J. P. WEIDMANN. Wlrcburgi. 1779. 4. c. f. L.*

[Wij twijfelen niet, wanneer dit werk van den heer LE BLANC wat laater was in het licht gekomen, en wel na dat door den heer SIGAULT, in 1777. de doorsnijding van de schaambeenderen aan een levend vrouwspersoon te Parijs het eerst verrigt was, of onze Schrijver zoude waar schijnlijk over deze nieuwe bewerking zijne gedagten, het zij Theoretisch, het zij Practicaal, geuit hebben. — Wij zouden ook over deze operatie, die zedert zes of zeven jaaren zo veel gerugts onder de geleerden van bijna geheel Europa gemaakt heeft, veel kunnen zeggen, verkozen wij het voorbeeld van den heer LUDWIG niet te volgen. Doch behalven de, door zijn Ed., aangepreezen schriften, zenden wij onze Lezers naar de volledige en welberedeneerde Dissertatie van den Geleerden J. P. MICHELL *diss. Acad. inquirens Synchondrotomiae Pubis utilitatem in partu difficili*, Lugd. Batav. 1781., waar in de voor- en nadeelen dezer operatie oordeelkundig betoogd worden. Een uittrekkel hier van is te vinden in het *Genees-natuur- en huis-boud-kundig kabinet*, d. 2. bl. 429-480. Als ook eenige nadere ophelderingen, waar in een lyst van alle de daar over handelende stukken gevonden word door den heer MICHELL, in het 3. D. van dit zelfde tijdschrift, bl. 29. en volg. medegedeeld.

In het zesde deel der *Berlinischen Sammlungen* word gewag gemaakt van eene keizerlijke snede van onderen (*Section caesarea inferior*), waar in de heer HENKEL, (bij eene vrouw, welker schede bijna geheel toegegroeid was, zo dat zij volstrekt door de natuur niet verlossen kon, en de keizerlijke snede niet wilde toestaan,) de schede van onder in haare lengte, te gelijk met den hals der baarmoeder opende, zodanig dat het kind daar door kon verlost worden, en de vrouw gelukkig behouden wierd. Zie een meer omstandig uittrekkel hier van in het eerste deel van het *gen. nat. en huisb. kabinet nieuwe uit.* bl. 33.]

## ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

*Van de operatie der Etterborst (13).*

Voor dat men de opening der borst onderneemt, moet men de gevallen, waar in men deze operatie kan vermijden, van dezulken, waar in zij volstrekt noodzaaklijk is, altijd zeer wél onderscheiden, en dus de kentekens van uitgestort bloed, etter of water in de borst nauwkeurig weten. Onder de schrijvers, welken over de borstwonden met uitstortingen in de holte der borst geschreeven hebben, zijn er, naar mijn oordeel, weinigen, die deze stof beter behandeld hebben, dan VALENTIJN (\*). Wij agten het derhalven dienstig, hier eerst alles, wat deze schrijver daarvan zegt, mede te deelen en als dan tot de beschrijving der operatie zelve over te gaan (\*\*).

(13) [Door Etterborst (*empyëma*) word in het algemeen verstaan eene uitstorting van bloed, etter, water &c. in eene of beide de borstholligheden, het zij deze uitstorting door een uit- of inwendige oorzaak is voortgebracht. En onder deze bepaaling is het ook, dat onze Schrijver dezen naam behouden heeft.]

(\*) *Recherches critiques sur la chirurgie moderne.*

(\*\*) Onder al het geen ik onlangs van de operatie der etterborst gelezen heb, hebben mij voornaamlijk de korte en nuttige aanmerkingen van de heeren CHOPART en DEFAULT behaagd. Zie *Traité des Maladies chirurgicales & des opérations, qui leur conviennent, par Mr. Mr. CHOPART & DEFAULT, Tom. second, à Paris 1779. 8°. p. 70. & suiv.*

*Van de wonden der borst met uitstortingen in de holte der borst.*

„ **D**E *phisiologie* leert ons, dat wij het inkomen der lugt tusschen de long en het borstvlies niet zo zeer te vreezen hebben, en de onder- vinding heeft ons geleerd, dat men de wonden der borst zonder gevaar kan open houden, zelfs heeft men ze onlangs mede onder de eenvoudige willen tellen. De tegenopening, welke men in de meeste gevallen als het veiligste en beste middel moet beschouwen, om het bloed, dat in de borst uitgestort is, eenen weg ter ontlasting te baanen, is altijd voor eene operatie gehouden, tot dewelke men in den hoogsten nood en eerst alsdan zijne toevlugt moet nemen, wanneer men reeds eene menigte andere middelen, die even zo gevaarlijk zijn, te vergeefs beproefd had.

„ Deze vooroordeelen tegen de opening der borst hebben ongetwijfeld in de schriften der meeste Geneesheeren, welken over de borst- ziekten geschreven hebben, hunnen oorsprong genomen. Indien dezen de moeite hadden genomen, om de gronden, welken zij voor dit gevoele hadden, te overweegen, zou het hun niet moeilijk gevallen zijn, zig voor deze dwalingen te wagten.

Ook vind men in de *Actis Societatis medicae Havniensis. Vol. I. p. 120. Havniae, 1777.* en in de *Sammlung der auferlesenen und neusten Abhandlungen für Wundärzte, 2tes stuk. S. 59.* eene fraaije waarneming over dit onderwerp van den heer ALEXANDER KÖLPIN. L.



„ SAVANAROLA (\*), een beroemd geneesheer  
 „ in de vijftiende eeuw, beweerde, dat, wan-  
 „ neer eenige vloeibaare stof in de borst uitgestort  
 „ was, men eerst tot de opening der borst zijne  
 „ toevlugt moest neemen, wanneer de omstan-  
 „ digheden in het geheel geen andere hoop meer  
 „ overlieten. Hij grondde zijn gevoele op een  
 „ enkel voorbeeld van eenen lijder, aan welken  
 „ men dezelve had in het werk gesteld, en die  
 „ gestorven was. RIVERIUS is ook van oordeel,  
 „ dat, wanneer er eene uitgestorte vloeibaare stof  
 „ plaats heeft, men de middelen, welke de heel-  
 „ kunst opgeeft, ter zijde stellen, en alleenlijk  
 „ die middelen aanwenden moet, welke de artze-  
 „ nijkunde aan de hand geeft. — De geluk-  
 „ kige uitslag der opening van de borst hangt al-  
 „ leenlijk af van het oogenblik, waarin men de  
 „ operatie onderneemt.

„ De gevaarlijkste borstwonden en die, bij de-  
 „ welken het voornaamlijk nodig is, eenen be-  
 „ kwaamen Heelmeester te haalen, zijn de zul-  
 „ ken, daar de ribbenslagader in een punt geo-  
 „ pend word gevonden, in het welk haare vol-  
 „ komen zamendrukking onmogelijk is, en de-  
 „ zulken, daar het kwetzende instrument zeer  
 „ groote vaten in de zelfstandigheid der longen  
 „ geopend heeft en daar veel bloed uitgestort is.  
 „ In beide gevallen moet men voornaamlijk twee

(\*) Deze aanmerkingen zijn ongetwijfeld uit J. MICHAELIS SAVANAROLA *lib. de aegritudinibus a capite ad pedes Papiae* 1486. fol. of uit zijne *Practica majori, Venet.* 1561. fol. genomen. Ik heb deze titels alleenlijk willen opgeeven, wijl deze geleerde niet zeer bekend is. L.



„ zaaken in agt neemen: de eerste en gewigtig-  
 „ ste zou zonder tegenspraak zijn, het uitvloeijen  
 „ van het bloed tegentegaan; doch dit oogmerk  
 „ kan men niet anders bereiken, dan door de al-  
 „ gemeene middelen, als daar zijn: de meer of  
 „ minder herhaalde aderlatingen, welken naar de  
 „ kragten des lijders moeten afgemeeten worden,  
 „ de rust, een goede leefregel en de stillende  
 „ dranken (m3). De Heelmeester kan ten aan-  
 „ zien van dit eerste punt slegts de natuur te hulp  
 „ komen; hij moet er zig inzonderheid op toe-  
 „ leggen, om een middel uitte vinden, om aan  
 „ het uitgestorte bloed eene vrije uitvloeiing te  
 „ geeven. De gevallen, van dewelken ik zelf  
 „ getuigen ben geweest en de waarneemingen;  
 „ welken men bij de onderscheiden schrijvers aan-  
 „ getekend vind, verzekeren mij volkomen, dat  
 „ de tegenopening op de plaats, die men gemeen-  
 „ lijk daar toe verkiest, het veiligste middel is,  
 „ om het voorgesteld oogmerk te bereiken. Om

(m3) [Wanneer de tekenen ons overtuigen, dat er eene  
 tuschenribbige slagader geöpend is, zo kan men, behal-  
 ven door *aderlatinge*, *rust*, *levensregel*, *stillende dranken*  
 enz. egter ook en vooral gebruik maaken, van de daar toe  
 uitgedagte druktuigen. Bij voorb. het zij door dat van  
 GOULARD, zie *mem. de l'acad. R. des Sciences*, 1740. of  
 door het Schroestuig van BELLOQ, afgeb. by J. Z. PLATNER  
 Pl. III. fig. 24. of wel, en dat aan ons het best voorkomt,  
 door het staalen Plaatje van LOTTERI *ibid.* fig. 23. Aan dit  
 schijnt ook de heer GESSCHER zijne goedkeuring te geeven.  
 Zie *alg. oeff. Heelk.*, waar in men dit instrument in zijn waa-  
 re grootte op de V. Pl. fig. 5. van het eerste deel, vind  
 afgebeeld. — De overige druktuigen, als daar zijn de  
*Bourdonnets*, de *Agaricus* &c. welke allen eene tweede ope-  
 ning vereischen, schijnen aan ons meer omstandig dan ze-  
 ker te zijn, en uit dien hoofde minder aanprijgbaar.]

„ zig hier van te overtuigen, behoeft men flegts  
 „ in bedenking te neemen de ongemakken en  
 „ moeilijkheden, welken de verfcheiden midde-  
 „ len wezenlijk na zig fleepen, die men voor het  
 „ zelve verkozen heeft; alle fchrijvers maaken  
 „ fchier altijd van dezelfden gewag; en de laa-  
 „ teren hebben de ouden daar in flaaffch nage-  
 „ volgd. DIONIS, GARENGEOT, en LE DRAN  
 „ fchrijven voor, niet anders toevlugt tot de te-  
 „ genopening te neemen, dan wanneer het niet  
 „ mogelijk is, de uitvloeijing van het uitgestorte  
 „ bloed door de ligging, de verwijding der wond,  
 „ door hoesten, fterk ademhaalen, door eene in-  
 „ gebragte fonde, reepjes van gerafeld linnen en  
 „ door infpuitingen te bevorderen. HEISTER,  
 „ BOERHAAVE en VAN SWIETEN, welke de heel-  
 „ kunst alleenlijk volgens de meeft geagte fchrij-  
 „ vers voorgesteld en alleenlijk de gevoelens,  
 „ welken voor de besten en meest gegronden ge-  
 „ houden werden, aangenomen hebben, zijn  
 „ ingelijks van gedagte, dat men de overige  
 „ middelen den voorrang boven de tegenope-  
 „ ning moet geeven. Deze operatie is, naar  
 „ hun oordeel, het laatste middel, dat ter red-  
 „ ding over blijft.

„ Het zou indedaad belachlijk zijn, altijd eene  
 „ nieuwe opening in de borst voor te flaan, wan-  
 „ neer men de uitvloeijing van het uitgestorte  
 „ bloed kan bevorderen door den gekwetsten  
 „ flegts zo te laten liggen, dat de wond meer in  
 „ eenen afhellenden ftand is. Maar, wijl de on-  
 „ dervinding leert, dat de opening der wond dik-  
 „ wijls te fchuin is en dat gemeenlijk het instru-  
 „ ment niet anders in de borst gekomen is, dan

„ na dat het tusſchen de huid en de ſpieren als  
 „ doorgedrongen was, zo dat 'de inwendige ope-  
 „ ning dezer wonden zeer verre van de uitwen-  
 „ dige verwijderd is ; dat verder de zwelling,  
 „ welke de deelen, die den doortogt vormen,  
 „ befloot, de uitvloeijing van het bloed verhin-  
 „ dert ; dat eindelijk de gevallen, daar de lig-  
 „ ging alleen toereikende is, om aan het uitge-  
 „ ſtorte bloed eenen uitgang te geeven, allerzeld-  
 „ zaamſt zijn, zó komt het voornaamlijk aan,  
 „ om te bepaalen : of het verſtandiger zij, de  
 „ operatie van de opening der borst te ondernee-  
 „ men, dan wel het bloed door de gewoone en  
 „ aanbevolen middelen uit de wond te laaten uit-  
 „ vloeijen.

„ Men weet reeds voor lang, dat de inwendi-  
 „ ge bloedſtortingen niet anders eindigen, dan  
 „ door de vorming van een ſtuk geronnen bloed,  
 „ het welk vast genoeg is, om de uitvloeijing  
 „ van het bloed te ſluiten : deze waarheid leerde  
 „ PETIT, één der beroemdſte Heelmeesters van  
 „ onze eeuw (13). Wanneer men dezen grond-  
 „ regel eenmaal vastgeſteld heeft, waarom heeft  
 „ men dan niet eerder begrepen, dat het gewoo-  
 „ ne verband der borstwonden met uitſtortingen  
 „ de pogingen der natuur belet en de voornaam-  
 „ ſte waarheden der kunst tegenspreekt.

„ In beide de geſtelde gevallen, namelijk, wan-  
 „ neer de ſlagader der ribben of de vaten der long  
 „ zelve, welken het bloed uitſtorten, geopend zijn,  
 „ is het niet anders mogelijk, of de opening van

(13) [Zie zijne verhandeling in de *mem. de l'Academie Royale de Chirurgie*, ned. vert. 1. ſt. bl. 279. en volg.]



„ deze slagader moet in de inwendige opening der  
„ wond stooten, en schoon de plaats, daar de  
„ vaten gewond zijn, juist niet altijd hier is, zo  
„ is zij egter nooit verwijderd genoeg, om aan  
„ het vrijven van een vreemd lichaam, dat men  
„ in de wond brengt, niet bloot gesteld te zijn.  
„ Hier uit blijkt, dat men door dezen weg geen  
„ sonde of stilet, noch een reepje van gerafeld  
„ linnen of eenig vreemd lichaam in de borst kan  
„ brengen, zonder in gevaar te loopen, zig te-  
„ gen het ophouden der bloedyvloeiing te kanten,  
„ door dien men het stuk geronnen bloed, waar  
„ door de natuur dezelve poogt te beletten, ver-  
„ brijzelt. De inspuitingen, welken men voor-  
„ geslagen heeft, om de stukken geronnen bloed,  
„ die het uitvloeijen van het bloed beletten, weg  
„ te neemen, zijn niet minder nadeelig. Want,  
„ dewijl men dezelve door de wond maakt,  
„ word het vogt der inspuiting met meer of min-  
„ der geweld op het geronnen bloed gestooten,  
„ het welk eenen wand vormt voor het bloed,  
„ het welk anders daaruit vloeijen zou; verbrij-  
„ zelt het zelfs op deze wijze en geeft aanleiding  
„ tot nieuwe toevallen. Als men de inspuitingen  
„ met meer nut wil maaken, dan doet men er  
„ zamentrekkende middelen onder, gelijk ik zul-  
„ ken eenige maalen heb zien gebruiken, doch  
„ hier uit ontstaat ook weêr een ander ongemak;  
„ want kort na dat men er gebruik van gemaakt  
„ heeft, klaagt de lijder, dat hij er den smaak  
„ van in den mond krijgt, en zo zij dan eenig-  
„ zins slerk werken, krijgt de lijder ook eenen  
„ hoest.

„ In een bloedspuwen beveelt zelfs de onerva-



„ ren geneesheer den lijder de rust aan, en laat  
 „ hem geen beweging toe, verbied hem het sterk  
 „ ademhaalen en zelfs het spreken, raad hem,  
 „ alles te vermijden, wat door deszelfs wélrie-  
 „ kende uitwaasfeming niezen zou kunnen ver-  
 „ oorzaaken, schrijft hem verzagtede dranken  
 „ voor om den hoest te stillen of dien voorteko-  
 „ men, zo hij zig nog niet geopenbaard heeft,  
 „ ja hij verbied hem zelfs de onderscheiden be-  
 „ wegingen van het bovenlijf. Alles, wat de  
 „ bloedvloeijing kan vernieuwen, wanneer de va-  
 „ ten der long door eene inwendige oorzaak ge-  
 „ pend zijn, moet ongetwijfeld dezelfde werking  
 „ doen, wanneer zij door uitwendige oorzaaken  
 „ geopend zijn. Voorondersteld, dat eene slag-  
 „ der aan den arm, aan de dije, of aan eenig  
 „ ander deel des lichaams open was, zo ziet men  
 „ duidelijk, dat niets belachlijker zou zijn, dan  
 „ wanneer men den lijder de spieren wilde laten  
 „ beweegen, welken deze vaten omringen, en  
 „ niets zou dwaazer zijn, dan wanneer men de  
 „ wond dikwijls wilde verbinden of vreemde  
 „ lichaamen in dezelve brengen. Ondertuschen  
 „ heeft geen schrijver, in borstwonden met uit-  
 „ gestorte stof, in dewelken de aanmerklijke  
 „ bloedvaten zeer ligt eene bloedstorting veroor-  
 „ zaaken en waar bij men dienvolgens de ver-  
 „ schillende bewegingen, welken de tegenwerking  
 „ der vaten op de vloeistoffen, die zij bevatten,  
 „ kunnen verhaasten en sterker maaken, met alle  
 „ zorgvuldigheid behoorde te vermijden, het hoes-  
 „ ten, sterk ademhaalen, niezen e. z. v. niet als  
 „ het beste middel beschouwd om de uitvloeijing  
 „ van het uitgestorte bloed te bevorderen. De-

„ wijl men namelijk in eene etterborst zonder hin-  
 „ der tot deze onderscheiden sterke werkingen  
 „ der borst zijne toevlugt kan neemen, heeft men  
 „ gemeend, dat men ze ook in andere gevallen  
 „ kon aanwenden. Schoon deze regels, gelijk  
 „ men gemaklijk ziet, allerbelachlijkst zijn, heeft  
 „ men dezelve egter altijd als de zekersten en  
 „ besten aangenomen. BELLOSTE, welke onder  
 „ allen, die deze stoffe behandeld hebben, de  
 „ noodzaaklijkheid der tegenopening aangemerkt  
 „ heeft, heeft niet ten volle begreepen, hoe be-  
 „ lachlijk het aangenomen gevoele was om de  
 „ borstwonden met uitgestorte stof te geneezen.  
 „ Zig enkel bezig houdende met de wijze van  
 „ het verband te verbannen, vergenoegde hij zig  
 „ alleenlijk met de ongemakken daar van aan te  
 „ toonen. Wanneer men zijne waarneemingen  
 „ leest, ziet men, dat zekere gebeurde zaken  
 „ hem verplicht hebben, te erkennen, hoe gegrond  
 „ zijn hier gegeven voorschrift is; maar verleid  
 „ door het ingevoerd gebruik, bepaalde hij zig  
 „ alleen, om ons te bewijzen, dat het beter is,  
 „ de borstwonden met een snijdend werktuig te  
 „ vergrooten, dan dezelve door harde, inge-  
 „ bragte lichaamen, om de lippen van dezelve  
 „ van een te houden, te verwijderen. Indien er  
 „ nog eenige andere twijfelingen over de onge-  
 „ makken der verscheiden middelen, welken men  
 „ gemeenlijk aanwend, om aan het uitgestorte  
 „ bloed in de borst een' doortogt uit eene wond  
 „ te geeven, mogten overblijven, zal de volgen-  
 „ de waarneeming voldoende zijn, om die weg  
 „ te neemen.

„ In de maand Junij 1756. bragt men des

„ avonds te zeven uren in het hospitaal, daar  
 „ ik leerling was, eenen soldaat, welken tus-  
 „ schen de vierde en vijfde rib der regte zij-  
 „ de twee vinger breed van de borsttepel eenen  
 „ steek met eenen degen bekomen had; hij zag  
 „ er bleekgeel uit en zijne pols was gespannen  
 „ en flauw. Schoon de wond zeer regt was,  
 „ bleek uit de toevallen, welken de gewonde na  
 „ verloop van twee uren kreeg, dat dezelve  
 „ doorgestaan was, de moeilijke ademhaling ver-  
 „ meerderde, het was hem onmogelijk op de lin-  
 „ ke zijde te liggen, en dit was een bewijs, dat  
 „ er uitgestorte stof in de borst was. Men deed  
 „ hem dien nacht eene aderlating, lei hem ver-  
 „ scheiden maalen in eene bekwaame ligging, om  
 „ aan het uitgestorte bloed eenen uitgang te ver-  
 „ schaffen; doch deze proeven waren vergeefs;  
 „ bij het verband des morgens besloot men, de  
 „ wond in haaren agtersten hoek een weinig te  
 „ openen, en zo dra men den gewonden eene  
 „ bekwaame ligging had gegeven, vloeide er  
 „ omtrent drie laatbekkens vol bloed uit; deze  
 „ eerste ontlasting gaf den lijder oogenbliklijk  
 „ veel verligting: doch om de al te schielijke ver-  
 „ eeniging der deelen, welken men gescheiden  
 „ had, te beletten, bragt men het eind van een  
 „ reepje gerafeld linnen in de wond. Het overi-  
 „ ge verband werd als naar gewoonte aangelegd,  
 „ men deed tuschen het morgen- en avond- ver-  
 „ band twee aderlatingen, en nam te vier uren  
 „ het verband weêr af, schoon de beklemming  
 „ niet zeer hevig was; men deed den gewonden  
 „ sterk inademen en op het oogenblik schoot het  
 „ bloed er met geweld uit; bij elke ademhaling

„ kwam er eene gulp schuimend en helder rood  
 „ bloed uit; toen men drie laatbekkens vol had,  
 „ verbond men den lijder weêr op dezelfde wijze;  
 „ na verloop van twee uren bespeurde men,  
 „ dat het ademhaalen veel benaauwder werd en  
 „ men deed hem in den nagt drie aderlatingen;  
 „ doch onaangezien deze voorzorg was zijne ge-  
 „ steldheid nog steeds in volle werking en bleef  
 „ in dezen toestand tot aan het morgen verband;  
 „ zo dra men het bandje uit de wond nam, kwa-  
 „ men er meer dan drie laatbekkens bloed uit;  
 „ de verligting, welke hij na deze ontlasting ge-  
 „ noot, duurde slegts eenige oogenblikken, hij  
 „ kreeg kort daarop weêr dezelfde toevallen, men  
 „ opende hem derhalven om de drie uren nog  
 „ driemaal eene ader; bij het avond-verband be-  
 „ droeg het uitvloeiende bloed meer dan vijf  
 „ laatbekkens en was levendig van kleur en schui-  
 „ mend; maar men bespeurde, dat het van eene  
 „ zwarte verwe was, ook ontdekte men eenige  
 „ stukjes geronnen bloed; om die reden deed men  
 „ eene inspuiting van rozenhonig en gerstewater;  
 „ doch nauwlijks was het verband weêr gelegd,  
 „ of de lijder klaagde, dat het was, als of hij  
 „ zou verstikken; men opende hem voor de tien-  
 „ maal eene ader en het ademhaalen nam boven  
 „ mate toe; men was derhalven genoodzaakt, des  
 „ avonds te elf uren het verband afteneemen:  
 „ zo dra men het reepje er uit nam, stortte het  
 „ bloed er met alle geweld uit en borrelde in ver-  
 „ bazende menigte op; men hield nog aan met  
 „ het gebruik van het reepje en met de inspuiting,  
 „ de toevallen hielden in het geheel niet op, de  
 „ zwakheid nam meer en meertoe, en des avonds



„ te vijf uren overleed onze gewonde. Toen  
 „ men de borst opende, vond men omtrent een  
 „ en een half pond uitgestort bloed, en eenen niet  
 „ zeer diepe wond in de long; onmiddellijk bo-  
 „ ven deze wond waren eenige vezelen en valsche  
 „ vliezen, welken aan het borstvlies aangewas-  
 „ sen waren. De ligging van het gebruikte reep-  
 „ je toonde duidelijk, dat men het niet in de borst  
 „ gebragt had, zonder de geopende vaten der  
 „ long tevens te schuuren.

„ Schoon men niet kan bewijzen, dat men den  
 „ lijder had kunnen behouden, indien men de  
 „ operatie van de opening der borst aan hem ge-  
 „ daan had ter plaatze, daar men dezelve gewoon  
 „ is te doen, om het bloed des te gemaklijker te  
 „ doen uitvloeijen, is het ten minsten waarschijn-  
 „ lijk, dat men zijnen dood verhaastte, door die  
 „ operatie na te laten. De verstikking en de  
 „ beklemming naamen alleenlijk toe tuschen de  
 „ eerste drie of vier uren, welken op het uit-  
 „ haalen en inbrengen van het reepje volgden.  
 „ Dit is een bewijs, dat de bloedvloeijing bij elk  
 „ verband vernieuwd werd; de schielijkheid,  
 „ met welke het bloed ten laatsten uit de wond  
 „ vloeide, is een nieuw bewijs van het geen ik  
 „ beweere.

„ Van welken aart de instrumenten en de stuk-  
 „ ken tot het verband behorende ook mogen zijn,  
 „ moeten zij, in de borst gebragt wordende, het  
 „ vormen van den geronnen prop beletten, zom-  
 „ wijlen vernietigen zij zelfs het geronnen bloed  
 „ en geeven aanleiding tot nieuwe bloedstortin-  
 „ gen. Het zij mij vergund, nog eene dergelij-  
 „ ke gebeurtnis van eenen lijder bij te brengen.

„ Een jong en vlug perfoon kreeg den 4<sup>den</sup> van  
 „ bloeimaand 1679. eenen ſteek met eenen degen  
 „ tuſſchen de vijfde en zesde rib twee vinger breed  
 „ van het borſtbeen : de wond was klein ; zo dra  
 „ hij de ſteek kreeg , beſtorf hij en gevoelde pijn ,  
 „ doch , toen hij weêr bij zich ſelven kwam , ging  
 „ hij naar zijn huis. PECHELIN werd aanſtonds  
 „ gehaald , en vond hem in eenen beklaaglijken  
 „ toetſtand ; het verbleekt aangezigt , de neêrge-  
 „ zonken wangen , de bleeke lippen , de onbe-  
 „ weeglijkheid der oogen , het koude zweet over  
 „ het gansche lichaam , het moeilijk ademhaalen ,  
 „ de geduurige flauwten , de droogte van den  
 „ mond , eene kleine zwakke pols , met één woord ,  
 „ alles kondigde eenen aannaderenden dood aan.  
 „ PECHELIN , welke vermoedde , dat eenigen van  
 „ deze toevallen oorzaaken van den ſchrik mogten  
 „ zijn , welke gevaarlijke wonden verzelt , gaf  
 „ hem ten eerſten eenige lepels vol hartſterkende  
 „ middelen ; toen dit middel hem weêr een wei-  
 „ nig kragten had gegeven , lei men hem in eenen  
 „ ſtand , die de uitvloeijing van het uitgeſtorte  
 „ bloed , dat men in borſt vermoedde , kon be-  
 „ gunſtigen ; maar het was vergeefs : men beſloot  
 „ derhalven , eene wiek met digeſtief beſmeerd in  
 „ de wond te brengen ; na verloop van vier uu-  
 „ ren , de pijn en benaauwdheid allerhevigſt wor-  
 „ dende , nam men het verband af , en oogen-  
 „ bliklijk liepen twaalf oncen rood en ſchuimend  
 „ bloed uit de wond : men lei er de wiek weêr in ,  
 „ zonder dezelve met digeſtief te beſmeeren.  
 „ Des avonds tegen negen uren vonden de  
 „ geneesheeren den lijder weinig gebeterd , de  
 „ pols was nog ſteeds klein en de ademhaaling

„ moeilijk : het was niet mogelijk den toestand  
 „ der long nauwkeurig te ontdekken, men be-  
 „ speurde geen hoest, en de lijder wierp geen  
 „ bloed uit. Den vijfden Maj, des morgens,  
 „ was de koleur van het aangezigt steeds dood-  
 „ bleek, de lippen waren bleekgeel, de pols was  
 „ levendiger, de ademhaaling meer afgebroken,  
 „ en de lijder gevoelde eene zwaarte en pijn in  
 „ de borst; men kon niets uit de wond doen ko-  
 „ men, men vergenoegde zig derhalven met hem  
 „ een weinig versterkend voedsel te geeven en  
 „ liet hem ook een aftrekzel van verzagtende  
 „ wondkruiden neemen, om het geronnen bloed  
 „ te ontbinden. Denzelfden dag, tegen den  
 „ middag, moest men het verband afneemen,  
 „ wijl de lijder zeer benauwd was; daarop liepen  
 „ zestien oncen bloed uit de wond, de pols bleef  
 „ klein en zwak, om derhalven het bloedstorten  
 „ te stelpen, lei men een stukje zwam op de wond,  
 „ doch zonder vrugt, eenige uren daarna stiet  
 „ het bloed de zwam weg en er liepen nog twaalf  
 „ oncen af; alles voorspelde eenen treurigen uit-  
 „ slag; doch deze toevallen duurden niet lang,  
 „ de natuur scheen met kragt te gaan werken,  
 „ om eindelijk te zegepraalen; van tijd tot tijd  
 „ deed zig eene flikkering van hoop op, men liet  
 „ hem dien dag verscheidenmaalen een poeder in-  
 „ neemen, het welk uit vijf en twintig greinen  
 „ draakenbloed, vier en twintig greinen poeder  
 „ van roode koraalen en één grein heulsap bestond.  
 „ Toen den volgenden dag de zelfde toevallen  
 „ weder kwamen, tapte men den lijder twaalf  
 „ oncen bloed af; des avonds hield men eene  
 „ waschkaars vóór de wond, en bespeurde dui-

„ delijk, dat er lugt uit kwam en twijfelde niet  
 „ langer aan de verwonding der long.

„ Den zevenden Maj nam de koorts toe, ge-  
 „ lijk ook de hoest, de moeilijke ademhaaling  
 „ en de zwaarte in de borst; men nam het ver-  
 „ band af en er liepen dertien oncen bloed uit.  
 „ PECHELIN stelde eene zamentrekkende inspu-  
 „ tting voor; des avonds vloeiden er weêr agt on-  
 „ cen bloed uit, en men spuitte drie lepels vol van  
 „ het inspuitzel in de wond; wijl de koleur van het  
 „ aangezigt rooder was en de koorts sterker brand-  
 „ de, schreef men een verzagend poeder voor,  
 „ ten einde de al te sterke verdunning van het  
 „ bloed tegen te gaan. Den agtsten Maj was  
 „ de koorts minder, de lijder voelde, dat hij nog  
 „ bloed in de borst had, het welk hij gaern kwijt  
 „ wilde wezen, maakte te dien einde den gehee-  
 „ len morgen verscheiden vergeeffsche bewegin-  
 „ gen, om het uitvloeijen te bevorderen; des  
 „ avonds vloeiden er op twee onderscheiden  
 „ reizen vier oncen uit; men beproefde op nieuw  
 „ de inspuitingen. Den volgenden morgen, bij  
 „ het afneemen van het verband, liepen er nog  
 „ vier oncen bloed uit; om het stollen van het  
 „ bloed te beletten, maakte men in plaats van  
 „ de bovengemelde inspuiting nog eene andere  
 „ van roozenhonig en bladen van het klein dui-  
 „ zend guldenkruid; des avonds nam het moei-  
 „ lijk ademhaalen als mede de zwaarte in de borst  
 „ toe; de lijder kon zijn oogmerk niet bereiken  
 „ om het bloed te doen uitvloeijen, dan door het  
 „ lichaam een weinig te buigen, waar op hij  
 „ twaalf oncen bloed loosde, het welk sterk  
 „ schuimde.



„ Den tienden Maij loosde hij zes oncen bloed,  
 „ het welk zwart en bedorven was, en des avonds  
 „ weêr zo veel en ook van dezelfde gesteldheid;  
 „ na dit aanmerkelijk verlies van bloed bevond de  
 „ lijder, wel verre van daar door zeer verzwakt  
 „ te zijn, zig veel beter. Den elfden deeden zig  
 „ dezelfde toevallen op, en de lijder verloor op  
 „ eens meer dan een pond zwart, dik en stin-  
 „ kend bloed. Den twaalfden des nagts was zijn  
 „ vatengestel in eene buitengewoone beweging,  
 „ de moeilijke ademhaaling tastte het lichaam sterk  
 „ aan, de benauwdheden kwamen menigvuldig  
 „ weder; des morgens vroeg had hij eene bloed-  
 „ storting van tien oncen, welke eveneens was  
 „ als die van den vorigen dag; doch des avonds  
 „ kwam er levendig schuimend bloed uit, het  
 „ welk regt door, zonder te stremmen, uit eene  
 „ slagader der long kwam. Den dertienden dag  
 „ liep bijna op de zelfde wijs voorbij, de natuur  
 „ en de ziekte waren beiden werkzaam, en ge-  
 „ stadig in beweging; de lijder verloor nog veer-  
 „ tien oncen zwart bloed; er deed zig geen te-  
 „ ken van verettering op, schoon het reeds den  
 „ tienden dag der ziekte was. Den veertienden  
 „ vlociden agttien oncen bloed uit de wond. Den  
 „ vijftienden twaalf oncen dik en slijmig bloed.  
 „ Den zestienden veertien oncen zwart, dik en  
 „ stinkend bloed. Den zeventienden tien oncen  
 „ des morgens en twaalf oncen des avonds; het  
 „ laatste scheen eenige etterdeeltjes te bevatten.  
 „ Den agttiende loosde de lijder twaalf oncen  
 „ bloed, het welk vloeibaarer en rooder was, ook  
 „ kon men er duidelyk etter in bespeuren. Den  
 „ negentienden verloor hij nog twaalf oncen bloed,

„ en de etter vertoonde zig nog duidelijker. Den  
 „ twintigsten vloeiden agt oncen wateragtige stin-  
 „ kende etter uit de wond, welke met drie oncen  
 „ helder en ontbonden bloed vermengd was; men  
 „ oordeelde het derhalven nodig, in de plaats der  
 „ gewoone inspuiting eene zuiverende te gebrui-  
 „ ken; des avonds kreeg men uit de wond vier  
 „ oncen etter, welke door de inspuiting los ge-  
 „ maakt was. Den een en twintigsten waren de  
 „ toevallen minder gevaarlijk, men kreeg drie  
 „ oncen etter uit de wond en de etter was met  
 „ draaden gemengd, welken men zag, dat stukjes  
 „ van de zelfstandigheid der long waren; des a-  
 „ vonds liepen er vier oncen zeer stinkende etter  
 „ met vaste en bedorven longvezelen uit. Den  
 „ twee en twintigsten tien oncen etter, welke zo  
 „ stinkend was, dat een jong geneesheer, die bij  
 „ het verband tegenwoordig was, in slaauwte  
 „ viel. Den drie en twintigsten haalde men om-  
 „ trent vier oncen etter uit de wond; men ver-  
 „ wijdde de wond, om den vezelen der long ee-  
 „ nen beteren doortogt te verschaffen en haalde  
 „ er een groote menigte van uit. Den vijf en  
 „ twintigsten loosde de lijder vier oncen zeer wit-  
 „ te etter en tevens een weinig van de zelfstan-  
 „ digheid der long; des avonds kwamen er nog  
 „ vijf oncen uit, welke nog meer stonk, dan die  
 „ van den voorgaanden dag. Den zes en twin-  
 „ tigsten verloor hij des morgens vier en des a-  
 „ vonds vijf oncen etter. Den zeven en twintig-  
 „ sten was de etter witter en niet zo stinkende,  
 „ de lijder loosde des avonds vier oncen etter,  
 „ de beenen zwollen, de pols was klein en zwak,  
 „ hij klaagde over mattigheid en strammigheid der

„ leden en was zeer slaperig, het spuitmiddel  
 „ maakte men van zwavelbalzem met anijs.  
 „ Den agten twintigsten kwamen er drie oncen  
 „ witte etter uit, die zonder reuk was. Den ne-  
 „ gen en twintigsten vier oncen zeer goede etter.  
 „ Den dertigsten twee oncen van dezelfde etter;  
 „ de koorts verliet nu den lijder; de beenen slon-  
 „ ken; de hoest hield op, en de lijder gevoelde  
 „ zig zeer wél. Den een en dertigsten loosde hij  
 „ nog eene once etter; den eersten Junij twee  
 „ en eene halve once; den vierden was de etter,  
 „ die uit de wond kwam, zeer stinkende. De  
 „ verettering hield op die wijze aan tot den laats-  
 „ ten Junij, de toevallen verdweenen van dag tot  
 „ dag en de lijder werd volkomen hersteld.  
 „ PECHÉLIN, welke dezen lijder behandelde,  
 „ was over zijne aangewende zorg en over zijne  
 „ behendigheid, waar aan hij deze geneezing toe-  
 „ schreef, zo zeer overreed en verheugd, dat hij  
 „ ze verhaalt als eene van de geenen, die hem  
 „ het meest tot eere verstreken en heeft ze zelfs  
 „ tot het onderwerp van eene akademische ver-  
 „ handeling verkozen. De baron HALLER vond  
 „ dezelve zo gewigtig, dat hij ze in zijne ver-  
 „ zameling van Heelkundige verhandelingen ge-  
 „ plaatst heeft. (\*). Dit doet ons gelooven, dat  
 „ deze beroemde man de handelwijze van PE-  
 „ CHÉLIN in deze geneezing allen lof waardig ge-

(\*) Zie *Historiam vulneris thoraci*. Præs. J. N. PECHÉ-  
 LIN. Kilon 1632. in ALB. HALLERI *Disputationibus chi-  
 rurgicis selectis* Lausannæ. 1755. Tom. II. 4<sup>o</sup>. p. 531.  
 Doch ik kan aan dit verhaal nauwlijks geloof geeven, wan-  
 neer ik bedenk, dat de lijder 244 oncen bloed en 67 en  
 eene halve once etter zou verloren hebben. L.

„ vonden heeft. De geneesheer, die ons de ver-  
 „ taling van deze akademiſche verhandeling be-  
 „ zorgd heeft, voegt er bij, dat de behandeling  
 „ dezer wond door PECHLIN tot een voorbeeld  
 „ in dergelijke gevallen kan dienen. Ook ſchijnt  
 „ M. B. VALENTIJN, welke deze verhandelingen  
 „ in zijne ſchriften gevoegd heeft, te gelooven,  
 „ dat PECHLIN geen middelen verzuimd heeft,  
 „ welken de kunst kon aan de hand geeven.

„ Indien ik mij bij het ſchrijven van dit werk  
 „ niet voorgesteld had, mij tegen alle valſche  
 „ vooroordeelen te verzetten, zou ik ſchroomen,  
 „ alle deze bewijzen tegen te ſpreken en te be-  
 „ weeren, dat miſſchien geen waarneeming een  
 „ duidelijker bewijs oplevert, dan deze, van de  
 „ verkeerde denkbeelden, welken men over het  
 „ geheel tot heden van de behandeling der borst-  
 „ wonden gehad heeft. Het gedrag van PECH-  
 „ LIN was zo zonderling verkeerd, dat ik denk te  
 „ mogen ſtaande houden, dat men geen een ver-  
 „ band aanlei, waar bij niet tegen de geneezings-  
 „ aanwijzingen gehandeld werd. Eene enkele be-  
 „ ſchouwing is genoeg om overtuigd te zijn, dat  
 „ de bloedſtortingen zo geweldig niet zouden ge-  
 „ weest zijn, indien men ze niet telkens ver-  
 „ nieuwd had; het levendige en ſchuimende  
 „ bloed, het welk den negenden dag des avonds  
 „ uit de wond vloeide, was zonder twijfel een  
 „ gevolg van het verband, dat men des morgens  
 „ gelegd had, want men had zedert meer dan  
 „ zestig uren geen ander dan zwart bloed uit de  
 „ wond gekregen, het welk dik en bedorven was,  
 „ dus bloed, dat eenige dagen in de borst had  
 „ gezeten. De aanmerklijke verettering, waar-



„ mede deze ziekte eindigde, moet men alleen-  
 „ lijk aan de middelen toeschrijven, welken het  
 „ beletzel, dat de natuur tegen den bloedvloed  
 „ stelde, wegnamen en vernietigden. Men kan  
 „ de eenvoudigste wond in eene lange verette-  
 „ ring uitrekken, wanneer men haare lippen door  
 „ het inbrengen van een vreemd lichaam gapende  
 „ houd. Het komt mij derhalven als bewezen  
 „ voor, dat de toevallen, waar aan de lijder bloot  
 „ gesteld was, meer aan het verband, dan aan de  
 „ natuur en gesteldheid der ziekte zelve moesten  
 „ toegeschreven worden. Indien men in dit ge-  
 „ val, in plaats van eene geneeswijze te volgen,  
 „ die enkel op eene blinde gewoonte gegrond is,  
 „ daar men de wond telkens met eene wiek ver-  
 „ wijdde, liever de tegenopening gemaakt had op  
 „ de plaats, die men er gemeenlijk toe verkiest, en  
 „ wel op hetzelfde oogenblik, waarin men de ze-  
 „ kere kentekens van een uitgestort bloed waar-  
 „ nam, zou de lijder niet zo dikwijls aan het ge-  
 „ vaar des doods zijn bloot gesteld geweest; de  
 „ bloedstorting zou veel eerder opgehouden heb-  
 „ ben en het uitgestorte bloed zou reeds den eers-  
 „ ten dag ontlast zijn geworden; ook zou het  
 „ zelve door zijn lang verblijf zulk eenen hoogen  
 „ trap van verrotting niet bekomen hebben, als  
 „ het geen den tienden dag uit de wond vloei-  
 „ de; met één woord, de long zelve zou aan  
 „ zulk eene aanmerkelijke verzwakking niet zijn  
 „ bloot gesteld geweest, als die, welke PECHE-  
 „ LIN hier beschrijft.

„ Men vind in SMETIUS een geval, het welk  
 „ zeer klaar toont, dat het voordeel van de te-  
 „ genopening op de gewoone plaats zig niet en-

„ kel tot zulke gevallen bepaalt, in dewelken de  
„ stand bezwaarlijk toelaat, dat het op het mid-  
„ denrif uitgestorte bloed kan uitvloeijen, maar  
„ zelfs, wanneer de wonden op eene geheel af-  
„ hellende plaats zijn. Het gebeurt zomwijlen,  
„ dat de stukken geronnen bloed, welken zig naar  
„ beneden vormen en die men behoorlijk moet  
„ vermijden, de uitvloeijing der sappen, welken  
„ zig in de borst onthouden, beletten: ook hou-  
„ den zomwijle de vergroeiingen der long met  
„ het ribbenvlies boven het agterste gedeelte van  
„ het middenrif het bloed op, dat zig aldaar ver-  
„ zamelt, waar door eene lang aanhoudende ver-  
„ ettering veroorzaakt word, welke de wond in  
„ eene fistel verandert en den lijder aan groote  
„ gevaaren bloot stelt.

„ Een soldaat kreeg tusschen de zesde en ze-  
„ vende rib boven den tepel der borst eenen steek  
„ met de bajonet; de wond ging door en ein-  
„ digde met eene fistel: de lijder viel in eene te-  
„ ring en verzwakking en bleef omtrent negen  
„ maanden in dezen toestand. Hij vraagde raad  
„ aan SMETIUS, die hem met dranken van won-  
„ dekruiden hoopte te geneezen, welken hij hem  
„ drie maanden lang liet gebruiken zonder eeni-  
„ ge vrugt. De lijder, welke bespeurde, dat zijn  
„ toestand hoe langer hoe hachlijker werd en dat  
„ eene uitteerende koorts hem wegsleepte; dat  
„ ook zijne wond eene dunne scherpe stof bevat-  
„ te, welke niet anders uitvloeide, dan wanneer  
„ hij hoestte of eenige beweging maakte, en dat  
„ zijne ziekte van dag tot dag gevaarlijker werd,  
„ raadpleegde hier over met J. HALARDIN. Deze  
„ Heelmeester, één der bekwaamsten van dien

„ tijd , oordeelde , dat de fistel door het staande  
 „ vogt , dat na het ontvangen der wond uitge-  
 „ stort was , onderhouden werd en geen doortogt  
 „ kon vinden , en besloot derhalven tot de opera-  
 „ tie der etterborst op de gewoone plaats . Na  
 „ dat hij eene opening van een duim groot ge-  
 „ maakt had , sneed hij eene vergroeiing door ,  
 „ welke zig tusfchen de long en het ribbevlies  
 „ gevormd had ; en had het genoeg van meer  
 „ dan een pond zeer dikke stof te zien uitvloe-  
 „ jen : den volgenden dag vloeide er weêr zo veel of  
 „ zelfs wel iets meer uit ; den derden dag vloeide er  
 „ fchier niet minder uit , den vierden minder ,  
 „ den vijfden zeer weinig ; toen bediende hij zig  
 „ van de infputingen met honig , om de borst te  
 „ zuiveren , weinige dagen daar na liep het fput-  
 „ middel er weêr even zo uit als het er ingespo-  
 „ ten was , en de lijder werd volkomen her-  
 „ fteeld .

„ SCULTETUS had ongetwijfeld het voordee-  
 „ lige van de operatie der etterborst in borstwon-  
 „ den met uitgestort bloed op de gewoone plaats  
 „ door zijne oefenende ondervindingen waarge-  
 „ nomen ; hij verhaalt ons twee gevallen , in de-  
 „ welken hij tot de tegenopening besloot , fchoon  
 „ de wonden zó lagen , dat men aan het uitge-  
 „ storte bloed eenen uitvloed zou hebben kun-  
 „ nen geeven . Deze beroemde Heelmeester werd  
 „ bij eenen koetzier geroepen , die eenen fleek  
 „ met eenen degen in den rug gekregen had , die  
 „ tot den linker borsttepel doorgedaan was , en  
 „ dus twee wonden maakte ; hij opende de voors-  
 „ te en den volgenden dag liep er veel bloed uit .  
 „ Toen hij zag , dat , onaangezien deze ontlas-

„ ting, de toevallen aanhielden en dat de lijder  
 „ zeer moeilijk adem haalde; dat hij zeer hevige  
 „ pijn op de gewonde zijde voelde digt bij het  
 „ middenrif en dat er geen bloed meer uit de wond  
 „ kwam, maakte hij, schoon de pols zeer zwak  
 „ was en er reeds twee openingen in de borst  
 „ waren, evenwel eene derde op de plaats, die  
 „ men gemeenlijk daar toe verkiest: de lijder werd  
 „ genezen, niet tegenstaande al de toevallen, waar  
 „ aan hij uit dien hoofde onderworpen was, wijl  
 „ men wicken in de tegenopening gelegd had.

„ Een matroos kreeg eenen fleek met een mes  
 „ in den rug tusſchen de vierde en vijfde boven-  
 „ rib; hij wierp bloed uit en haalde zeer moei-  
 „ lijk adem. SCULTETUS, welke er tegenwoor-  
 „ dig was, toen dit voorviel, floeg voor, hem  
 „ met den ſcalpel een weinig laager eene nieuwe  
 „ wond te maaken, doch de omſtanders waren  
 „ er tegen; den volgenden morgen floeg hij den  
 „ lijder zelve deze operatie voor, die daar in be-  
 „ willigde. SCULTETUS verzekert ons, dat  
 „ de lijder door dit middel zeer ſpoedig geneezen  
 „ werd (03).

„ Ik wenschte zeer, dat deze beide waarneemingen met een uitvoerig verhaal waren ver-  
 „ zeld geweest; het voordeel van de operatie der  
 „ etterborst zou in dergelijke gevallen zonder  
 „ twijfel daar door zijn bevestigd geworden. Hoe  
 „ kort ondertuſſchen het verhaal is, zo bewijst

(03) [ Zie beide deze waarneemingen, in de XLIII. en XLV. obs. bl. 443. en 450. van het laatst, en door G. DIGTEN verbeterd, uitgegeeven werk van SCHULTETUS, onder den naam van *het vermeerderde Wapenbuis der Heelmeesters*, Amſt. 1748. ]



„ het egter genoegzaam, dat SCULTETUS de grondheid van het geen ik wenfchte in gebruik te brengen en zo lang verwaarloosd is, reeds voor mij ingezien heeft. Zo het waar is, en men kan er niet aan twijfelen, dat men door middel der tegenopening op de gewoone plaats verzekerd is, de onderscheiden vloeibaare stoffen, welken boven het middenrif uitgestort zijn, te doen uitvloeijen; kan men zonder hinder zulk eene wond, door het inbrengen van een reepje gerafeld linnen, open houden; is het mogelijk, door deze opening inspuitingen te doen en daar door de borst te zuiveren, zonder gevaar te loopen van de bloedstorting te vernieuwen en aanleiding tot nieuwe toevallen te geeven, zo is het zeer klaar, dat men tot eenen grondregel moet stellen, de operatie der etterborst op de gewoone plaats altijd te onderneemen, wanneer na eene wond bloed uitgestort is, het welk zig niet vlak aan de meest afhellende deelen der agterborst onthoud, of wanneer men de uitvloeijing van het bloed uit de wond niet kan bewerken of te hulp komen alleen door de ligging.

„ Dit laatste voorschrift heeft ook zeer groote voordeelen en verdient niet minder de aandacht der Heelmeesters, dan die, welken ik reeds van de tegenopening bijgebracht heb. Volgens dezen grondregel is men gehouden, aanstonds bij het eerste verband de meeste wonden der borst te vereenigen; er is misfchien geen nuttiger voorschrift in de Heelkunst dan juist dit; men kan niet altijd beslissen, of de wond doorgaat of niet. Het windgezwel, dat men als

„ één der zekerste kentekens beschouwt, dat de  
 „ wond doorgaat, heeft niet bij alle wonden  
 „ plaats, welken doordringen; men heeft voor-  
 „ beelden, dat men wonden gevonden heeft, wel-  
 „ ken niet doorgingen en nogthans van een wind-  
 „ gezwel verzeld waren: deze onzekerheid ten  
 „ aanzien der kentekens heeft zomwijlen de groot-  
 „ ste mislagen doen begaan (p3). Ik heb ge-  
 „ heel eenvoudige wonden der borst, welken niet  
 „ doorgingen, door wieken zeer zien uitzetten  
 „ en de toevallen, welken alleenlijk veroorzaakt  
 „ werden door de ontsteeking, die de wieken  
 „ op de lippen der wond maakten, aan een inge-  
 „ beeld uitdroogen van het bloed zien toeschrij-  
 „ ven: ook ontbreekt het mij aan geen voorbeel-  
 „ den, dat men geheel eenvoudig doordringende  
 „ wonden verscheiden dagen heeft open gehou-  
 „ den, welken zo wel als de eersten enkel eene  
 „ spoedige vereeniging vereischten.  
 „ In gevallen, waarin de wond met de kwet-  
 „ zing der bevatte deelen verzeld, en het bloed  
 „ uitgestort is, is het niet minder voordeelig, de  
 „ vereeniging te bewerken. Als er niet al te veel

(p3) [Dit toeval kan zelfs veelal door onvoorzigtigheid  
 des Heelmeesters ontstaan; wanneer dezelve naamlijk, bij  
 het onderzoek of de wonde al of niet doorgaat, te veel en  
 te ruw met de sonde de Cellulosa in den omtrek der wond  
 verwijdt; vooral wanneer een koude lugt den lijder om-  
 ringt. De lugt in de open en verwijde cellen van dit vlies  
 ingedrongen zijnde, moet natuurlijk door eenen meer-  
 deren graad van warmte verdunnen en uitzetten, en bij ge-  
 volg door de wond (die gewoonlijk door een welklevende  
 plaaster gesloten word) geen uitgang vindende, zig in den  
 omtrek verspreiden en eene *Empbysema* veroorzaaken.]

„ bloed uitgestort is, kan het weêr terug gevoerd  
 „ worden en de natuur kan zig door verscheiden  
 „ wegen daar van ontlasten, gelijk men zulks  
 „ dikwijls gezien heeft (q3). Wanneer in tegen-  
 „ deel groote vaten geopend zijn en er zeer veel  
 „ bloed uitgestort is, zo is het insgelijks goed,  
 „ de wond aanstonds in het begin te vereenigen;  
 „ ja men moet zelfs al het uitgestorte bloed eeni-  
 „ ge uren in de borst laten blijven en wel zo  
 „ lang tot dat er toevallen bij komen, welken  
 „ vorderen, dat men de uitgestorte vloeistof  
 „ door de operatie ontlaste; het bloed vermin-  
 „ dert door deszelfs tegenwoordigheid de bloed-  
 „ storting en doet door deszelfs verblijf veel tot  
 „ het vormen van het stuk geronnen bloed (r3).

(q3) [De stof, die in de borst is uitgestort, ontlast zig weléens (dan ook maar zeldzaam,) door den mond, den stoelgang, de pis, het zweet, zelfs uit eene geöpende ader, ja kan zig zomwijlen ook op andere plaatsen neêr-zetten. Zie hier voorbeelden van, bij GALENUS, FABRICIUS AB AQUAPENDENTE, TULP, BELLOSTE, en veele anderen. — Wij zelve hadden voor korten tijd eene bejaarde vrouw onder onze behandeling, welke alle de tekenen van eene etterborst (*empyëma*) had, doch kreeg onverwagts eene ontsteeking aan het linker been, die, niet tegenstaande alle voorzorgen egter tot suppuratie overging, en geöpend zijnde dagelijks eene groote menigte etter uitwierp. Dit had ten gevolge, dat deze vrouw van dien tijd af ruimer ademhaalde, en in de borst geene der voorige toevallen meer bespeurde.]

(r3) [Zie hier aangaande de oordeelkundige redenen van den beroemden SHARP, in zijne *aanmerkingen over de Heelkunde*, Hoofds. XXIII. — Dan om de operatie in dit gebrek geheel te verbannen en het geneezend vermogen aan de natuur alleen over te laten, gelijk die schrijver beweert, daar tegen zouden wij, onder zekere bepalingen,

„ Dit middel is zomwijlen van eene goede uit-  
 „ werking geweest; zeer kundige oefenende Heel-  
 „ meesters hebben zelfs bloed in de borst gelaat-  
 „ ten, dat zig reeds in de opening der wond ver-  
 „ toonde en er uitvloeijen wilde. De behande-  
 „ ling van deze ziekte zou mogelijk het beste ge-  
 „ volg gehad hebben, indien men, om de uit-  
 „ vloeijing van al het uitgestorte bloed te beguns-  
 „ tigen, zijne toevlugt tot de wicken, inspuitin-  
 „ gen en verscheiden andere middelen niet geno-  
 „ men had, welker nadeeligheid ik aangetoond  
 „ heb, zo dikwijls als zij door de wond zelve  
 „ aangelegd worden (s3).

veel zeggen kunnen; doch dit hier de plaats niet zijnde, zullen wij dit tot eene betere gelegenheid uitstellen.]

(s3) [Wij hadden reeds voor eenigen tijd onze aandacht gevestigd, op het onnatuurlijk behandelen dezer gebreken, voor dat ons het werk van den heer VALENTYN in handen kwam. Het was derhalven niet dan met een streelend genoegen, dat wij door deze uitmuntende verhandeling, en derzelver gegronde redenen, in onze gedagten gesterkt wierden, en volkomen het misbruik, der tot nu toe in de borstwonden met uitstorting gehoudene wijze, deed afkeuren; wij twijffelen ook niet, of ieder oplettend Heelkundige, die dit onderwerp volgens de aanwijzing van den kundigen VALENTYN behandelt, zal zig met ons over den gelukkigen uitslag zijner behandeling verblijden moeten.

Dan, het is ook niet alleen op de kennelijkste overtuiging van ons zelve, noch op het gezag van VALENTYN, dat wij ons tot voorstanders dezer wijze opdoen, neen: de beroemde VAN SWIETEN (en veelen met hem) heeft reeds in vroeger tijd geleerd: „ dat schoon uit de tekenen blijkbaar is, dat er bloed in de holigheid der borst is uitgestort, men egter hetzelfde niet moet uitneemen, voor dat gebleeken is, dat de gekwetste vaten geen bloed meer storten: „want”, zegt hij, „wat zal het helpen, bloed uit te haalen,  
 in-



„ *Van de kentekens der uitstortingen in*  
 „ *borstwonden.*

„ **H**ET was te wenschen, dat de kentekens van  
 „ het uitgestorte bloed in borstwonden zo zeker  
 „ waren, als het grootste gedeelte der schrijvers  
 „ schijnt te gelooven; doch de waarneemingen  
 „ getuigen van de grove mislagen, diemen zom-  
 „ wijlen begaan heeft, door uitgestort bloed te  
 „ vooronderstellen, daar er geen was, en ook  
 „ door zomtijds eene groote menigte daar van te  
 „ ontkennen. En deze mislagen beging men

indien de gekwetste en nog open vaten door *beweeving van het lichaam, zuiging, insputting &c.* zo getergd worden, dat zij blijven bloedstorten? Verder vervolgt hij, „ dat zo men uit de tekenen besluiten kan, dat de bloedstorting van binnen ophoud, men als dan veilig die poogingen der kunst mag beproeven, welken vereischt worden, tot uit- haaling van bloed in de holte der borst bevat. ” Zie de aantekeningen op de *aphor. boerb.* §. 303.

Wij kunnen derhalven niet afzijn, onze verwondering te betuigen, dat wij, in de Schriften van hedendaagsche be- roemde Heelkundigen, nog veelal den ouden regel, van namelijk door de *beweeving van den lijder, uitpersing door inademing, insputting* en wat dies meer zij, vinden voorgeschreven, zonder dat door hun niet dan in de uiterste noodzaaklijkheid de tegenopening word aanbevolen: daar hun nogthans, allérwaarschijnlijkst, de leszen van deze be- roemde mannen niet onbekend zijn. Wat tog, zoude men kunnen vraaggen, is de reden van deze slaafsche en voor den lijder gevaarlijke navolging der Ouden, daar reden en ondervinding de overtuigendste kenmerken van voordeel, aan deze voorgestelde, boven alle andere wijzen, toe- zwaaijen? ]

„ niet uit onagtzaamheid, maar wijl men geloofde, dat men alle mogelijke waarneemingen omtrent deze ziekte gemaakt had en dat er niets meer ter nasporing over bleef.

„ Als de gewonde moeilijk adem haalt, als hij niet wel anders dan op den rug kan liggen, als het hem onmogelijk is op de zijde tegen over de wond te liggen, als hij eene zwaarte boven het middenrif voelt, en dikwijls in flauwte valt, meende men, dat men aan de tegenwoordigheid van het uitgestorte bloed niet kon twifelen: deze kentekens worden als zo zeker aangemerkt, dat, wanneer men dezelve eens waargenomen heeft, men oordeelt geen verdere onderzoeking te moeten doen. Ondertuschen de ondervinding mij geleerd hebbende, dat men door deze toevallen kan bedrogen worden, agt ik mij verpligt, de gevallen, welken de oefenende Heelkunde mij opgeleverd heeft, openlijk bekend te maaken.

„ Ik werd voor eenige jaaren bij eenen ruitser geroepen, die aan de vierde lange rib, drie vinger breed van het botstbeen, eenen steek met den degen had bekomen; hij verhaalde mij, dat hij op het oogenblik, dat hij den steek kreeg, buiten kennis was neêrgevallen, en dat zijn tegenpartij en een zijner vrienden veel moeite gedaan hadden, om hem weêr te doen bijkomen: toen hij weêr een weinig bij zig zelfen was, hadden zij hem met eenen wagen naar huis gebragt, doch bij elken schok van het rijtuig was hij schier weêr flauw geworden. Ik zag hem eerst twaalf uuren na het geval; men had hem tweemaal adergelaaten en er was slegts wei-

„ nig bloed uit de wond gevloeid. Bij het eerste  
 „ verband had men er een compres op gelegd ;  
 „ die men in geestagtig wondwater had gedoopt ;  
 „ de lijder was bleek en zeer afgemat ; het adem-  
 „ haalen was zwaar, hij kon niet anders dan op  
 „ den rug liggen en meende eene groote zwaarte  
 „ op het middenrif te voelen ; met één woord ,  
 „ al de toevallen , welken uitgestort bloed ge-  
 „ meenlijk verzellen , waren hier vereenigd. De  
 „ Heelmeester, die hem voor mij onderzocht had ,  
 „ twijfelde niet, of de wond was doorgedrongen ,  
 „ en men zou er mij zelfs niet bij geroepen heb-  
 „ ben , indien men het dringend gevaar niet ge-  
 „ zien had. Ik beken , dat ik op het eerste oo-  
 „ genblik zelf geloofde , dat er bloed uitgestort  
 „ was : wij besloten , den gewonden nog eens  
 „ voor de derdemaal ader te laten en de wond  
 „ geheel eenvoudig te verbinden ; na verloop van  
 „ vier uren ging ik den lijder weêr bezoeken ,  
 „ en vond , dat hij meer beklemmdheid had , dat  
 „ hij meer afgemat was en alle toevallen beden-  
 „ lijker scheenen te worden ; met één woord , de  
 „ toestand des lijders scheen te vereischen , dat het  
 „ bloed , het welk men voor uitgestort hield , ont-  
 „ last werd : doch gelukkig weêrhieldd eene nauw-  
 „ keurige onderzoeking van de wond mij , om  
 „ mijn eerste denkbeeld te volgen.

„ Schoon de kleine omtrek van eene wond en  
 „ haare plaats boven eene rib geen genoegzaame  
 „ gronden zijn , waar op wij zouden mogen ge-  
 „ looven , dat zij niet doorgaan , te meer , daar  
 „ er degens zijn , welker plat geheel regt is en  
 „ daar de stand des gewonden de strekking kan  
 „ veranderen , zo was egter de wond , van de-



„ welke hier gesproken word , zo klein , dat ik  
 „ oordeelde , nauwkeurig te moeten onderzoeken ,  
 „ waar de toevallen van afhingen , die er  
 „ hier bij kwamen. Ik wilde derhalven ten eers-  
 „ ten de strekking der wond onderzoeken en  
 „ drukte zeer zagt met den vinger op haaren om-  
 „ trek ; den vinger op de rib stuitende , en in  
 „ eene schuine strekking van de wond naar het  
 „ borstbeen voordgaande , voelde de lijder een  
 „ zeer geweldige pijn en de engborstigheid en de  
 „ overige toevallen waren eenige minuten lang  
 „ ongemeen hevig. Zo dra ik dit onderzoek ge-  
 „ daan had , twijfelde ik niet meer , of al deze  
 „ toevallen , welken ons zo veel kwaads scheenen  
 „ te voorspellen , waren enkel veroorzaakt door  
 „ de kwetzing van eenige zenuw- en peesagtige  
 „ vezelen der groote borstspier ; ik stelde derhal-  
 „ ven den lijder ten eersten gerust , gaf hem den  
 „ raad , dat hij zig des nagts voor de vierdemaal  
 „ zou doen aderlaaten en eene kleine plaaster van  
 „ de *triapharmacum* op de wond leggen , met  
 „ eene pap van weekmaakende planten daar over.  
 „ Deze behandeling viel zo wél uit , dat ik hem  
 „ den volgenden morgen veel gebeterd vond :  
 „ men voer derhalven de volgende dagen met  
 „ dezelfde pappén voort en de toevallen ver-  
 „ dweenen zichtbaar ; ja hij werd ras weér zo her-  
 „ steld , dat hij kon uitgaan. Dit geval bewijst ,  
 „ hoe noodzaaklijk het is , onderzoekingen in  
 „ het werk te stellen , met oogmerk , om zijn  
 „ eerst opgevat gevoelen ter toets te brengen.  
 „ Wanneer de toevallen , die derzelver zetel  
 „ alleen in de deelen hebben , welken de borst  
 „ omgeeven , ons in zo verre kunnen bedriegen ,



„ dat wij uitgestort bloed vermoeden , daar er  
 „ geen is , zo kunnen de kentékens , welken in  
 „ de daad uitgestort bloed aanduiden , zómwijlen  
 „ zo verborgen zijn , dat zij door het scherpst-  
 „ ziende oog niet ontdekt worden. Het volgen-  
 „ de geval zal ten bewijze strekken , dat de meest-  
 „ geofende Heelmeesters zig in het beoordeelen  
 „ van zulke wonden kunnen vergisfen.

„ Een horologiemaker van omtrent twee en  
 „ dertig jaaren kreeg op de regte zijde tusfchen de  
 „ derde en vierde lange rib eenen steek met ce-  
 „ nen degen. Ik werd eerst den tweeden dag  
 „ daar bij geroepen. De Heelmeester , die van  
 „ het begin af bij hem was geweest , had hem  
 „ vijfmaal adergelaaten ; de wond was geheel  
 „ regt , het ademhaalen was maar matig moeilijk  
 „ en zonder veel zwaarte. De evenwigtige lig-  
 „ ging en die op den rug waren voor hem de  
 „ bezwaarlijksten , welken hij het minst kon uithou-  
 „ den , en hij bevond zig het gemaklijkst , wanneer  
 „ men hem zittende , met kussens ondersteund en  
 „ het lichaam een weinig naar de gewonde zijde  
 „ overhellende , plaatste ; hij klaagde over geen  
 „ zwaarte , die hij egter boven het middenrif had  
 „ moeten bespeuren. Wijl egter de pols hard was  
 „ en hij ook een weinig koorts had , lieten wij  
 „ hem des avonds in eenen tusfchentijd van zes  
 „ uren tweemaal ader , het welk hem ook voor  
 „ eenen korten tijd verligtte ; gedurende den nacht  
 „ liet men hem , schoon ik het nadruklijk verbo-  
 „ den had , vier of vijf glazen water en wijn drin-  
 „ ken , wijl de lijder geloofde door dezen drank  
 „ zijne kragten te herstellen. Men riep den vol-  
 „ genden morgen eenen der voornaamste Heel-

„ meesters van Parijs om met hem raad te plee-  
 „ gen; wij vonden den lijder geheel zwak, on-  
 „ derzogten de wond op nieuw, deeden hem ver-  
 „ scheiden bewegingen met het bovenlijf maa-  
 „ ken, om de werking der verschillende liggin-  
 „ gen te zien; als hij op de zijde tegen over de  
 „ wond ging liggen, bevond hij zig minder wél,  
 „ doch het ademhaalen scheen hier door niet zo  
 „ zeer gehinderd te worden, dat men het voor  
 „ een onfeilbaar teken van uitgestort bloed zou  
 „ hebben kunnen houden; ik beken zelf, dat  
 „ het niet mogelijk was, tekens te ontdekken,  
 „ volgens welken men met eenige zekerheid, zon-  
 „ der zig in het minste van de algemeen vastge-  
 „ stelde grondregels te laten afleiden, zou heb-  
 „ ben kunnen onderstellen, dat zulk eene groote  
 „ hoeveelheid bloeds in de borst uitgestort was,  
 „ dat men de operatie der etterborst moest on-  
 „ derneemen. Ik deed de raadgeevende genees-  
 „ heeren eene blaauwe vlek opmerken, die zeer  
 „ zichtbaar, tamelijk breed was en vier of vijf  
 „ vinger-breed onder de wond een weinig meer  
 „ naar agteren lag, en zig in een punt eindigen-  
 „ de, agterwaard tot aan den boog van het  
 „ darmbeen uitstrekte. Ik gaf hun te kennen,  
 „ dat dit reeds de derdemaal was, dat ik dit  
 „ kenteken vond, wanneer er bloed in de borst  
 „ uitgestort was. Na dat ik hun mijne ge-  
 „ dagten had doen verstaan, maakte ik hun de-  
 „ zelve nog klaarer, door hun in tegenwoor-  
 „ digheid van verscheiden kunstkundigen ee-  
 „ ne verhandeling voor te lezen, in dewelke  
 „ ik deze blaauwe vlek voor een der zekerste  
 „ kentekens van uitgestort bloed opgaf, en zom-

„ migen van hun bekenden , dat zij het in de daad  
 „ eenige reizen zo ondervonden hadden. Met één  
 „ woord , na dat ik nog uitvoeriger hier over  
 „ gesproken had , floeg ik de tegenopening op de  
 „ gewoone plaats voor.

„ Doch dit gevoelen scheen hun niet volkomen  
 „ gegrond te zijn en het was niet mogelijk de ge-  
 „ neesheeren hier van te overtuigen. Niettegen-  
 „ staande al mijne vertoogen werd deze blaauwe  
 „ vlek voor zulk eene gehouden , die door het  
 „ bloed veroorzaakt was en zig onmiddellijk van  
 „ de wond in het celledoek uitgebreid had , en  
 „ men vergenoegde zig met den lijder eenige le-  
 „ pels van een hartsterkend drankje voor te schrij-  
 „ ven ; doch dit middel was van de gewenschte  
 „ werking niet tegen de flauwten , welken steeds  
 „ toenamen , een koud zweet verspreidde zig over  
 „ al de leden , en vijftien dagen daar na overleed  
 „ de lijder. Toen men de borst opende , vond  
 „ men meer dan zes pond uitgestort bloed.

„ Het is niet moeilijk , zig van de onzekerheid  
 „ der kentekens van uitgestort bloed te overtui-  
 „ gen ; de bijzondere gesteldheid der ingewan-  
 „ den , welken in de borst besloten zijn , kunnen  
 „ de toevallen ligtlijk veranderen : zamengroeijn-  
 „ gen der long met het ribbenvlies of zelfs met  
 „ het middenrif kunnen zig zo vormen , dat het  
 „ uitgestorte bloed zig niet boven het ribbenvlies ,  
 „ noch zelfs boven het middenrif kan ontlasten ,  
 „ welke houding men den lijder ook doet neemen ,  
 „ en alsdan zijn de toevallen niet meer dezelfde  
 „ en men kan met geen zekerheid bepalen , of  
 „ er uitgestort bloed is.



„ De beklemdheid en moeilijke adem , ver-  
 „ ſchijnzels, die men insgelijks onder de zeker-  
 „ ſte kentekens van uitgeſtort bloed gerekend heeft,  
 „ hebben insgelijks veelen dikwijls bedrogen. De-  
 „ ze toevallen komen niet altijd met de kwetzing  
 „ van het ingewand en der vaten, welken in de  
 „ borst beſloten zijn, overeen, ook zijn zij niet  
 „ altijd geëvenredigd naar de menigte van het  
 „ bloed, dat in de holte uitgeſtort is; als het  
 „ bloed van den gewonden zeer verdund is,  
 „ wanneer het in de long komt, en als de lugt,  
 „ die hij inademt, warm is, word het ademhaa-  
 „ len afgebroken en moeilijk, de holligheid der  
 „ borst is nu niet toereikende, haare verwijding  
 „ of uitzetting word meer of min gehinderd,  
 „ zelfs, ſchooner geen uitſtorting van bloed plaats  
 „ heeft. Wanneer daar tegen de vaten der long  
 „ ſlegts weinig bloed bevatten, wyl de maſſa  
 „ van het bloed in het algemeen uitgeput is,  
 „ wanneer de vogten te vast zijn, ſchoon er eene  
 „ aanmerklijke menigte bloeds in de borst was  
 „ uitgeſtort, zal de gewonde zonder veel moei-  
 „ te ademhaalen: in dit laaſte geval behoeven  
 „ de ſpieren der borst, welken tot eene ſterke  
 „ inademing nodig zijn, zig niet te beweegen:  
 „ het middenrif is aan geen geweldige uitzetting-  
 „ gen onderworpen, en word ook niet geweldig  
 „ samengetrokken, zo dat het gewigt, het welk  
 „ het uitgeſtorte bloed op dit vlies veroorzaakt,  
 „ nauwlijks word gevoeld en de ademhaaling  
 „ ſchijnt dus in het geheel niets daar van gewaar te  
 „ worden. Hier uit volgt nu, dat de kentekens,  
 „ die men tot heden als de zekerſten van uitge-



„ stort bloed in de borst beschouwd heeft, zeer  
 „ dubbelzinnig zijn, en zeer ligt kunnen doen  
 „ dwaalen.

„ De blauwe vlek, van dewelke ik gesproken  
 „ heb, is een teken, dat aan zo veele zwaarig-  
 „ heden niet onderworpen is als de anderen, om  
 „ een kenteken van uitgestort bloed te zijn; in-  
 „ dien ik het mag zeggen, zo is dit het teken,  
 „ het welk ons het allerzekerst de waarheid kan  
 „ doen ontdekken; de nieuwigheid en het gewigt  
 „ van deze aanmerking kan mogelijk oorzaak  
 „ zijn, dat de kunstkundigen er zo veel geloof  
 „ niet aan geeven, als zij verdient; misschien  
 „ zou men mij ook kunnen tegenwerpen, dat ik  
 „ deze blaauwe vlek verwisselde met dezulken,  
 „ welken gemeenlijk de onderscheiden wonden  
 „ verzellen, of zelfs met dezulken, welken kun-  
 „ nen veroorzaakt worden door het vallen met de  
 „ gewonde zijde op eenig hard lichaam. Doch,  
 „ ik durf zeggen, dat een Heelmeester, die slegts  
 „ een weinig oplettende is, zig nooit zal kunnen  
 „ vergisfen; de beide soorten van vlekken heb-  
 „ ben zulke duidelijke kentekens, dat, indien  
 „ men de eene voor de andere nam, men dit  
 „ bedrog voor voorbedagtlijk zou kunnen hou-  
 „ den.

„ Wanneer de vaten, die dwars dooreene wond  
 „ geopend zijn, in plaats van het bloed naar bui-  
 „ ten uittestorten, het in het omliggende celle-  
 „ weefzel laten loopen, blijft er zonder tegen-  
 „ spraak eene blaauwe vlek over; doch deze ver-  
 „ toont zig ten eersten kort na het voorvalen men  
 „ ziet duidelijk, dat zij haaren oorsprong uit de  
 „ wond zelve neemt, het meest word zij in den

„ omtrek van dezelve gevonden, zij is donker  
 „ blaauw en heeft gemeenlijk eenige roode stip-  
 „ pen.

„ Eene vlek, die door eenen stoot of door eenen val op de borst word veroorzaakt, heeft dezelfde koleur, als de vorige; en heeft daarenboven dit nog bijzonder, dat de lijder, als men den vinger op de gedrukte deelen legt, een hevighe pijn gevoelt en aanstonds te kennen geeft, dat hij daar den stoot bekomen heeft. Deze kentekens komen in het geheel niet overeen met die van de blaauwe vlek, welke een teken van uitgestort bloed in de borst is; deze heeft andere kentekens, welke aan dezelve alleen eigen zijn; in welk punt van den omtrek der borst de wond mag wezen, zal nogthans deze vlek op dezelfde plaats zijn, naamlijk op de zijde, daar het bloed uitgestort is: zij begint naamlijk aan den hoek der korte ribben, neemt haare strekking naar de vierkante lendenpier en men bespeurt haar dikwijls op de oppervlakte van deze pier: haare koleur is als die der vlekken, welken zig na den dood op den buik vertoonen, namelijk helder violet; daarenboven verschijnt dit teken niet in het eerste oogenblik, men ontdekt het gemeenlijk eerst omtrent twee dagen na het geval; zomwijlen duurt het nog langer eer het zig vertoont. Men begrijpt ligtlijk, dat men deze vlek enkel aan het doorzijsen van het uitgestorte bloed moet toeschrijven; het dunste gedeelte van deze vloeistof dringt in de meest afhellende punten der borst door het ribbenvlies en komt zonder moeite aan de vingerswijze aangroeizels of uit-

„ einden, welken het middenrif vormt ter plaat-  
 „ ze, daar het vast is.

„ Het is niet alleen bij het uirstorten van bloed,  
 „ dat men dit uitzweeten der vloeistof, welke in  
 „ de borst besloten is, ontdekt, maar het vind  
 „ ook plaats, wanneer deze holligheid met water  
 „ of etter gevuld is. Schoon het niet tot mijn  
 „ plan behoort, hier de tekens van deze bei-  
 „ de soorten van uitgestorte vogten te beschrijven,  
 „ is egter deze tweede waarheid zo natuurlijk met  
 „ de eerste, van dewelke ik sprak, verknogt, en  
 „ daarenboven op zig zelve zo gewigtig, dat  
 „ ik ze onmogelijk met stilzwijgen kan voorbij  
 „ gaan.

„ Den 14 van bloemaand 1757 zag ik in het  
 „ ziekenhuis, waar in ik het opzigt heb, een'  
 „ man van vijftig jaaren, die eene rhumatike  
 „ koorts had gehad, verzeld van een hevig zijde-  
 „ wee; schoon de geweldigste toevallen gestild  
 „ waren en men den lijder reeds onder de genee-  
 „ zenen gerekend had, had hij egter nog eenen  
 „ kleinen hoest behouden, de pols was schier ge-  
 „ stadig koortsagtig, dikwijls werd hij huiverig  
 „ en het ademhaalen was ook nog gedurig moei-  
 „ lijk. Na een nauwkeurig onderzoek van deze  
 „ verschillende toevallen, twijfelde ik niet, of de  
 „ ontfteeking van het ribbenvlies, welke de eerste  
 „ oorzaak der ziekte was geweest, was tot eene  
 „ verettering overgeslagen. Ik wist, dat de lin-  
 „ ke zijde was aangetast geweest; maar, des niet-  
 „ tegenstaande, was ik niet zeker genoeg, om oo-  
 „ genbliklijk tot de opening der borst te beslui-  
 „ ten; ik poogde derhalven, bij elk bezoek nieu-  
 „ we ontdekkingen te doen. Den 21sten voelde



„ ik aan den hoek der drie korte ribben eene klei-  
 „ ne verhevenheid en lei op dit deel eene week-  
 „ maakende pap. Den volgenden dag vond ik  
 „ een veel duidelijker gezwel, doch ik kon geen  
 „ duidelijke uitstorting van vogten ontdekken,  
 „ ondertusfchen hoopte ik, dat, wanneer ik de-  
 „ ze foort van gezwel opende, ik de etter,  
 „ welker aanwezen de gemelde tekens buiten al-  
 „ len twijfel stelden, zou kunnen doen uitvloei-  
 „ jen. Zo dra ik deze incisie gemaakt had, zag  
 „ ik aanstonds, dat ik het middenpunt van het  
 „ gezwel niet getroffen had; midden door de  
 „ wond, uit dewelke flegts weinig bloed kwam,  
 „ zag men nog in het gezwollen celledweefzel  
 „ een eenigzins etteragtig bloedwater. Ik oor-  
 „ deelde derhalven, thans geen verdere onder-  
 „ zoeking te kunnen doen. Bij het eerste ver-  
 „ band lei ik flegts droog plukzel en daar over  
 „ dezelfde pap, waar van ik mij reeds de vori-  
 „ ge dagen bediend had, en deze pap liet ik drie-  
 „ maal daags ververschen. Den volgenden mor-  
 „ gen was het verhevenste gedeelte van het ge-  
 „ zwel boven de beide onderste lange ribben; de  
 „ incisie, welke ik daags te voren gemaakt had,  
 „ gaf eene tamelijk groote menigte geelagtig bloed-  
 „ water, ik verbondze op dezelfde wijze als den  
 „ vorigen dag en voer daar mede voort tot den  
 „ 26sten van deze maand. Op dien dag ontdek-  
 „ te ik bij het avondverband duidelijk een ge-  
 „ zwel tusfchen de tweede en derde lange rib,  
 „ van onder naar boven gerekend, in het welk  
 „ ik eene uitstorting van vogt bespeurde, Ik  
 „ opende derhalven aanstonds de borst tusfchen  
 „ deze beide ribben en zag er meer dan ander-



„ halve pint witagtige etter uitkomen; ik bragt  
 „ mijnen vinger in de borst en vond naar bene-  
 „ den eene tamelijk sterke vergroeiing, welke ik  
 „ oordeelde, te moeten vermijden, en bragt in  
 „ de wond zelve een reepje gerafeld linnen; ge-  
 „ durende de eerste agt dagen vloeide er des mor-  
 „ gens en des avonds eene genoegzaame menigte  
 „ etter uit. Ik bediende mij van de zuiverende  
 „ inspuitingen en de lijder was tegen het einde  
 „ van zomermaand weêr hersteld.

„ Dit is het eenigste geval niet, dat ik zou  
 „ kunnen bijbrengen, om te bewijzen, dat vloeis-  
 „ stoffen, die in de borst uitstorten, zig gemeenlijk  
 „ door een meer of minder merkbaar gezwel in  
 „ het celledweefzel, onder den beneden hoek van  
 „ deze holligheid, ontdekken. Ik heb nog op  
 „ drie onderscheiden reizen het zelfde teken bij  
 „ zieken gevonden, welken aan eene ontsteeking  
 „ der long stierven, die met eene verettering  
 „ eindigden. Bij verscheiden zulke gelegenheden  
 „ verzette men zig tegen de operatie, die  
 „ ik voorsloeg; zelfs kon ik maar eens verlof  
 „ bekomen, om onderzoekingen en waarneemin-  
 „ gen met zulk een lijk in het werk te stellen,  
 „ waar in ik meer dan drie pinten van een etter-  
 „ agtig bloedwater vond, het welk in de linke  
 „ holte der borst uitgestort was ” (13).

(13) [ Het is veelal zeer moeilijk, mit de tekenen te kun-  
 nen opmaaken, dat er bloed, water of etter in de hollig-  
 heid der borst is uitgestort. De twijfelagtigheid der onder-  
 scheiden kenmerken, welken de heer VALENTIJN in deze ver-  
 handeling opgeeft, zijn door veelvuldige waarneemingen  
 niet dan te duidelijk blijkbaar. Doch, ook dit heeft niet  
 in alle voorkomende gevallen, waar in bloed in de borst-

De operatie der etterborst bestaat in de opening, welke men in de borst maakt, om aan de uitgestorte stof eenen uitgang te verschaffen. Men kan deze opening met den troicar of met het incisiemes maaken. In eene waterzugt der borst verkiest men den troicar, en bloed of etter zig in de holligheid der borst bevindende, bedient men zig liever van het incisiemes (113).

holte is uitgestort, plaats; zomwijlen zijn de tekenen zo klaarblijkelijk, dat men weinig ervaating nodig heeft om hetzelfde te ontdekken. In twijfelagtige gevallen nogthans, kan zomwijlen de vogtschommeling eene meer dan gewoone uitzetting der borstholte aan de beledigde zijde e. z. v. genoegzaam bewijzende kenmerken eener vogtverzameling opleveren. — Dan in alle deze gevallen zal een samenloop van bijzondere verschijnselen de kennis der zekerheid zo tot het een als ander den Heelmeester rigten.]

(113) [Het is in alle geleegenheden veiliger, altoos gebruik van het mes te maken: met hetzelfde komt men langzaam als bij trappen in de holte der borst: en wanneer de long aan het ribbevlies mogt verknogt zijn, blijft altoos tijd genoeg over om dezelve alvorens voorzigtig af te scheiden, zonder gevaar te loopen van dezelve te kwetsen. Wanneer men gebruik maakt van den troicar, is men veelal in gevaar de long ter plaats zijner vastkleeving te treffen en soms doodelijke toevallen te veroorzaken. Wel is waar, dat onze schrijver deze wijze alleenlijk aanraad; in geval van eene uitsporing van water; en zo zij ooit te pas komt, is het waarlijk in dit geval alleen, waar in zij zonder eene grove mistasting zou kunnen gebezigd worden. Dan ook, schoon wij bewust zijn, dat bij eenen borstwaterzugtigen de long zeldzaam aan het *pleura* is vastzittende bevonden, en dat eene zekere hoeveelheid water eene genoegzame ruimte tusschen deze twee deelen, tot eene veilige instooting voor de punt van den troicar overlaat; zo moeten wij egter aanmerken, dat de ondervinding hier in meermaalen getoond heeft, dat eene zeldzaamheid geene onmogelijkheid is.]

Om de borst met behoorlijke zekerheid te openen, moet men zig telkens wél in het geheugen brengen de plaatsen, aan welken het middenrif rondom vast zit, verders ook de natuurlijke ligging, de veranderingen van het gewelf van dit dwars liggend vlies, als mede de veranderingen, welken door de tegenwoordigheid der uitgestorte stof en door de toevallen, die er bijkomen, veroorzaakt worden, wél in aanmerking heemen. Dit middenshot, het welk, dwars door, de borst van den buik scheid, ligt niet in evenwigt; maar het is van vooren naar agteren, van het zwaardvormige kraakbeen tot aan de wervelbeenen der lendenen, daar het vast is, af hellende en vormt door deze ligging eene schuine vlakke in vergelijking van de as des lichaams. Het middenpunt van dit middenshot ligt zig gewelfswijze in de hoogte en wel naar de borst, daar hetzelfde het zogenoemde *gewelf van het middenrif* vormt. Bij het ademhaalen zinkt dit gewelf nederwaard en word plat; bij het uitademen reist het om hoog en word verhevener. Als er eene verzameling van etter of water in de borst is, welke op dit gewelf drukt, word het daar door vlakker. De toevallen, welken bij uitgestorte vogten in de borst plaats hebben, als bij voorbeeld de moeilijke ademhaaling, de benauwdheid en het stikken veranderen ook de ligging van het gewelf des middenshots. Daarenboven moet men weeten, dat eene uitgestorte vloeibaare stof, van welken aart dezelve ook mag wèzen, als zij in de holligheid der borst uitgestort is, de long op de zijde, daar zij vast is, als te zamenrijgt en inkrimpt, en dat de long zig dus van het middenrif en de korte ribben



ribben verwijdert. Het ribbenvlies openende, behoeft men in zulk geval nooit te vreezen, de long te kwetzen, ten ware zij juist ter plaatze, daar men de opening er in maakt, met het ribbenvlies vergroeid was.

Daar zijn twee plaatzen, waar men deze opening gemeenlijk maakt; de eerste is, daar men het uitgestorte vogt duidelijk voelt, en deze plaats noemt men dan de plaats der noodzaaklijke opening, gelijk in een diep ettergezwel of in eene besloten etterverzameling, welke zig in de borst vormt en in haaren omtrek in een punt voornaamlijk door eene uitstorting, die men kan voelen, zichtbaar word, en in het geval, daar de etter, schoon dezelve in de borst uitgestort is, nogthans tusschen de beide ribben een gezwel maakt, gelijk ik zulks waargenomen heb. De tweede plaats is die, welke men bij voorkeur juist tusschen de derde en vierde onderste korte ribben verkiest ter plaatze, daar de ribben het meest gebogen zijn, dat is vier of vijf vinger breed van den ruggraat (v3).

(v3) [ Wanneer men de schrijvers over de plaats om deze operatie te verrigten, raadpleegt, zal men uit dezelve kunnen opmaken, dat het bijna het zelfde is, waar men de opening maakt. Zij verschillen bijna allen in plaats, en een ieder hunner geeft aan de zijne de voorkeur. Dan, zij zijn ook, hoe verschillend, meest al navolgbaar; en zo geene bijzondere reden tot het verkiezen van de eene of andere plaats den Heelmeester noopt, zouden wij de verkiezing aan het eigen goëddunk van den zelven over laten; mits in agt nemende, niet te kort aan de ruggegraat en te na aan de twee onderste korte ribben te komen.

Zo wij egter eene wijze ter navolging aanprijzen, zo is het die van SHARP, welke ons het geschiktst voorkomt. De-



Wanneer op beide zijden in de holligheid der borst bloed of eenige andere vloeibare stof mogt uitgestort zijn en gunstige omstandigheden een goed gevolg van de operatie deden hoopen, moet men zig evenwel zeer wagten van op beide zijden dezelve te zelfden tijde te onderneemen, wijl de dood des lijders onfeilbaar het gevolg zou zijn (w3). In zulk geval vergenoegt men zig voort eerst met de uitgestorte stof op de eene zijde te ontlasten, en als de lijder deze ontlasting wél uitgehouden heeft, en weinig etter door de opening uitloopt en dezelve weér begint te sluitten, dan kan men de operatie op de andere zij-

ze groote Heelmeester maakte tusschen de zesde en zevende ribbe, halverweegs tusschen het borstbeen ende ruggegraat, eene opening. „Deze plaats”, zegt hij, „is zo wel, als de patient nederligt, de laagste, als de andere, wanneer hij opzit de laagste is; en door de doorsteeking ter dezer plaats, en op deze manier te doen, vermijden wij alle de onvolkomenheden, die aan de andere manier vast zijn. Op dat gedeelte van de borst maaken de spieren weinig dikte van vleesch, de slagader loopt onder de ribbe en het *diaphragma* is ver van de wond af gelegen” e. z. v. Zie zijne *Oordeelkundige Aanmerkingen over de Heelkunde* bl. 372. Het is SHARP niet alleen, die deze hoogte aanbeveelt, BOERHAAVE bepaalde ook de plaats dezer opening tusschen de vijfde en zesde ribbe, doch maar ééne hand breedte van de ruggegraat, *aphor.* §. 303.]

(w3) [De baron van SWIETEN heeft hier over proeven op Dieren genomen, en bevonden, dat geene te groote opening der beide borstholten, zonder gevaar, bij noodzaaklijkheid, in het werk zou kunnen gesteld worden. Zie de *aantekeningen op de korte stellingen van BOERHAAVE*, §. 170. n. 4. — Wij zelven zouden dit met eigen proeven verder kunnen staaven, zo wij niet overtuigd waren, dat die door van SWIETEN genomen, genoegzaam en voldoende tot dit onderwerp waren.]

de doen. Wanneer men in de noodzaaklijkheid is, de tweede operatie ten eersten weinige dagen na de eerste te doen, dan moet men wél agt geven, dat men de beide wonden nooit te gelijk open laat, want zulks zou den lijder kunnen doen stikken.

De lijder moet op den kant van zijn bed zitten en met kussens ondersteund worden, de borst naar vooren en een weinig naar de tegengestelde zijde overbuigen en door de helpers gehouden worden; alsdan vat de Heelmeester de huid omtrent vier vinger breed onder den beneden hoek van het schouderblad en vier of vijf vinger breed van den ruggraat, om eene dwarsvouw te maaken, welke hij aan de eene zijde door eenen helper laat vast houden en aan de andere zijde zelf met de linke hand vat; in de regte hand heeft hij een incisiesmes met een bolle snede, hier mede snijdt hij de vouw tusfchen zijne vingers en die van den helper door, zo dat het eene langwerpighe snede word van drie of vier vinger breed. Als de spiervezelen van de groote ruggespier, welke hier ligt, niet mede doorgesneden worden, scheid men ze met het zelfde instrument en ontbloot hier door twee of drie ribben; als dan zoekt hij met den vinger de ruimte tusfchen de derde en vierde korte rib, daar hij de opening wil maaken en deze ruimte vergroot hij door den lijder de borst naar vooren en een weinig naar de tegengestelde zijde te laten buigen, wijl de ribben zig alsdan van elkander verwijderen. Met hetzelfde incisiesmes, op welks rug hij den voorsten vinger tot aan de punt uitsteekt en aanlegt [zó, dat de beide zijden van dezen vinger de randen der twee rib-

ben, tusſchen welken men ſnijdt, aanraaken,] ſnijdt hij van boven naar onder de beide vleefchlaagen der ruggeſpier door en opent aanſtonds het ribbevlies telkens van boven naar beneden. De opening op deze wijze maakende, vermijdt hij de ribbeſlagader, welke aan de binnevlakte der onderſte uitsnede van de vierde korte rib ligt (\*). Zo dra men in de borst komt, vloeit de uitgeſtorte ſtof door de opening uit. Men moet telkens maar eene kleine hoeveelheid laaten uitvloeijen, ten einde der lange tijd te geeven om zig te ontwikkelen, zig allengs uittèzetten en de plaats weêr in te neemen, welke door de uitgeſtorte ſtof bezet was. Men brengt dan tot in de holligheid der borst een reepje gerafeld linnen, het welk de uitgeſtorte ſtof moet afleiden en het welk men door middel van eenen draad, die door het midden van eene klevende plaaster gaat, vastmaakt, ten einde het reepje niet loſſchiete en in de holligheid der borst valle: als men het reepje in de borst heeft gebragt, legt men er de plaaster op, die zig aan de huid vast kleeft, en daar over veel ruuw plukzel en compresen, welk alles men door den lijfband en ſchouderband verzekert. Al de volgende verbanden moeten op dezelfde wijze gemaakt worden, naar dat men namelijk voor dezelven een' langeren of korteren tuſſchentijd bepaalt, naar dat het meer of minder uitſtorten der

(\*) Wijl deze egter nu en dan ſlangwijze voordkruipt en namelijk groote boogen maakt, gelijk ik zelf een dergelijk preparaat bezit en een tweede te Dresde in de *Charité* gezien heb, moet men deze operatie altijd met veel omzigtigheid onderneemen. I.

stof zulks verëischt. Wanneer er nog langentijd stof uitvloeit, sluit de wond zig slegts allengs; om nu dit te beletten, moet men bij elk verband eene stompe sonde door de opening naar boven en naar beneden brengen, alsdan de lippen der wond van elkander doen en een lemmet van gerafeld linnen hier door haalen, het welk de geheele wond kan vullen. Wanneer men, niet tegenstaande deze voorzorg, merkte, dat de wond wilde toefluiten en dat zij zo nauw wierd, dat de uitgestorte stof niet meer vrij uit kon vloeijen, zou men in plaats van het lemmet eene platte wiek van plukzel of gewoone gomplaaster of van de Nurenburger plaaster moeten gebruiken en door middel van eenen draad, door eene groote plaaster gehaald, vastkleeven, om te beletten, dat deze wiek er niet uit valt of in de holligheid der borst geraakt (x3). Ik verkies altijd de wicken boven de pijpjes, welken zonnige Heelmeesters in de opening leggen, wijl de pijpjes het ademhaalen te zeer verhinderen. Als men genoodzaakt is, zulk een wiek te leggen, moet men het verband ook meermaalen herhaalen.

(x3) [Het zoude niet dan schadelijke toevallen kunnen veroorzaaken, wanneer door onvoorzigtigheid des Heelmeesters plukzel of iets anders in de holligheid der borst geraakte. Het zoude in een zodanig geval altoos niet gaan, als waar van TULP verhaalt in het *tweede boek, Hoofdst. 15.*, alwaar gezegd word, dat twee steekwicken, die door de wond in de borst waren ingevallen, na verloop van drie maanden, door eenen hoest uit den mond te gelijk met veel etter geloosd wierden. Buiten eene opening in de groote vaten der long, of een verzworeen en daar door geöpend gedeelte derzelve, zou dit geval waarfchijnlijk nimmer plaats gehad hebben.]



Wanneer eene etterverzameling door een gezwel tusſchen de beide ribben te kennengegeven, en de uitſtorting met den vinger gevoeld word, zo heeft het allen mogelijken ſchijn, dat het middenpunt of de zak van deze etterverzameling, welke de ſtof in zig bevat, met het ribbevlies vergroeid is en wel daar, waar het gezwel zig vertoont. Ondertuſſchen ſchiet zomtijds ook de uitgeſtorte etter, welke in de borst drijft en dus in geen zak beſloten is, tusſchen de ribben in, verzamelt zig hier en maakt een golvend gezwel, gelijk ik reeds hier van gewag gemaakt heb. Het onderscheid tusſchen een gezwel, dat door eenen etterzak word voordgebracht, en een gezwel, dat door de in de borst vrij uitgeſtorte ſtof gevormd word, beſtaat daar in, dat het eerste zig op verſcheiden plaatzen van den omtrek der borst vertoont, terwijl het andere gemeenlijk een weinig boven de plaats, daar het middenrif vaſt is, zichtbaar word. Betreffende de wijze, om zulke etterzakken te openen, wij hebben reeds in het zesde hoofdstuk daar van gehandeld.

Om het water uit de holligheid der borst te ontlaſten, moet men den lijder op de bekwaamſte en voordeeligſte wijze plaatzen en alſdan met eenen troicar tusſchen de vierde en vijfde rib de doorboring doen: ik verkies deze plaats, wijl men daar minder gevaar loopt, het middenrif met de punt van den troicar te raaken, het welk men, niet tegenſtaande het aanwezen van het water, egter, wanneer het zig bij eene ſterke uitademing in de hoogte begaf, op het oogenblik dier doorboring zou kunnen kwetzen. Als men den troi-

car hier insloot, vloeit het water er zo wel uit ; als wanneer de opening onder de vierde rib gemaakt was.

In eene borstwaterzugt is de omtrek van de holligheid der borstzomwijken zo opgeblazen, dat men geen ruimte tusſchen de ribben kan gewaar worden, daar men de doorboring zou kunnen doen. In zulk geval moet men MORAND navolgen (\*), die in een dergelijk geval deze opblazing door eene ſterke drukking met de toppen der vingers plat drukte, om de ruimte tusſchen de ribben behoorlijk te vinden en het instrument tusſchen de beide ribben, in eene rigting omtrent even ver van beiden verwijderd, in te ſtooten. Deze groote Heelmeester wil, volgens juiste gronden, dat men de vogtigheid niet op eens aftappe, ten einde aan de long, gelijk hij zegt, tijd te laaten, om zig te ontwikkelen en op dat het middenrif zig allengs naar de borst toe zou kunnen welven, zonder eene plotze verandering in de holligheid te weeg te brengen.

Bij de geneezing der borstwaterzugt, welke hij door de operatie geneest, en die hij ter bovengemelde plaats beſchrijft, heeft hij waargenomen, dat zo dikwijls als men de ſonde in de holligheid der borst bragt, men dezelve vier of vijf duim daar in kon brengen, zonder eenig inwendig deel te raaken of te ſtooten. Hij beſluit hier uit, dat men al het uitgeſtorte niet op eens moet ontlasten en dat het mogelijk beter is, de opening der borst eerſt als dan werkelijk te maken, na dat men reeds eene of twee doorboringen gemaakt

(\*) *Mémoires de l'Acad. de Chirurgie, T. II. p. 546.*

heeft, ten einde de long zig allengs zou kunnen uitzetten (y3). Hij klaagt, dat men de oefening dezer operatie zo verwaarloosd heeft, en dat men zo veel menschen heeft laten sterven, die men hier door van den dood had kunnen redden: hij moedigt de Heelmeesters aan, dezelve meer te onderneemen, wijl zij op zig zelve niet gevaarlijk is, en wijl hij beweert, dat, wanneer weinig borstwaterzugtigen door de operatie geneezen werden, zulks geschiedde, wijl men ze niet dikwijls geöfend en beproefd had. Ook bevestigt het goed gevolg der aangehaalde waarneeming de waarheid van deze stelling (z3).

(y3) [HIPPOCRATES heeft reeds dezen regel voorgeschreeven, en zegt: „ dat, wanneer de etter of het water in eens uit deze deelen (de borst namelijk) ontlast word, de lijders terstond sterven. ” *Aphorismæ*, 77. — „ In etterborst of borstwater, ” zegt van SWIETEN, „ is de long lang doorweekt geweest van den rondom bespoelden etter, of buiten de vaten gestort waterig vogt, waarom deze geheele verzameling tevens en in eens ontlast zijnde, het bloed, de bijna verteerde longvaten schielijk verwijderende, dezelve zou kunnen breeken, waar op de dood spoedig volgen zou. ” Zie zijne *aant. op* BOERHAAVE, §. 303. — Wij merken hier bij aan: dat deze regel niet alleen in dit geval plaats heeft; maar bij alle gelegenheden, waar eene groote menigte vogts in eene holligheid verzameld zit, en ontlast moet worden, deze ontlasting niet op eens, maar in verscheide tijden agter den anderen moet verrigt worden.]

(z3) [Welke de redenen zijn, waarom deze operatie zeldzamer dan in de buikwaterzugt verrigt word, gelooven wij eensdeels te moeten stellen, in de weinige goede gevolgen dezer operatie op dit deel; en anderdeels in de afraadende taal van eenigen onzer beroemdste Geleerden. PLATNER, b. v. wil, dat men zelden bij waterzugtigen van deze operatie gebruik maake; als ook bij eene verzwering

## AGTTIENDE HOOFDSTUK.

*Van de trepancering of doorboring der hersenpan.*

**I**N het algemeen verstaat men door trepancering de opening, welke men in eenig been maakt, het zij om de stof van eene etteragtige verzameling, welke in een pijpbeen zit, te laten uitvloeijen, of om een vreemd lichaam, dat zig hier gezet heeft, er uit te haalen, of om de afscheiding van een stukje been, dat van den winddoorn [*Spina ventosa*] aangetast is, te hulp te komen, door hetzelfde op verscheiden plaatzen met de perforatiestrepaan te doorbooren; of om het bloed of de etter, welke op het harde hersenvlies en de hersenen uitgestort kan wezen, te doen uitvloeijen, of om enkele reeds afgescheiden beenderen, die het harde of weeke hersenvlies zouden kunnen beledigen, weg te nemen, of eindelijk ook om het borstbeen te doorbooren (a4). Ik zal hier alleen van het gebruik der tre-

der long, en als de etter uit een *absces* gestort reeds verouderd is, en de long aangestooken heeft; want zegt hij, „gemeentlijk word daar door de dood verhaast.” *Handleidinge tot de Chirurgie*, D. 1. § 661. Zie ook SHARP, welke deze operatie alleenlijk toestaat, in eene waare en bepaalde borstwaterzugt, en in eene gestadige uitstorting van etter, uit een *absces* der long in de holligheid der borst. *Oordeelk. Aanm.* in het 23. en 24. Hoofddeel.]

(a4) [Deze operatie word ook gedaan, wanneer de hersenpan gescheurd, doorkliefd of gebroken is; als mede bij deszelfs nederdrukking, om dat dit aan een volwas-



paan bij de hoofdbeenderen spreken, het welk tot een onderrigt kan dienen, hoe men deze operatie ook aan andere beenderen kan in het werk stellen.

Bij het trepaneeren der hersenpan moet men voornaamlijk op drie hoofdzaken letten; de eerste bestaat in de behoorlijke ontbloting van het been, de tweede in de wijze om het te doorbooren en de derde leert, hoe men de vreemde lichamen uitneemen en de stukken been, welken hunne rigting verlooren hebben, weer behoorlijk inbuigen zal.

Voor eerst moet men te dien einde de gereedschappen gereed leggen, welken men nodig heeft,

senen niet dan met een scheur of breuk der binnenste tafel verzeld gaat; en eindelijk in alle zodanige beledigingen van het hoofd, waar in de toevallen na eenig tijd verloop aanmerkelijk vermeerderen en daar door de kenmerken van uitstorting, verzwearing enz. op het harde hersenvlies opleveren.

Het is zeer noodzaaklijk, dat elk, die deze operatie bestuderen en oefenen wil, zig alvorens toelegge, om de waare kentekenen der noodzaaklijkheid dezer operatie op te spooren. Wij bekennen, wel is waar, dat dezen den geöfenden zomwijlen verlegen doen staan en hij uit eenen bijzonderen zamenloop nauwlijks weet, wat te besluiten: dan, dit behoort onder de moeilijke en zeldzame gevallen. Eene nauwkeurige waarneeming van de toonende verschijnselen, zullen aan den oplettenden Heelmeester veelal op eenen wislen grond zijn besluit doen neemen. — Het is hier de plaats niet dit verder te betoogen; noch ook de waare gevallen, waar in de Pandoorbooring vereischt word, voor te stellen. Wij wijzen den Lezer naar de uitmuntende *waarneemingen &c.* van den heer QUESNAY, in de *verbandelingen van de koninglijke academie der Heelkonst.* Zie ook J. Z. PLATNER *Handl. tot de Chirurgie*, §. 535. (†).]

om de wond te verbinden, die men; voor dat men de trepaan aanlegt, gereed moet maaken en men moet ook tevens de instrumenten bij de hand hebben, met welken men het been ontbloot, op dat de breuk des te duidelijker in het oog valle. Deze gereedschappen bestaan in eene servet, om er het hoofdverband van te maaken, in compresfen, eene genoegzaamemenigte gefchaafd en ruuw plukzel, in eenige incisiemesfen om naar vereisch te kunnen kiezen, in een scalpel met eene elpenbeenen greep en eene fchaar.

Zodra de hairen van het hoofd des gewonden te deeg afgeschoren zijn, legt men het hoofd op eenen verscheidenmaal toegevouwen doek en wel zo, dat het gedeelte, in het welk de breuk is, [zo veel mogelijk] naar boven komt te liggen, het zij dat er eene wond is of niet; alsdan maakt de Heelmeester, die de operatie doet, boven de plaats, daar de breuk is, eene incisie. Deze incisie moet verschillende zijn en zig naar de ontelbaar veele omftandigheden rigten, welken een kundig Heelmeester moet kennen en onderscheiden, waarnaar het dan nodig kan zijn dezelve over het kruis te maaken of haar de gedaante van eene X of van eene T of van eene V of van de talletter 7 te geeven. Als hij de incisie met een wél snijdend incisiemes gemaakt, en de huid der hersfenpan langs den geheelen omtrek der incisie wél doorgesneden heeft (b4), fcheid

(b4) [Bij eene breuk of aanmerklijke scheur der Hersfenpan, moet men, in het doorsnijden der zachte bekleedzelen, voorzigtig zijn, het incisiemes niet te ruuw en op ééns door alle deze bekleedzelen tot op de pan door te drukken; de punt daar van zou zomwijlen tot in de hers-

hij de vergroeiing derzelve met het been met het einde der greep van de scalpel behoorlijk af en snijdt de hoeken door en neemt ze weg. Als men nu de breuk en het gedeelte des beens, op het welk men de trepaan wil aanleggen, op deze wijze ontbloot heeft, belegt men de wond met eene genoegzaame menigte geschaafd plukzel en daar over legt men ruuw plukzel, nevens eenige compresen, welk alles men overdekt en verzekert met den hoofdband (c4). Twee, drie of vier uren zijn genoeg om het bloed op die wijze te stelpen, dat men de trepaan kan aanleggen, zonder door het bloed gehinderd te worden (d4).

senen zelve doordringen en dodelijke toevallen verwekken: maar men zal omzigtig en door herhaalde snijdingen deze deelen doorklieven.]

(c4) [Door dit verband zoude men kunnen verstaan den zogenaamden hoofdband *Le grand couvre chef*; doch het zeshoofdig verband zal onzes bedunkens hier in, als ook tot het verband na de operatie veel beter geschikt zijn. Men zie deszelfs beschrijving en afbeelding onder anderen in *de oeffenende Heelkunde van D. VAN GESSCHIER D. I. bl. 465. Pl. XIII. fig. 1.*]

(d4) [Het plagt een algemeene regel te zijn, dat, hoe dringende ook de gevallen waren, men egter eenige en zomtijds verscheide uren, na dat de pan van zijne bekleedzelen op de bepaalde plaats ontbloot was, vertoefde, alvorens men de operatie der doorbooring begon. Eene handelwijs, die zo dikwerf de droevigste gevolgen opleverde en niet zelden de dood, voor dat de operatie verrigt was, deed triumfeeren.

Onze kundige schrijver neemt dezen uitstap korter en bepaalt slegts *twee, drie of vier uren* als genoeg. Dan ook dit kan in dringende omstandigheden te lang zijn: en wat teg zoude, in een dusdanig tijdgewrigt, beletten, na het ontblooten der pan aanstonds de operatie te onderneemen? de bloedstorting is nimmer zo aanmerkelijk, of kan door eenige reepjes zwam, spons enz. oogenbliklijk

Voor dat men de trepaan aanlegt, flopt men den lijder de ooren met katoen of plukzel (*e4*).

Als men dan het eerste verband en het plukzel behoorlijk en voorzigtig afgenomen heeft, om de wond niet weêr aan het bloeden te maaken, legt men den lijder op den kant van het bed, met het hoofd op een kussen, dat met eenen verscheiden reizen dubbeld gevouwen doek bedekt is en waar onder men eene tinnen plaat [schotel of plank] legt. Hierop maakt de Heelmeester met den diamant eener losse trepaankroon een teken om de plaats aan te wijzen, daar hij de trepaan wil zetten. Als het stuk been, waarin de breuk is, vast en op geenerlei wijze ingedrukt is, kan hij de kroon der trepaan regt boven de breuk zetten; maar als dit stuk niet stevig genoeg is, moet hij ze ter zijde boven het gezonde been zetten en agt geven, dat de kroon boven de scheur van het been vatte (*f4*). Als dan neemt hij de trepaan,

tegegengaan worden: en gebeurde het al, dat een slagader-takje eenige hoeveelheid bloed stortte, zo zal de onmiddlijke onderbinding, of wel de drukking des vingers van eenen bekwaamen helper dit toeval spoedig tegengaan. Zie ook SHARP *oord. aanm. bladz.* 393. VAN SWIETEN, *aphor.* §. 287. GESSCHER, *oeff. Heelk. D. III. bl.* 126. en meer anderen.]

(*e4*) [Deze voorzorg, schoon gering, is egter in de meeste gevallen onnodig. De meeste Lijders, welke getrepaneerd worden, zijn, door de drukking of belediging, welke op het harde hersenvlies plaats heeft en daar door aan alle de bevatte deelen van het hoofd word medegedeeld, onvatbaar voor alle zinnelijke aandoeningen: bij gevolg kan noch zal het geruis der booring op hun gehoor geen gevoel of schade aanbrengen.]

(*f4*) [De plaats, waar men de trepaan zetten moet, moet juist die zijn, welke of beledigd is, of onder welke de



die met een perforatief voorzien is , in de regte hand , zet de punt in het gemaakte teken , en stelt ze zó , dat de boom eene perpendiculaire lijn beschrijft boven de plaats , die hij wil doorboo-

uitstorting vermoed word. In het eerste geval moet men nimmer de boor op losse beenstukken of schilfers zetten ; ook niet op scheuren , welker lengte de cirkel van de kroon der trepaan niet bevatten kan ; maar in zodanig een geval moet de buitenste omtrek der kroon juist den rand der breuk of scheur bevatten. In het tweede geval behoeven deze voorzorgen niet , en het hangt alleen van het oordeel des Heelmeesters af , dezelve wat hoger , lager of ter zijde te maaken. Is er eene wond der bekleedzelen bij , en de plaats geschikt voor de operatie , dan zal men dezer plaats , om geene nieuwe wond te maaken , den voorrang geeven. Dan het is niet even veel , waar en op wat plaats de operatie verrigt moet worden : er zijn zodanigen , waar op dit volstrekt onmogelijk of ten uiterste gevaarlijk is ; en weder anderen , die niet dan in de uiterste noodzaaklijkheid doorboord mogen worden. Tot de eersten komen in betrekking alle de deelen , welken den grond van het bekkeneel uitmaaken : tot de laatsren behooren de voorhoofdsboezems , de schelpwijze deelen der slaapbeenderen en de naaden ; vooral de pijnnaad , uit aanmerking van de onmiddlijke onderligging des langwerpigen boezems van het harde hersenvlies. Wij zeggen : dezen mogen niet dan in de uiterste noodzaaklijkheid doorboord worden. En schoon de Ouden de operatie op dezelve volstrekt verboden , zo hebben nogthans latere Heelkundigen , door de blijkbaarste bewijzen , de noodzaaklijk- en mogelijkheid derzelve aangetoond. Zie , onder anderen , VAN SWIETEN , *aphor. Boerb.* §. 284. SHARP , *oordeelk. aanm. bl.* 394. LE DRAN , *oper. bl.* 374. GESSCHER *oefenende Heelk. D. III. bl.* 124. *e. z. v.*

Er zijn zomwijlen wel tekenen , dat er bloed , etter enz. onder de hersenpan is uitgestort , doch de zekere plaats is duister of zoms geheel onbekend : in zo een geval mag men willekeurig op eene der zijden van het hoofd de operatie verrigten , en bij eene vrugtelooze doorbooring dezelve op de andere zijde herhaalen.]

ren; legt den duim en voorsten vinger der linke hand ringswijze om den knop der trepaan, en zet de kin in dien gemaakten ring, om dezelve tot een steunpunt te doen dienen; in dien stand vat hij met den duim en twee vingers der regte hand den boog der trepaan en draait van de regte naar de linke zijde om een gat te maaken, waar in de punt van den diamant vast moet zitten; zo dra dit gat gemaakt is, neemt hij de perforatietrepaan weg of laat ze door eenen helper wegneemen, en neemt dan de kroon, die met den diamant voorzien is; hij zet de punt van denzelven in het gat, dat met de perforatietrepaan gemaakt is, en plaatst zig weêr in dezelfde houding als te vooren, draait de trepaan van de regte zijde naar de linke en zaagt het been er kringswijze uit. Zo dra hij de kroon omtrent eene lijn diep gebragt heeft, ligt hij er de trepaan uit, maakt eenen halven boog van de linke naar de regte hand en neemt er den diamant uit, want deze is van geen nut meer en zou zelfs het harde hersfenvlies kunnen kwetzen, als het been nog verder doorgezaagd werd; reinigt de tanden der kroon met een borsteltje en veegt het zaagzel weg; haalt de punt van eenen tandestooker of iet dergelijks door de gemaakte kringswijze groeve, welke men in het been gemaakt heeft, zo om het zaagzel er uit te doen, als om te onderzoeken of de groeve in haaren omtrek gelijk zij; boord het gat, welk hij met de perforatief gemaakt heeft, verder met den *tirrefond*; en het gat behoorlijk geboord hebbende, zet hij de kroon weêr op haare plaats, ten einde het been verder door te zaagen. In het eerst kan hij schielijk draaijen, maar zo dra hij op het

*diploë* of sponsagtige tafelscheidzel komt, gelijk hij uit het roode zaagzel ontdekt (g4), begint hij langzaamer en zagter te draaijen, ten einde geen gevaar te loopen, om het harde hersenvlies met de tanden der kroon te scheuren; nu en dan neemt hij er de kroon uit, om ze met een borsteltje schoon te maaken en met eenen tandestooker of iet dergelijks het zaagzel uit de gezaagde groeve te doen, het welk de kroon zou kunnen beletten, vrijelijk om te draaijen. Indien het stuk heen op de ene zijde meer dan op de andere mogt doorgezaagd zijn, zal hij de trepaan onder het zaagen op de zijde, daar het stuk dikker schijnt te zijn, meer drukken. Als de kroon onder het om-draaijen aanstoot, draait men ze half om van de linke naar de regte hand. De trepaan moet ligtelijk en altijd gelijk, zonder er op te drukken, omgedraaid worden. Als het stuk zo doorgeboord is, dat het slegts nog aan eenige plaatzen

(g1) [ Het is geen zeker kenmerk, dat, wanneer de buitenste plaat der bekkeneels beenderen doorboord is, als dan een rood zaagzel volgen zal. De ontleedkunde en ondervinding toonen ons, dat zomwijlen (en vooral bij bejaarde voorwerpen) de buitenste en binnenste tafel van het Cranium zodanig in elkander zijn gegroeid, dat zij, als ware het één been, uitmaaken. Bij gevolg zoude men bij zulke voorwerpen te vergeefs naar het roode zaagzel wagten, en daar door wel eens onvoorzigtig genoeg met de kroon der trepaan tot in de holte der hersenpan doordringen. Het zekerste bij deze operatie is, de kroon dikwerf uit hare geboorde groef te nemen, en door het pen-netje de diepte derzelve van oogenblik tot oogenblik op alle plaatsen te onderzoeken; van welker kennis, een oordeelkundig Heelmeester na gelang der omstandigheden de boor zal weten te bestieren. Zie BOERHAAVE en deszelfs uitlegger VAN SWIJTEN in *aphor.* §. 389. ]

vast is, zo zet en verzekert hij de schroef van der *tirefond* in het stuk heen, legt tevens het mijrtenblad aan en ligt het stuk er uit (*b4*), en het weggenomen hebbende, neemt hij met het linsenvormig mes de ongelijkheden en schilfers weg, welken aan den binnen- en onderrand van het gat mogten gebleven zijn. Als er bloed of etter op het harde hersenvlies is, moet de uitvloeijing door de *meningophila*x (hersenschermer of nederdrukker) te hulp gekomen worden; hij kan het er op de beste wijze met kleine wicken en tangjes, om dewelken gerafeld plukzel gewonden is, uithaalen. Maar als het uitgestorte bloed onder het harde hersenvlies zit, moet men het met een lancet openen, om de ontlasting van deze stof te bevorderen (\*).

(*b4*) [Wij zouden liever de tang van *SNAPP*, als minder omslagtig en wel zo zeker, hier toe gebruiken. Zie zijne oord. *aanm. pl. 11. fig. 6*. Dezelve is ook afgebeeld bij *J. Z. PLATNER bandt tot de Chir. pl. 11. fig. 12*.

Zo dra het stuk beens, dat uitgeboord word, begint te waggelen, zo moet men de boorniet meer aanzetten, maar het zelve met de tang vatten, zagtelijk heen en weder wrikken, losmaaken en uitneemen. Dit heeft reeds de groote *HIPPOCRATES* aanbevolen. *vid. de capit. vulner. cap. 34.*]

(\*) Te Londen heb ik kroonen gezien, welken twee duim in de middelijn hadden en in derzelver omtrek driemaal uitgesneden waren, ten einde men de beenschilfers uit de kroon zou kunnen doen, zonder dezelve af te neemen. Doch ik vind deze uitvinding van niet veel belang. De heer *THIEDEN* merkt terecht aan, dat men bij kinderen, wegens de dunne en nog niet al te harde beenderen, niet wel de trepaan kan gebruiken; en staat derhalven voor, zo wel in dit geval, als bij scheuren in de hersenpan en bij over elkander staande stukken der hersenpan, zig van een stukje glas



De stukken been , welke naar onder gebogen zijn en derzelver stand veranderd hebben , moeten met het elevatorium om hoog geligt worden , het zij met dat van PETIT of een ander , welken bij de Heelmeesters genoeg bekend zijn (\*). Indien men het stuk been , dat het harde hersenvlies zou kunnen drukken , steeken en scheuren , niet door het gat , het welk in de hersenpan is , om hoog mogt kunnen ligten , kan men op eene andere plaats eene tweede kroon zetten , om het stuk te kunnen opligten en de overige beenderen gelijk stellen.

Alle stukken been en alle afgescheiden splinters moeten zorgvuldig weggenomen worden , wijk het ten hoogsten gevaarlijk zou wezen , die er in te laten. In zwaare verpletteringen van het hoofd , waar bij het harde hersenvlies gescheiden is , vind men dergelijke splinters of schilfers zomwijlen zelf in de zelfstandigheid der hersenen. Zomtijds zet zig een splinter tusschen het harde hersenvlies en de inwendige vlakke der hersenpan , kruipt tot op den grond der hersenpan voort , en veroorzaakt door deszelfs tegenwoordigheid toevallen , die den lijder in het graf sleepen , gelijk ik zulke gevallen gezien heb.

Men ziet hier uit , dat het van het hoogste gewigt is , al de splinters en schilfers op het nauw-

glas te bedienen , waar mede hij het been allengs doorschaaft , doch het overige dun geworden been snijdt hij er inet eene schaar uit. Zie *Neue Bemerkungen und Erfahrungen*. — 2ter Theil. Berlin 1782. 8<sup>o</sup>. L.

(\*) Ik zou liever een ander gebruiken , dan dat van PETIT , het welk te groot en te ongeschikt is. L.

keurigste bij elkander te zoeken, om te zien, of er geen ontbreken, die aan het oog ontglipt zijn.

Als de toevallen na de operatie nog aanhouden, en men dezelve alleenlijk aan eene verzameling van kwaade vogten op eene andere plaats of breuk op de zijde tegen over die, welke men reeds getrepaneerd heeft, moet toeschrijven, moet men niet lang draalen, om deze plaats de ontdekken en er aanstonds de kroon op zetten (14).

(14) [Wanneer na de uitneeming van het geboorde stuk beens, geen bloed, etter of iets dergelijks zig ontlast, noch beensplinters zig vertoonen, zo moet men niet aanstonds aan den goeden uitslag der operatie wanhoopen; of tot de doorsnijding van het harde hersenvlies zonder genoegzamen grond besluiten. Eene aanmerkelijke waarneeming, hier toe betrekkelijk, is ons doorden heer J. BUIN, te Utrecht, medegedeeld. Deze bekwaame Heelmeester trepaneerde voor eenige jaaren eenen Lijder, welken door het vallen van eenen steen op het hoofd alle de tekenen van uitstorting onder het Cranium te kennen gaf: dan, na het wegneemen van het uitgeboorde stuk beens, vond men noch bloed, noch etter, noch iets, waar aan men de toevallen dezes lijders zou kunnen toeschrijven. Een, bij de operatie adfisterend, Hoogleeraar stelde voor om de *dura mater* te openen; dan hier toe kon de heer BUIN (en te regt om derzelver gezonde en goede kleur, die noch eenige uitstorting onder, noch belediging in, dezelve aantoonde) niet besluiten, en wilde liever den verderen uitslag afwagten, dan iets mer geene genoegzame zekerheid onderneemen. Na weinige dagen zag men ook met veel genoegen, dat de natuur haar vermogen ter herstelling van dezen ongelukkigen had werkstellig gemaakt: eene menigte etterstof ontlaste zig uit de doorgeboorde opening eenigen tijd agter elkanderen; en dit deed dus den lijder spoedig het gebruik zijner zintuigen, zo wel als na de geneezing der wond eene voorige gezondheid, genieten.

Dan, men zou in dit geval kunnen aanmerken: dat,

De gereedschap tot het verband bestaat in eene of meer kleine wicken, kleine ronde plukzeldotjes, eene genoegzaame menigte plukzel, compressen en eenen hoofdband. De wiek moet een weinig grooter zijn, dan het gat, dat men in het been maakt; men legt dezelve op het harde hersensvlies met behulp van den hersenbeschermer of *meningophilax*, doet er eenige droppels balzem van *Fioraventi* (\*) op, of, als men deze niet heeft, een weinig wijngeest met honig gemengd: voor het overige vult men het gat met kleine ronde plukzeldotjes en in de wond legt men plukzel, ten laatsten legt men er compressen op, welken met den hoofdband verzekerd worden.

In geval men verscheiden splinters had moeten wegneemen, en er dus een onregelmatig en meer of minder groot gat ontstaan was, zou men de wiek naar den omtrek van het gat moeten maaken; en om in dit geval eene hersenbreuk voor te komen, welke ontstaan zou kunnen, legt men over de wiek een gegaat looden plaatje en daar over

wanneer de regte plaats en wel daar de uitgestorte stof zich bevond, doorboord was, men als dan waarschijnlijk aanstonds de ontlasting en verligting zoude waargenomen hebben, welken zig nu na eenige dagen vertoonden, of wel, dat men na deze eerste vrugtelooze pooging de doorbooring op eene andere plaats moest herhaald hebben: doch wij hebben reeds hier voor opgemerkt, dat de regte plaats zomwijlen zeer moeilijk te ontdekken is; en ook, ten anderen, blijkt het uit deze waarneeming, dat men zig dit aangaande zo veel niet behoeft te bekommeren; wijl toch de natuur in veelen dezer gevallen het vermogen eener zelfredding bezit. ]

(\*) Zie *Martiniq Pharmacopœa Parisiensis. Parisiis 1758. 4°. p. 226. L.*



plukzeldotjes , droog plukzel en den hoofdband (k4).

(k4) [ Op dat de hersenen met derzelver vliezen niet in de opening van het geboorde gat zouden dringen, of om aldaar *fungi*, welker geneezing veelal zeer moeilijk of zomtijds onherstelbaar is, voor te komen, pleeg men zederd omrend één eeuw het looden plaatje van BELLOSTE (bij de Heelkundigen genoeg bekend) te gebruiken. Dan eenige onvolkomenheden van hetzelfde hebben zommige beoefenaars tot een ander hun toevlugt doen neemen : namelijk tot een rond gegaat looden of zilveren plaatje, juist zo groot dat het door de geboorde opening kan ingebracht en op het linnen lapje, dat onmidlijk de *dura mater* bedekt, gelegd worden ; na dat alvorens een dubbele sterke draad door het midden van hetzelfde gehaald is en buiten de wond gehouden word: aan dezen draad word een tweede langwerpig smal looden of zilveren plaatje gereegen, welks lengte even voorbij de binnenranden der uitgeboorde opening heen kan schuiven; om daar door de inpersing van het eerste en dus ook aan de hersenen te beletten. Hier over legt men eenig plukzel en een verder behoorlijk verband aan: verzekerende den draad, welke deze plaatjes vasthoud, op een of ander deel van het hoofd door het verband wél vast. Zie GARENGEOT, *traité des Operations de Chirurgie*, pag. 212.

Kortelijk zullen wij uog aanmerken, dat de wonden door de trepaan gemaakt, weinig en spoedig moeten verbonden worden. De wieken, bestrooid met het poedervan mastik, of bevochtigd met wijngeest, zullen genoegzaam tot derzelver geneezing voldoende zijn. Ook is veelal eenige bescherming uitwendig aangebragt, door een zilver of looden plaatje, eenigen tijd agter den anderen, eene onvermijdbare noodzaaklijkheid: te meer, wanneer deze operatie herhaalde reizen en nevens elkanderen verrigt was: hier door zoude eene aanmerkelijke opening in het bekkeneel en ontblooting van het hersenvlies veroorzaakt worden, welke niet dan na eenig tijdverloop zoude kunnen sluiten; en dus aan onderliggende en redere deelen tot geene genoegzame bescherming verstrekken. Wij hebben, wel is waar, gezien, dat, na eene bijzondere ontaarting, een aan-



Ik beveel den jongen Heelmeesteren ter leezing aan de verhandeling van QUESNAY over *het gebruik der trepaan in twijfelagtige gevallen*, welke men vind in de *Mémoires de l'Académie de Chirurgie*, vol. I. p. 188. 40, [zie ned. vert. door TROUT, 1. st. bladz. 221.] en eene tweede van denzelfden schrijver, aldaar, p. 251, [ald. bladz. 294.] over *de noodzaaklijkheid om de operatie van de trepaan dikwijls te onderneemen*, en eene derde, aldaar p. 310, [ald. bladz. 363.] over *de wonden der hersenen*; verder de waarneemingen van MORAND, welken in zijne Heelkundige werken, I. p. 259. & *suiv.* en II. p. 187. & *suiv.* gevonden worden. Men vind in de aangehaalde werken voorgeschreeven regels, welken goede gronden aanbevolen hebben, en die op ondervinding en kundige waarneemingen gegrond zijn (\*).

merklijk los geworden gedeelte van het bovenste en zijdelijke deel des bekkeneels, door den welgeöfenden Heelmeester P. WASMAN, te Utrecht, was weggenomen, en dat de natuur haar verloren steunzel en beschermzel door eene buitengewoone verharding van de buitenste oppervlakte van het harde hersenvlies herstelde; eene verharding, welke bijna de ware hoedanigheid van een nieuw beenwezen had aangenomen. Zie de beschrijving hier van in de *disfertatio medico-chirurgica*, Traj. ad Rhen. 1780. door den kundigen A. VAN SOLINGEN.]

(\*) Men vind zonder tegenspraak de lezenswaardigste aanmerkingen over het gebruik van de trepaan in de werken van POTT, die de gevallen, waar in men de trepaan moet gebruiken en het vroegtijdig gebruik van dit instrument inzonderheid, mischien een weinig al te onbepaald, aanbevolen en het nut daar van door verscheiden voorbeelden bevestigd heeft. Zo betoogt PETIT ook zeer wél de gevallen, waar in de trepaneering vereischt word. *Supplement*

## NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

*Van de strotsnede (Bronchotomia of tracheotomia).*

**Z**OMMIGE schrijvers slaan de strotsnede als het eenige middel voor, welk men in het werk kan stellen tot redding van eenen lijder, die door eene keelontsteeking, verzeld door eene smoorzinking, aangetast word. Doch zij stellen ze niet in het werk, dan na dat zij alle middelen beproefd hebben, van dewelken zij denken, dat zij bekwaam zijn, om dit ongemak weg te nemen. En dit is de reden, waarom zij er zo zelden eenen goeden uitslag van gezien hebben.

Wij zien uit de voortreffelijke verhandeling van den heer LOUIS over deze stof (\*), dat het eenige middel, het welk de geneeskunst eenen lijder, die van eene waare keelontsteeking aangetast is, de strotsnede is; en dat de lijder moet sterven, indien de operatie word uitgesteld. Hij verhaalt verscheiden waarneemingen, welken deze waarheid bevestigen. Na bijgebragte getuigenissen der beroemdste Heelmeesters en ondersteund door eigen waarneeming, door de onder-

*du Traité de Mr. PETIT sur les maladies chirurgicales, par Mr. LESNE, en RICHTER chirurg. Bibl. IV. S. 85. In de Hoogduitsche vertaling van DU VERGÉ Traité des Moyens pour decouvrir les contre-coups dans le corps humain. L.*

(\*) *Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie, IV. p. 455. 47.*

vinding en eene verlichte theorie, beschouwt hij deze operatie met grond als behorende tot die, welken het minst met gevaar gepaard gaan. Daar zijn er geen, welker heilzaame werkingen spoediger hulp verschaffen; een lijder, reeds in de armen des doods en op het punt van te stikken, is in een oogenblik gered: doch, als men ze met een gewenscht gevolg wil bekroond zien, moet men ze te regter tijd onderneemen en dus niet eerst wagen, tot dat het verstikken zijnen hoogsten graad bereikt heeft.

Als de ontsteeking en verstopping, welke het verstikken veroorzaakt, aan het strottehoofd is, en dat de lijder nog genoegzame kragten heeft, zo moet men de operatie niet uitstellen, gelijk zommige schrijvers aanraaden, want het aderlaaten en de andere middelen tegen de ontsteeking van het bovenste gedeelte van de strot zijn in het geheel van geen vrugt.

Deze operatie is dus noodzaaklijk in eene ware keelontsteeking, waarin naamlijk het ademhaalen door de lugtpijp belet is; ook moet dezelve ondernomen worden, als zig een vreemd lichaam in de lugtpijp vastgezet heeft. (14).

(14) [Menigvuldige voorbeelden bewijzen ons, dat de strotsnede, in geval dat er vreemde lichaa men in de lugtpijp gevallen waren, van een allergewenschte uitwerking is geweest. Men zie, onder anderen, de gevallen door den heer HEVIN aan de koninglijke academie der Heelkonst, 2. st. bladz. 202. en volg. medegedeeld.— Dan HABICOT in zijne *questions Chirurgicales sur la bronchotomie*, cap. 11, toont aan, dat ook vreemde lichaa men in het Slokdarmschoofd of den Slokdarm zelve gevallen, eene zodanige drukking op de lugtpijp maakten, dat waarſchijnlijk de lijder, zonder

Het wezenlijke dezer operatie bestaat in eene opening, welke men boven den derden kraakbeenen ring in de lugtpijp maakt, om aan de lugt eenen vrijen ingang in en uitgang uit de long te geeven.

De Heelmeesters hebben verscheiden instrumenten voorgeslaagen om deze opening te maaken. Zommigen maakten met het incisiemes langs de lugtpijp eene incisie om de huid en de spiervezelen, die dezelve bekleeden, te scheiden, en hier maakten zij tusschen den derden en vierden ring met het lancet eene opening in de lugtpijp, om er een pijpje in te brengen, waar door de lugt vrij in en uit kon gaan. Doch deze wijze van de lugtpijp te openen, was niet zeer geschikt (\*).

operatie op dezelve, zoude gestikt zijn: zo als een dergelijk voorbeeld in zijn 16. Hoofdst. word opgegeeven.

Insgelijks zal deze operatie bij zommige dienkelingen van nut zijn. Zie DETHARDING, in *Epist. ad Schroeckium de meth. subven. subm. per laryng.* als ook PLATNER, *Handl. tot de Chir.* 1. D. bladz. 169. (\*).]

(\*) Deze wijze komt mij egter niet ten eenemaale verwerplijk voor, wijl de Heelmeester slegts een weinig bekwaamheid hebbende, dus eene snede in de lugtpijp kan maaken, zonder de binnenste wanden te kwetzen, en wijl hij in de gemaakte opening ook zeer wél het pijpje spoedig kan inbrengen. Met den troicar moet de drukking veel sterker zijn, en schoon hij krom is, kan egter zeer dikwijls uit hoofde van de veerkragt der lugtpijp de binnenste wand gekwetst worden. L.

[Zie hier over de aantekening van ULHOORN op de *Heelkundige onderwijzingen* van L. HEISTER 2. D. bladz. 835. — In het op eens doorsteeken der *aspera arteria*, zegt SHARP, is eene groote onvolkomenheid, alzo de lugtpijp door het ademhaalen op- en nederwaards bewogen wordende, de opening der huid met die der lugtpijp verschuift;



Anderen bedienden zig van eenen troicar, welke met een pijpje voorzien was.

„ Ik ken geen volmaakter instrument „, zegt LOUIS, „ dan dezen troicar om spoedig en veilig „ met alle mogelijk voordeel deze operatie te „ doen. De uitvinder daar van is de heer BAUCHOT, die in het jaar 1746. eene zeer aanmerk- „ lijke wond der lugtpijp behandelde, welke een „ vrouwspersoon in eene vlaag van dolheid zig „ zelve had toegebracht. De gewenschte uitslag „ van dit geval in zijne eigen praktijk maakte „ op den heer BAUCHOT eenen veel levendiger „ indruk, dan het leezen van dergelijke geval- „ len, welke de schrijvers verhaalen, zou heb- „ ben kunnen maaken. Omtrent den zelfden tijd „ had hij gelegenheid om verscheiden perfoonen te „ zien, die van eene keelontsteeking aangetast „ waren en aan de toevallen van verstikking stier- „ ven. De valsche verbeeldingen van gevaar bij „ het openen der lugtpijp waren verdweenen en „ hij was nu op middelen bedagt, om deze ope- „ ratie op eene eenvoudiger wijze te doen. Hij „ wist niets van de troicars van DEKKER. De „ lugtpijp met het lancet te openen, gelijk GA- „ RENGEOOT het beschrijft, was eene operatie, „ die eene verbetering toeliet. Wij zullen dus „ zien, hoe BAUCHOT hierin zijn oogmerk be- „ reikte. Hij hield het lemmer van een lancet „ met een lintje omwonden voor geen genoeg- „ zaam geschikt instrument; hij meende, en met „ grond, dat de operatie beter zou gelukken met

en het inbrengen en op zijn plaats houden van het pijpje bezwaarlijk maakt. *Oordeelk. aanm. bladz. 440.*]

„ eene snijdende plaat in eenen eenvoudigen vas-  
 „ ten steel gevat. (Pl. I. fig. 6.) Hij liet voor  
 „ deze plaat eene schede of een plat kokertje of  
 „ buisje maaken (fig. 7.), welks opening (fig.  
 „ 8.) een rand had met twee kleine ringen be-  
 „ zet. Met dit instrument, het welk met een  
 „ kokertje voorzien is, dringt men veel ligter  
 „ in de lugtpijp, dan met den troicar. Door  
 „ zijne proeven aan lijken ondervond hij, dat de  
 „ lugtpijp zig ligtlijk bewoog. Om dus ook dit  
 „ ongemak voor te komen, bedagt hij een halve-  
 „ maans instrument (fig. 9.) ten einde dus te  
 „ beletten, dat de lugtpijp zig niet heen en weêr  
 „ kon beweegen. Dit instrument dient ook tot  
 „ een geleider voor den *bronchotomus* (\*). Ik  
 „ heb deze instrumenten hier in derzelver natuur-  
 „ lijke proportie laten afbeelden. De wijze,  
 „ om er zig van te bedienen, kan men ras van  
 „ zelve begripen.

„ De heer BAUCHOT bediende er zig van in  
 „ twee keelontsteekingen, welken met eene verstik-  
 „ king dreigden, naamlijk aan een mansperfoon  
 „ van drie en twintig, en een vrouwsperfoon van  
 „ twee en zeventig jaaren. Hij ondervond, dat  
 „ deze instrumenten al de voordeelen hadden,  
 „ welken men er van kon verwagten om de ope-  
 „ ratie zo wel met alle mogelijke veiligheid als  
 „ gemaklijkheid te maaken (\*\*).

(\*) Ik agt dit instrument geheel overtollig, want men  
 kan met de vingers der linke hand het zelfde doen; ik ge-  
 loof veeleer, dat dit instrument eene al te sterke drukking  
 kan veroorzaaken. L.

(\*\*) LOUIS wil, dat men de incisie naar de lengte maa-  
 ke, en LE BLANC keurt dit goed, door dien hij de heeling

„ Mischien, vervolgt LOUIS, zal men de plaat  
 „ van den bronchotomus een weinig te kort oor-  
 „ deelen voor den hals van een dik mensch, of  
 „ wiens hals door het ongemak gezwollen is ;  
 „ doch volgens de aanmerking van den heer BAU-  
 „ CHOT heeft dit gemeenlijk geen plaats bij in-  
 „ wendige keelontsteeking, welken de lugtpijp  
 „ aantasten en aanwijzingen tot de operatie gee-  
 „ ven wegens het gevaar van te verstikken. Doch  
 „ het zij daar mede zo als het wil, zo stelt hij  
 „ voor, in onvoorziene gevallen eene kleine inci-  
 „ sie te maaken, waar door men de lugtpijp zo  
 „ ver kan naderen als het nodig is, om zijn in-  
 „ strument te gebruiken. Het halve maanswijze  
 „ instrument, waar mede men de lugtpijp vast  
 „ houdt, dient ook tot een getrouwen leider en  
 „ geeft een zeker steunpunt om in het kanaal te  
 „ komen. Men behoeft geen vrees te hebben,  
 „ dat het pijpje, het welk er met den broncho-  
 „ tomus in gebragt word, zig zal kunnen ver-  
 „ schuiven ; want het zal altijd van evenredige  
 „ grootte zijn met de opening, als het gelijk met  
 „ het instrument, welke aan het zelve den ingang  
 „ opent, aangelegd word, en op deze wijze is het  
 „ pijpje vast ondersteund door de deelen zelve,  
 „ die het omringen. Daarenboven heeft men hier  
 „ nog een ander voordeel, hier in bestaande, dat,

der dwars doorgesneeden spiervezelen voor moeilijker  
 houd.

Ik zou insgelijks in zekere gevallen, wanneer bij voor-  
 beeld een langwerpig lichaam in de lugtpijp was blijven zit-  
 ten, de incisie naar de lengte verkiezen. Ik heb nog on-  
 langs in ons hospitaal een leerzaam geval gezien, dat de  
 kraakbeenen der lugtpijp weer te zamen groeijen. L.



„ wanneer men de operatie op die wijze doet ,  
 „ geen bloed naar binnen kan uitstorten. Verders  
 „ zijn er tot des te meer zekerheid ringen aan  
 „ het pijpje , ten einde het met twee draaden ,  
 „ die men om den hals knoopt, te kunnen vast  
 „ maaken (\*) (*m4*).

LOUIS bewijst verder uit de ondervinding der grootste Heelmeesters, dat in de ziekten , welken deze operatie verëischen , de lijdërs aan de verstikking sterven, waar bij de sterkste aderlaatingen vrugtloos zijn, om den lijder uit het dreigend gevaar te redden, en dat er geen spoediger en zekerer middel is, dan de strotsnede. Eindelijk besluit hij zijne voortreffelijke verhandeling met de vraag, „ of alle bekwaame Heelmeesters de „ toevallige scheiding, welke enkel de huid en „ de lugtpijp betreft, niet voor eene allereenvoudigste wond houden ? Zedert den tijd van W. „ VAN SALICET, zijnde vijf honderd jaaren, weet

(\*) Als men den bronchotomus naar de lengte der lugtpijp daar in stoot, moet men aan elken ring van de schede twee bandjes vast maaken, gelijk zulks fig. 6. afgebeeld is, om het eene op de regte, het andere op de linke zijde te brengen en beide de ringen in den nek zamen te binden. Als men de incisie in de dwarste tusschen de beide ringen der kraakbeenen maakt, is één bandje aan elken ring genoeg, om de schede van het instrument vast te houden.

(*m4*) [Men begrijpt ligtelijk, dat dit instrument als ook alle de zodanigen, welke met eene buis voorzien zijn, niet kunnen te pas komen, in geval er vreemde lichaamen in de lugtpijp gevallen waren. Maar in zodanig een geval moet men, na alvorens de huid naar de lengte doorgesneden te hebben, de lugtpijp met eën incisiemesje openen, zodanig en ter plaatse als het ingevallen lichaam verëischen zal.]



„men, dat men de aanmerkelijkste wonden der lugt-  
 „pijp geneezen heeft. ” (114)

In eene tweede verhandeling, waar in LOUIS van de strotfnede en van de vreemde lichaamen in de lugtpijp spreekt, verhaalt hij eene gewigtige waarneeming van eene drooge Turksche boon, welke in de lugtpijp van een meisje van zeven jaaren gekomen was. Onaangezien de sterkste gronden, die hij bijbragt, om te bewijzen, dat de tegenwoordigheid van het vreemde lichaam, dat in de lugtpijp gekomen was, de eenige oorzaak van alle de toevallen was, en dat het volstrekt noodzaaklijk was, de operatie te doen; kon hij egter de overige geneesheeren van hun tegengesteld gevoelen niet afbrengen en het kind stierf den derden dag. Bij de opening van het lijk zagen de ouders, welken het nu berouwde, dat hun kind door deze operatie had kunnen gered worden; want door eene kleine opening, welke men in de lugtpijp gemaakt had, haalde men er de boon zeer ras met een klein tangje uit.

„Men behoeft slegts weinig beleezen te zijn, ”  
 vervolgt LOUIS, „om in dergelijke gevallen ver-  
 „scheiden slagtoffers van het verschil in de gevoe-  
 „lens en van het verwaarloozen der gewigtigste  
 „voorschriften in de kunst te vinden. ”

Na dat hij van het vrugtloos gebruik en van het gevaar, welke de braakmiddelen, niesmiddelen en borstmiddelen veroorzaaken, gesproken heeft,

(114) [Men zie hier van, onder anderen, menigvuldige voorbeelden in de zo even genoemde verhandeling van den heer HEVIN, aan de koninglijke akademie der Heelkonss medegedeeld.]

verhaalt hij bladz. 540, behalven veele anderen; ook eene waarneeming van den heer VERDIER, welke veel overeenkomst heeft met de voorverhaalde.

„ Een meisje van zes jaaren met eenige andere  
 „ kinderen spelende, wierp een van dezelve haar  
 „ eene boon in den mond, welke ongelukkiglijk  
 „ in de lugtpijp viel.” De heer VERDIER stelde de operatie als het eenige hulpmiddel voor, doch een ander Heelmeester en een Geneesheer waren er tegen. Het kind leefde slegts nog drie uren, en was in de laatste oogenblikken van zijn leven van zijne zinnen beroofd en had zwaare stuiptrekkingen. Na den dood maakte de heer VERDIER eene opening in de lugtpijp en haalde er met weinig moeite de boon uit (04).

(04) [Er zijn meer dergelijke voorbeelden bekend. WILLIS verhaalt onder anderen, in zijne *Phar. nat. Part. II. Sect. 1. cap. 3.*, dat hij bij een kind, het welk een beentje in de lugtpijp had ingeslikt, en zelfs de plaats der vastzitting met zijne hand aanwees, de operatie der strotstede voorstelde: doch waar tegen zig de tegenswoordig zijnde Genees- en Heelkundigen verzetten. Het kind stierf kort daarna aan eene verstikking, na welke WILLIS in het bijzijn der Genees- en Heelmeesters de operatie deed, en haalde zeer gemakkelijk een langwerpig en hoekig beentje uit deszelfs lugtpijp.

Dan men vind ook gelukkige uitkomsten door het bijtijds in 't werk stellen dezer operatie in soortgelijke gevallen door de heeren VERDUC, RAU, HEISTER en meer anderen medegedeeld. Wenschelijk ware het, dat eene meerdere stoutmoedigheid den oefenenden Heelmeester in deze en dergelijke min gevaarlijke operatiën, tot redding van zodanige ongelukkigen, bezielde. — Het gevaar der operatie is waarlijk te gering, om den lijder door het verzuim derzelve aan eenen schijnbaaren dood bloot te stellen.]

Zedert dat ik de instrumenten van den heer BAUCHOT ken, onderrigt ik de jonge Heelmeesters in mijne lesfen van de wijze om deze operatie te doen, en geef, even als LOUIS, aan de incisie over langs den voorrang boven die, welke men tusfchen de beide kraakbeenige ringen maakt (p4).

Te dien einde beveel ik mijne leerlingen het leezen der verhandelingen van LOUIS zeer aan.

In een ontfteekingagtig keelgezwel [*cynanche*] moet men, zonder zig lang op te houden met herhaalde en fterke aderlaatingen, pappen en gorgelwaters, welken gemeenlijk zonder eenig goed gevolg gebruikt worden, aanftonds tot de operatie befluiten, zo als LOUIS die voorftelt, zonder welke men den lijder niet kan redden. Het gevolg der operatie, welke Dr. VIDAL deed, is een nieuw bewijs, dat deze operatie in het geheel niet gevaarlijk en het eenige middel in een ontfteekingagtig keelgezwel is, om den lijder van den

(p4). [ Wanneer men deze operatie verrigt, in gevalle van eene keelonfteeking, van eenen drenkeling of in den flokdarm opgehoudede deelen, als dan zal, onzes bedunkens, de dwarsche opening tusfchen den tweden en derden kraakbeenigen ring of iets lager, na gelang der omftandigheden, genoeg zijn. Doch zo er vreemde lichaamen in de lugtpijp mogten geraakt zijn, dan zal de eenvoudige dwarsche opening tot geene genoegzame ruimte verftrekken, maar men zal verpligt zijn, twee, drie of meer ringen in de lengte van den hals te doorsnijden. Zie ook L. HEISTER, *onderw. der Heelkunde* 2. D. bladz. 831. PLATNER, *Handl. tot de Chir.* 1. D. bl. 570. en meer anderen.

Wanneer een of ander lichaam eene zekere zitplaats voor het oog en gevoel aantoot, zo is het natuurlijk de plaats, waar op de doorsnijding moet gedaan worden. ]



dood te redden. Ik zal dezelve te dien einde verhaalen.

„ Den 15. October 1771, ” zegt de heer VIRDAL, (\*) „ werd ik op straat aangesproken om „ in een klein huis te komen bij een mensch, die „ eene zeer kwaade keel had en in gevaar was van „ te stikken. Het was een mensch van omtrent „ 25. of 30. jaaren , van een sterke gesteldheid „ en hij lag reeds zedert vijf of zes uren in den „ toestand , waar in ik hem vond. ”

„ Hij zeide mij met eene heesche en afgebrooken stem , dat hij eene zeer kwaade keel had „ en wees mij de plaats met den vinger. Ik kon „ noch buiten aan den hals , noch agter in den „ mond geen aanmerkelijk gezwel ontdekken. ”

„ Ik besloot de operatie te doen , liet den lijder met het aangezigt naar het licht gaan zitten , het hoofd regt op houden , doch een weinig te rug gebogen en van agteren ondersteund , „ zonder hetzelfde ter regter of ter linker zijde „ te buigen. Wyl ik op dergelyk geval niet ver- „ dacht was geweest , en dus de gewoone instrumenten niet bij mij had , vatte ik de huid en „ hield de lugtpijp tuschen mijne twee vingers „ vast , maakte met een regt incisiemes eene incisie over langs in de huid aan den voorhals „ onder het strotten hoofd , welke ik tot aan den „ bovenrand van het borstbeen verlengde , ook „ sneed ik het vet door tot dat ik aan de plaats „ kwam , daar de borstspieren zig met elkander „ vereenigen , en welken ik op haare middenste en „ onderste deelen van elkander scheidde. Ik ont-  
bloo-

(\*) *Journal de Medecine*, Octobre 1772. p. 258.



„ blootte de lugtpijp en opende ze inde dwarste tus-  
 „ fchen het derde en vierde kraakbeen. Voor dat  
 „ ik de borstbeenspiereu van elkander fperde ,  
 „ droogde ik de wond uit en liet het bloed uit de  
 „ vaten , welken bij de incifie der wond doorge-  
 „ fmeden waren , eenigen tijd uitloopen. ”

„ Wjl ik gebrek aan al de nodige instrumen-  
 „ ten en gereedfchappen had , moest ik op nood-  
 „ middelen bedagt zijn. Ik lei dus tufchen de bei-  
 „ de kraakbeenige ringen eene plat gedrukte fchagt  
 „ van eene pen , zo dat het einde der fchagt maar  
 „ een weinig in de lugtpijp uitftak , en dit ver-  
 „ rigtte ik door middel van eene naald , welke ik  
 „ dwars door de fchagt had geftoken ; doch om  
 „ de naald en de fchagt wond ik eenige reizen  
 „ eenen draad om beiden te verzekeren. Aande  
 „ einden van deze draaden maakte ik naderhand  
 „ aan elke zijde een ftuk lint vast , het welk ik  
 „ eens boven over de fchagt en eens onder de-  
 „ zelve door haalde ; op deze wijze werden de  
 „ comprefen , welken ik op elke zijde tufchen  
 „ de naald en de wond aanlei , gelijk ook de  
 „ fchagt zelve , vafcgemaakt. De lijder moest het  
 „ hoofd regt houden en in het bed blijven , ook  
 „ liet ik hem in den tijd van drie uuren tweemaal  
 „ rijklijk ader , en zag gedurende zes uuren , dat  
 „ ik bij hem bleef , alle toevallen van verftikking  
 „ verdwijnen en zijn leven in veiligheid ge-  
 „ fteld. ”

„ Het bloed was dik ; ik liet den lijder der-  
 „ halven eenen drank van wilde fuikerwortelen ,  
 „ hondsbloemenkruid en eenige andere wortelen  
 „ en vleefchnat met een weinig boter en zuring  
 „ gebruiken. Den volgenden morgen nam ik er

„ de schagt uit, lei er eene gegaate plaaster op  
 „ en bedekte de wond met eene kleine compres,  
 „ welke ik in een afkookzel van gerst en honig  
 „ gedoopt had, waar bij ik nog een weinig wijn  
 „ deed. Na verloop van vier dagen kwam de  
 „ lijder mij bezoeken en de wond sloot zig zeer  
 „ wél; ook bezorgde ik hem eene plaats in het  
 „ gasthuis, ten einde de nodige afdrijvingsmid-  
 „ delen te kunnen gebruiken en zig volkomen te  
 „ laten genezen.

Hierop spreekt hij nog van twee mansperfoo-  
 nen, van dewelken de eene binnen zesendertig,  
 en de andere binnen vier en twintig of dertig uu-  
 ren aan eene dergelijke keelkwaal verstikte, en van  
 een vrouwsperfoon, welk binnen even zo veel  
 tijds omkwam, schoon men het aderlaaten ver-  
 scheiden maalen herhaald en de beste hulpmidde-  
 len gebruikt had. Hij verklaart verder de oor-  
 zaaken, waarom het aderlaaten in dringende ge-  
 vallen, die den lijder met den dood dreigen, wan-  
 neer men niet ten eersten de operatie onderneemt,  
 van zulk een gering gevolg is; hij toont aan, dat  
 het bloed, het welk gedurende de operatie uit-  
 vloeit, in het geheel met geen gevaar verzeld is,  
 dat het veeleer de ontstoken en opgevolde deelen  
 van derzelver verstopping bevrijd; „ dat het ader-  
 „ laaten na de operatie, terwijl het de menigte  
 „ des bloeds vermindert ook de kragt vermin-  
 „ dert, waar mede het op het ontstoken deel  
 „ werkt. Ook merkt hij aan, dat, wanneer er  
 „ na de operatie kleine huiiveringën komen, ne-  
 „ vens sterk zweeten, dezelve onvoordeelig  
 „ zijn, dat de lijder als dan niet minder moeite  
 „ kan slikken en spreken, dat de pijn zeer ver-

mindert, dat op het einde van dit sterk zweet-  
ten het lichaam in eene uitteering vervalt, de  
pols schielijk en ongeregeld word en allengs  
verdwijnt. De ijlhoofdigheid komt er bij en  
de lijder sterft binnen korten tijd (74).

(74) [Het verband na deze operatie is onderscheiden, na de verschillendheid van het geval tot welke de operatie verrigt word. Bij voorbeeld: wanneer dezelve gedaan is, om lichaaamen uit de lugtpijp weg te neemen; en men hier in geslaagd is, zo is niet anders dan een hegtplaster, eene zachte wiek waar over eene andere plaaster, compres en halsband aangelegd word tot de geneezing nodig. Dan in andere gevallen, en wel in de zulken bij welken men verplicht is, het pijpje tot doorlaating van den adem te gebruiken; moet men, na dat alvorens het pijpje, door banden of draaden om den hals, op deszelfs plaats wel verzekerd is, over het overgeschooten gedeelte der wond denige reepjes plaaster, of een met één gat, waar door het pijpje uitkomt, leggen, hier over een compres; welke den geheelén omtrek van den hals bestaat, insgelijks met een gat tot doorlaating van het pijpje voorzien, en over welks laatste een floers offijn gaas; ter beletting van het in de long inademen van linnen vezelen; insecten enz. welke eenen gevaarlijken hoest zouden veroorzaaken, aangelegd word. Wanneer de lijder zo ver hersteld is, dat het pijpje kan weggenomen worden, als dan verbind men eenvoudig; met een hegtplaster, drooge wiek; compres en halsband.]

## TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

### *Van de operatie der slagadergezwellen.*

**V**oor dat wij deze operatie beschrijven, moeten wij nog een woord zeggen van de verschil-



lende foorten van slagadergezwellen , ten einde de gevallen , in dewelken men de operatie moet onderneemen , behoorlijk te kunnen onderscheiden van die , waarin men ze moet nalaaten.

De meeste schrijvers stellen twee foorten van slagadergezwellen , eene waare en eene valsche. Door een *waar* slagadergezwel verstaan zij een gezwel van een gedeelte der slagader , het welk door de verwijding van dezelve ontstaat en gevormd word , en een *valsch* slagadergezwel noemen zij de scheiding der zelfstandigheid van eene slagader door middel van een snijdend instrument (\*).

„ Wanneer nu door eene der gemelde oorzaaken , ” zegt ARNAUD (\*\*), „ eenige plaatzen en deelen eener slagader zwakker zijn , dan de anderen , begrijpt men ligtlijk , hoe door het zamentrekken van het hart de zwakke punten van deze slagader voor de invloeying van het bloed zo zullen wijken , dat zij zig uitzetten en de uitzetting allengs door de aanhoudende beweeging der vogten tegen de wanden der slagader , welken reeds verzwakt en verslapt zijn , moet toeneemen , gelijk LITTRE (\*\*\*) dit reeds zeer wél verklaard heeft. ” En hier door word een gezwel gevormd , aan het welk men

(\*) De heer hofraad RICHTER onderscheid de verschillende foorten van slagadergezwellen veel nauwkeuriger. Zie zijne *Anfangsgründe der Wundarzneykunst. I. Band. Gött. 1782. 8°. S. 317.* en Prof. PLATNERS *Suppl in J. Z. Platneri Instit. Chirurgiæ. p. 82. L.*

(\*\*) *Memoires de Chirurgie. Londres p. 182.*

(\*\*\*) *Memoires de l'Acad. Roy. des Sciences , année 1707.*



eene klopping gewaar word, even als aan eene slagader. Dit zijn dus de kentekens en de wijze, hoe een waar slagadergezwel gevormd word (14).

De overledene FOUBERT, die deze stof grondig behandeld heeft (\*), onderscheid twee soorten van valsche slagadergezwellen, welken voornaamlijk aan den arm bij gelegenheid van eene aderlaating kunnen ontstaan, namelijk een oorspronkelijk en een, dat eerst naderhand ontstaat.

„ Het oorspronkelijke is dat, wanneer oogenbliklijk na het aderlaaten veel bloed langs de vaten van den arm in het celledweefzel stort, het welk zig zomwijlen van de opening der

(14) [ De Slagadergezwellen hebben onderscheide oorzaken; doch zijn meest al een gevolg van eene voorgaande belediging of kwetzing dezer deelen zelve. Het zij door wonden, kneuzingen, verzweringen: als mede wanneer deze deelen door persen, hoesten, braaken, lachen, schreeuwen of wat in staat zij het bloed een meer dan gewoon geweld op een of ander deel eener zwakke of voorgaande beledigde slagader te maaken, waar door een of meer derzelver rokken hunne veerkracht verliezen, en voor het telkens aanbonzende bloed wijken moeten. Men zie, onder anderen, hier over de waarnemingen van LITRE, VAN LEEUWEN, COWPERS, LANCISIUS, VAN SWIETEN en veele anderen. — Dan dit soort van slagadergezwel word ook gebooren door eene kwetzing der buitenste vliezen of rokken der slagader, wijl hier uit natuurlijk volgt, dat het inwendige bekleedzel derzelve de geduurig aanperzende schokken des bloeds niet wederstaan kan, maar gevolglijk daar door uitzetten en door de vaneentrekkende opening der anderen dringen moet.]

(\*) *Memoires de l'Acad. royal. de Chir.* 4°. T. II. p. 535. & *suiv.*

„ flagader af tot boven onder de okzel uitbreid  
 „ en eene spoedige hulp vereischt.

„ Het naderhand ontstaane is dat , het welk  
 „ eerst eenige dagen na het aderlaaten ontstaat ,  
 „ dewijl , wanneer de flagader , toen zij gekwetst  
 „ wierd , behoorlijk gedrukt , doch naderhand de  
 „ drukking niet lang genoeg aangehouden of de  
 „ behoorlijke zorg niet aangewend wierd , om  
 „ deze drukking te onderhouden , het stuk geron-  
 „ nen bloed , dat zig in de wond der flagader ge-  
 „ vormd had , er uit gaat , het bloed zig in het  
 „ bekleedzel , dat de vaten omwikkelt , uitstort  
 „ en de aponeurosis der tweehoofdige spier en de  
 „ nabuurige deelen om hoog ligt. ”

Deze soort van flagadergezwel vormt een klein rond gezwel , het welk hoe langer hoe grooter word , zonder dat de koleur der huid verandert ; men voelt een kloppen , het welk naar de klopping van eene flagader gelijkt , en als men het met den vinger drukt , verdwijnt dit schier geheel.

Ik beveel de jonge Heelmeesters , die van de wijze , op welke dat flagadergezwel ontstaat , onderrigt begeeren te wezen , voornaamlijk de verhandeling van FOUBERT te leezen.

De beroemde Dr. HUNTER leert ons nog eene andere soort van flagadergezwel kennen , welke Dr. GEORGE CLEGHORN , hoogleeraar der ontleedkunde te Dublin , de aderspat met een flagadergezwel gepaard (*varice aneurismale*) noemt. Deze soort van flagadergezwel , waar van nog geen schrijver voor Dr. HUNTER gesproken heeft , kan bij het aderlaaten ontstaan even als het valsche naderhand ontstaane flagadergezwel. Daar

het van zulk een wezenlijk gewigt is, dit slagader gezwel niet met de andere te verwisfelen, zal ik ten dienste der jonge Heelmeesters een uittrekfel geeven uit de waarneemingen, welken Dr. HUNTER over de voornaame kentekens van dit slagader gezwel bekend gemaakt heeft, en welken ARNAUD vertaald en in zijne verhandelingen bl. 220. geplaatst heeft (\*).

Wanneer men het lancet instoot, om bij voorbeeld de leverader [*vena basilica*] te openen, en dat de slagader onmiddellijk onder de ader ligt, kan het lancet de ader ten deele doorfteeken en door de aponeurosis zelve in de slagader komen, die onder deze aponeurosis heen fchiet. In dit geval maakt het lancet twee openingen in de ader, ééne voor, en ééne agter, eene derde in de aponeurosis en de vierde in de slagader. Als nu deze vier openingen in dezelfde ftrekking zijn en dat deze ftrekking ook op de opening der huid treft, zal het slagaderbloed in het aderlaaten met het aderlijkebloed uitvloeijen; men zal dit ontdekken aan het geweld, waarmede het bloed springt. Door een behoorlijk aangelegd verband kan men de lippen der geopende huid, gelijk ook die der ader, zamen kleeven.

Wanneer de openingen door de eene of andere oorzaak in geen parallele ftrekking zijn, kan het slagaderbloed niet in de terugvoerende ader overgaan, het fluipt dus onder de aponeurosis en zet zig in het bekleedzel, dat de vaten insluit,

(\*) Het oorspronglijke staat in *Medical Inquiries and Observations bij a Society of Physicians. Lond. P. I. N<sup>o</sup>. XXVI. L.*

en in het celleweefzel, en dit uitgestort bloed is een kenteken voor het oorspronkelijke of naderhand onstaane valsche slagadergezwel.

Schoon de lippen der buitenste opening van de terugvoerende ader en het lidteken der huid zig vast vereenigd hebben, het welk door het wél aanleggen van het verband bewerkt word, blijven nogthans de agterste opening van de terugvoerende ader, gelijk ook die der aponeurosis en der slagader, welke haare parallele strekking behouden hebben, open en liggen onbeweeglijk over elkander. Het slagaderbloed, het welk nu door de opening der slagader, welke op de agterste opening der terugvoerende ader treft, ontsnapt, vloeit schiekelijk in de terugvoerende ader, en hier mengt het zig met het bloed der terugvoerende ader en gaat naar de holle ader en naar het hart. Deze toevallige anastomosis duurt gemeenlijk zo lang men leeft.

De stoot van het slagaderbloed, het welk zeer snel in het kanaal der terugvoerende ader overgaat, slaat tegen den buitenwand van dezelve aan en zet dien allengs uit. Er komt derhalven boven de terugvoerende ader eene kleine verhevenheid, een klein gezwel, het welk volgens de gedaante naar eene aderspat gelijkt. Dit gezwel vergroot zig zomwijlen in de hoogte langs de terugvoerende ader, welke alsdan even als eene aderspat opzwelt. Op het middenpunt van dit klein gezwel, voornaamlijk ter plaatze, daar het lidteken der aderlaating overgebleven is, word men eene trillende klopping gewaar, welke door de stooten van het bloed veroorzaakt word, die de terugvoerende ader van de slagader ontvangt door



middel van haare anastomosis. Ook hoort men een geruisch, even als of men met geweld lugt door eene ledige pijp perste, of even als het gefluit der lugt, die met geweld door een klein gat dringt. Ook bespeurt men eene trillende beweging van eenen geheel bijzonderen aart ter plaatse, daar de steek gekomen is (\*). Dit geruisch word bij elke klopping der slagader waargenomen en is voor den lijder zo merkbaar, dat het hem in den slaap hindert, wanneer hij den arm te dicht bij het hoofd brengt: zomtijds kan men dit geruisch vergelijken met dat van eenen werptol, die snellijk in de rondte draait. Het gezwel verdwijnt, wanneer men den voorarm om hoog ligt, en zo als men hem weêr laat zakken, of als hij hangt, komt het weêr op en men bemerkt de klopping zeer duidelijk; deze houd geheel op, als men een compres op het gezwel legt, of wanneer men de plaats, daar de steek geschied is, met den vinger zamendrukt: als men het gezwel zamendrukt, houd ook het fluitend geruisch op, en komt aanstonds weêr, zo als men ophoud met drukken. Als men de armslagader boven den steek zamendrukt, zonder de leverader zamen te drukken, verdwijnt het gezwel, zinkt neder en ontledigt zig: maar zo dra men ophoud met drukken, word het gezwel weêr gevuld, verheft zig en vertoont zig even als te voren. Ik heb zulk een slagadergezwel gezien, bij het welk ik veele toevallen heb waargenomen, zo als HUNTER die beschrijft.

(\*) Dit fluitend geruisch is een der voornaamste kentekens van deze soort van slagadergezwellen, L,

Deze zijn dus de toevallen, die volgens HUNTER dit slagadergezwel, het welk men met een valsch en naderhand ontstaane zou kunnen verwisfelen, doen kennen.

„ De drukking, welke men door een band  
 „ aanbrengt”, zegt ARNAUD, op bl. 187. en  
 „ volg. ter aangehaalde plaats, „ kan enkel in een  
 „ waar slagadergezwel den voortgang van het on-  
 „ gemak een weinig tegengaan, doch het zelve  
 „ niet wegneemen. Men is niet in staat, om op  
 „ eenigerhande wijze het vergrooten van een slag-  
 „ adergezwel tegen te gaan, uitgezonderd in ge-  
 „ vallen, daar zij door eene uitwendige oorzaak  
 „ zijn ontstaan, en als dan moet de band ook van  
 „ het begin af aangelegd worden. Indien onder  
 „ het gezwel een plat been mogt wezen, zou de  
 „ geneezing misfchien beter slagen, wijl dit tot  
 „ een steunpunt zou kunnen dienen, het welk te-  
 „ gen over het punt zou staan van den band, die  
 „ zamendrukt; doch dit zeldzaam geval kan  
 „ fchier alleen bij de flaapflagader plaats vin-  
 „ den.

„ Men vind de waare slagadergezwellen altijd  
 „ in de hoofdtakken; die der leden loopen langs  
 „ de cilindervormige beenderen af, welken geen  
 „ vlakke gedoogen, om de gewenschte zamen-  
 „ drukking aan te wenden. Maar de slagader-  
 „ gezwellen der inwendige deelen kunnen op gee-  
 „ nerhande wijze gedrukt worden.

„ Men kan zig derhalven nooit vleijen een waar  
 „ slagadergezwel door de drukking te geneezen,  
 „ want dit middel zet het gezwel nog meer uit,  
 „ wijl het zelve in breedte toeneemt, naar maate  
 „ het in hoogte afneemt. ”

Uit deze waarneemingen volgt nu, dat een waar slagadergezwel ongeneeslijk is, ten minsten, wanneer het niet eerst even ontstaan, klein is en op een plat been ligt, zo dat de band de gewenschte werking kan doen, of wanneer het in eenen tak van den hoofdstam eener slagader is, welke zig in eenig lid verdeelt. In het laatste geval kan men de operatie doen en er eenig goed gevolg van verwagten.

Bij het oorspronkelijk valsch slagadergezwel, wanneer de opening in eenen hoofdstam der slagader is, welke het bloed naar een geheel deel voert, gelijk boven de verdeeling der armslagader, moet men zig wél in agt neemen, eene onderschepping te maaken, het welk het versterven van den voorarm zou kunnen veroorzaaken en den Heelmeester in de noodzaaklijkheid brengen, om het lid af te zetten (s4). Als men in twijfel is, of de armslagader of een tak van dezelve open

(s4) [ Wanneer de drukking door verbanden en werktuigen vrugteloos is, is het egter in dit geval beter, alvorens men tot de afzetting overgaat, eerst de onderschepping en afbinding te beproeven. De ondervinding levert genoegzame blijken op, dat de onderschepping, schoon boven de verdeeling der armslagader, nogthans van goeden uitslag geweest is. En de ontleedkunde bevestigt, dat de stam der armslagader verscheide zijtakjes heeft, welke zig, wanneer in de stam de doorloop van het bloed belet is, verwijderen kunnen en met de beneden takken dezer slagader inmonden; waar door zoms langzamerhand de omloop in dit deel hernieuwd word. — Zo wanneer egter dit niet mogt gebeuren, en men zag, dat het deel onder de binding tot versterving over ging, dan is het nog altoos tijd de operatie te onderneemen. Iets tog, waar toe wij nimmer dan in de uiterste noodzaaklijkheid mogen toetreden. ]

is, moet men gelijk FOUBERT (\*) den duim vast tegen de wond drukken, ten einde het geronnen bloed, dat zig tusfchen de opening van de slagader en de huid zet, te verwijderen, en in de holte, die men hier door maakt, moet men het popjel van den band leggen, zo als FOUBERT het befchrijft, of den band met de verhevenheid, waar van ARNAUD ter aangehaalde plaats p. 218., op de vijfde plaat, eene afbeelding geeft.

Door middel der drukking, welke men door den eenen of den anderen band maakt, word het geronnen bloed ten deele in de opening der slagader gedreven, kleeft zamen en vereenigt zig door de flijmige lijmpa, welke door de drukking uitgeperst word, met de randen der wond, die in de slagader gemaakt is. Dit ftuk geronnen bloed word hier door den band vastgehouden, word steeds vaster en fterker en vergroeit met de slagader en de nabuurige deelen zelven, als bij voorbeeld met het celledweefzel, dat ze omringt, met de aponeurosis e. z. v.

Volgens de waarneemingen van FOUBERT en die der beroemdste Heelmeesters moet men, wanneer men verzekerd is, dat in een oorspronkelijk valsche slagadergezwel de opening in eenen der verdeelde takken is, altijd met de drukking beginnen, welke in alle gevallen boven de operatie te verkiezen is (\*\*).

(\*) *Memoires de l'Acad. roy. de Chirurgie. Tom. p. 535.*

(\*\*) De hoogleeraar LEBER te Weenen bewerkt deze drukking door een ftuk kurk; maar PLENCK en ARNAUD door bijzonder daar toe uitgevonden werktuigen. De heer RICHTER heeft het werktuig van PLENCK, op Pl. IV.



De waarneeming, welke BOURIENNE (\*) verhaalt van een oorspronkelijk valsche slagadergezwel der elleboogsflagader, welke door den steek van eene bajonet geopend was en door de drukking geneezen werd, is een nieuw bewijs, dat men dit boven de onderschepping in de meeste gevallen moet verkiezen en dat men tot dezelve niet eerder zijne toevlugt moet neemen, dan wanneer men de drukking reeds beproefd heeft.

Het valsche naderhand ontstaane slagadergezwel moet op dezelfde wijze behandeld worden.

ARNAUD verhaalt (\*\*) eene waarneeming van een valsche naderhand ontstaan slagadergezwel, het welk in het midden van de dijeflagader was. Hij genas hetzelfde door de drukking, schoon de bekwaamste Heelmeester, welken met hem daar over raadpleegden, voorstelden, het been af te zetten.

„ Het was reeds agttien maanden geleden, dat  
 „ de slagader door eenen steek met eenen degen  
 „ geopend was. Het gezwel, het welk eijronde  
 „ was en langs de middenste en binnenste deelen  
 „ van het been lag, was twee duim dik, drie

fig. 7., in zijne *Anfangsgr. der Wundartz.* laten afbeelden, en van het instrument van ARNAUD vind men eene afbeelding in *E. Platner Suppl. Tab. I. & II.* In Frankrijk heeft men zig onlangs van een instrument bediend, waaraan men den naam van *tourniquet à lame d'acier* gaf. — De heer THEDEN bedient zig van de bewinding en stelt die boven de gewoone drukking. L. [Zie ook eenige werktuigen hier toe afgebeeld, bij L. HEISTER, *Heelkundige onderwijzingen*, Pl. VII. fig. 8. en 9. en J. Z. PLATNER, *Handleidinge tot de Chirurgie*, Pl. I. fig. 10.]

(\*) *Journal de Médecine*, Juillet 1773. p. 86.

(\*\*) *Memoires de chirurgie*, à Londres. p. 193.

„ duim lang en even zo breed. De dije was we-  
 „ gens de drukking der linnen zwagtels, waar  
 „ van men zig bediend had, om het gezwel za-  
 „ men te houden, zeer uitgeteerd: het been eg-  
 „ ter was zeer dik, zwaar, verstijfd en schier  
 „ zonder eenige beweging.

Om dit slagadergezwel te geneezen, moet men naar de regelen der kunst, gelijk deze groote Heelmeester zegt, het zelve zo behandelen, dat men het vloeibaare bloed, het welk in den zak uitgestort is, in de slagader tragt te brengen, het met den vinger omvat en een bekwaamen band aanlegt, welks grootte geëvenredigd is aan den omtrek van het gezwel en het lid, waar aan het zelve is, en aan welken band een verheven dötje moet zijn, het welk gestadig de plaats van den vinger kan bekleeden en zeer zagt drukken, gelijk ter aangehaalde plaats, *p.* 218. *fig.* 5., een dergelijke afgebeeld en beschreven is (\*). De wijze, om het vloeibaare bloed, uit den zak van het gezwel in de slagader te brengen is moeilijker te beschrijven, dan het zelve uitvoeren.

„ Gesteld, (zegt ARNAUD *p.* 195.) men wil-  
 „ de door eene kleine opening het water, dat in  
 „ eene blaas besloten is, doen uitvloeijen, zo zou  
 „ men haare wanden met de handen trachten te  
 „ zamen te brengen: op dezelfde wijze moet men,  
 „ om de vloeibaare stof, welke in den verwijden  
 „ zak van eene slagader uitgestort is, te rug te  
 „ brengen, het bloed met den vinger naar het  
 „ middenpunt van het gezwel bij elkander ver-  
 „ zamelen: men voelt, hoe het terug gaat, of,

(\*) Zie de voorgaande aantekening. bl. 268. (\*\*) L.

„ om mij gevoeglijker uit te drukken, men be-  
 „ speurt, dat men dit gezwel gemakkelijk kleiner  
 „ kan maaken, zo dat het uitzetten der slagader  
 „ zig tegen ons niet schijnt te verzetten. Zodra  
 „ men het vloeibaare bloed in de slagader gebragt  
 „ heeft, zo kan men het gemakkelijk met den vin-  
 „ ger bedwingen en in plaats van den zelven zig  
 „ van het dotje van eenen band bedienen. ” De  
 beroemde PETIT is volgens ARNAUD de eerste;  
 die dit op deze wijze leerde verrigten.

„ Het dotje, het welk men er in plaats van  
 „ den vinger oplegt, drukt, gelijk ARNAUD het  
 „ verklaart, het gedeelte van het geronnen bloed,  
 „ het welk zig in de opening der wond van de  
 „ slagader bevindt, zo dat het er intrekt en haare  
 „ gedaante aanneemt: het kleeft met de lippen  
 „ der wond zamen en vergroeit er zo mede, dat  
 „ het er niet weer uitwijken kan. . . . .

„ De riemen van dezen band vormen door  
 „ middel der trapswijze kleine compresen, die  
 „ wel geschikt en gelegd moeten worden, twee  
 „ bruggen, tene aan elke zijde van het beledigd  
 „ deel, het welk noodzaaklijk is, op dat men den  
 „ omloop der vogten en de beweeging der spie-  
 „ ren niet hindere, en wel zo lang, tot dat de  
 „ gematigde drukking op het geronnen bloed het  
 „ zelve in de opening der gekwetste slagader in-  
 „ drukt zonder egter haare opening geheel te  
 „ verstoppen. Deze op die wijze behoorlijk aan-  
 „ gebragte drukking verligt niet alleen zeer de  
 „ toevallen des lijders, van denwelken in dit  
 „ verhaal gesproken word, maar bevordert ook  
 „ spoedig de geneezing, welke men naauwlijks  
 „ had kunnen hoopen. Deze lijder had agttien



„ maanden in het bed gelegen, en ging den eers-  
 „ ten dag, dat men hem den band had aange-  
 „ legd, door het vertrek en den derden dag zou  
 „ hij hebben kunnen uitgaan. .... Het been  
 „ kreeg binnen drie dagen zijne vorige gedaante  
 „ weêr, en weinige dagen daarna begon de dije  
 „ weêr behoorlijk toe te neemen. Delijder was  
 „ binnen drie weeken weêr volkomen hersteld,  
 „ schoon hij gedurende dien tijd veel op de been  
 „ was geweest. .... Binnen twee of drie da-  
 „ gen,” zegt ARNAUD, „ droeg ik nergens an-  
 „ ders zorg voor, dan dat ik de schroef van den  
 „ band een weinig toedraaide, naar maate dat de  
 „ riemen zig verlengden. En de lijder droeg al-  
 „ leenlijk zorg, dat hij, toen de dije weêr toe-  
 „ nam, de drukking matigde en de schroef van  
 „ tijd tot tijd een weinig losser maakte.

Deze waarneeming kan tot een voorschrift die-  
 nen, hoe men een valsch naderhand ontstaan slag-  
 adergezwel, het welk zig na eene aderlaating aan  
 den arm openbaart, kan geneezen. „ Als de  
 „ voorarm naar buiten uitgezet is,” zegt AR-  
 NAUD, „ zo doen de spieren en peezen, welken  
 „ de geleding omgeeven, aan de drukking van  
 „ den zwagtel eenen wederstand, die omtrent  
 „ overeenkomt met dien van een plat been.”  
 Hij brengt een geval bij van een valsch nader-  
 hand ontstaan slagadergezwel, het welk in den  
 hoofdtak der armslagader omtrent zo groot als een  
 duiveney was, het welk hij door de drukking  
 volmaakt wél geneezen had.

FOUBERT brengt in de aangehaalde verhande-  
 ling ook een voorbeeld bij van een valsch nader-  
 hand ontstaan slagadergezwel, het welk hij enkel  
 door



door den band geneezen had. Ik zou ook nog veele voorbeelden kunnen bijbrengen uit mijne eigen ondervinding.

„ Als het gezwel klein is , ” zegt FOUBERT , „ en eerst onlangs ontstaan , dan genees ik het „ door eene kunstige drukking ; maar , als het „ gezwel reeds oud is en men de drukking wil „ aanbrengen , verandert de huid in verzwee- „ ring , de zak kan zig ook openen en de lijder „ sterven , zonder dat men hem eenige hulp kan „ toebrengen. De operatie is als dan volstrekt nood- „ zaaklijk ; doch zij is zo dringende niet , als in „ een oorspronkelijk valsch slagadergezwel ; men kan „ wagten tot dat het eenen zekeren omtrek beko- „ men heeft ; want hier door word de operatie „ zelfs gemaklijker gemaakt ”.

„ Het is niet gemakkelijk , ” vervolgt hij , „ te „ onderscheiden , of de hoofdstam of één der tak- „ ken open is : men kan zulks alleen ontdek- „ ken door de slagader te onderzoeken , wanneer „ men het gezwel opent en het geronnen bloed „ wegneemt. Als het gezwel zeer groot is , kan „ men vermoeden , dat het de hoofdstam is en „ dan moet men niet aanstonds tot de onder- „ schepping overgaan ; de lijder kan nog door „ eene behoorlijke en zorgvuldig aangebragte „ drukking , welker voornaamste steunpunt op „ de opening der slagader moet gerigt zijn , ge- „ neezen worden ; ik heb daar proeven van : het „ is mij met gekauwd papier en plukzel ge- „ lukt : thans , daar men de werking van de „ zwam kent , zal men te regt dezelve boven „ het gekauwd papier en het plukzel verkie- „ zen (\*). ”

(\*) Zie E. PLATNERI *Suppl.* p. 73. L.

Als men derhalven een stuk wélbereide eiken-zwam, zo als deze groote Heelmeester het opgeeft, op de wond der slagader legt en het door middel van het kussentje aan den zwagtel van FOUBERT of met de verhevenheid van dien van ARNAUD vastmaakt, zal het stuk geronnen bloed zulk eenen vorm aanneemen, dat het de wond der slagader zal stoppen en sluiten, ja zelfs geheel vereenigen, gelijk wij boven reeds verhaald hebben.

Als de opening der slagader in eenen tak der verdeelde slagader is en men gelooft, dat de drukking niet zal helpen, dan moet men tot de operatie besluiten. Egter moet men zig van dit laatste middel niet eerder bedienen, dan na dat men reeds de kunstige drukking beproefd heeft (114).

Maar, als men genoodzaakt is, de operatie te doen, raad ik de jonge Heelmeesters, dezelve

(114) LE BLANC schijnt, het nut van de *gebeele omwinding* van het beledigde deel niet gekend te hebben; — eene bewinding egter, waar van de heeren THEDEN, VAN DER HAAR, TEN HAAFF en mogelijk meer anderen voldoende proeven opleveren. Wij zouden derzelver nut door eigene ondervinding kunnen staaven, oordeelden wij niet, dat het getuigenis dezer mannen genoeg was. Wij wijzen den lezer voornaamlijk naar het aanhangzel van J. VAN DER HAAR, geplaatst agter de vertaalde verhandeling van GUATTANI, *over de slagadergezwellen*. — De wijze om deze bewinding te verrigten, zien wij bij D. VAN GESSCHER, *oefenende Heelkunde*, D. I. bladz. 451. pl. XVI. fig. 1.: als ook nader bij W. LEURS, *verhandeling over het aderslaaten*, enz. bladz. 125. Pl. II. fig. 8. beschreven en afgebeeld.]

naar de manier van FOUBERT te doen, zo als hij dezelve beschrijft (\*).

„ Als de lijder zig op eenen stoel van eene bekwaame hoogte geplaatst en den helper den arm gegeven heeft, om dien vast te houden, leg ik het tourniquet aan even als bij de afzetting, open de algemeene bekleedzels als naar gewoonte; en als ik het gezwel geopend heb, maak ik er langs deszelfs geheelen omtrek eene incisie in, tot dat ik op het vloeibaare bloed kom; even als of ik een ettergezwel opende, neem zo veel mogelijk het bloed en de bloedlaagen weg, en als ik de slagader ontbloot, en haare opening gevonden heb, breng ik, als het een bloote tak is, de kromme naald, welke puntig en aan weêrzijden snijdend moet zijn, onder de slagader door en wel zo, dat de naald, terwijl zij ter zijde van het vat, het welk tegen het binnenste gewrigt van het opperarmbeen gerigt is, ingesloten word, met haaren draad nog een gedeelte omvat van de deelen, die nabij de slagader gelegen zijn, ten einde de onderschepping des te vaster werde (\*\*). Ik heb opgemerkt, dat men op deze wijze veel zekerer, dan op eenige andere de zenuwen vermijdt, die men mede zou kunnen onderscheppen. Eene onderschepping eenige lijnen boven de opening der slagader aangelegd, is

(\*) *Mem. de l'Acad. &c. II. p. 538. 4°.*

(\*\*) Men moet de onderschepping egter nooit te sterk zamen trekken, dewijl daaruit gevaarlijke toevallen zouden kunnen ontstaan; maar men moet de slagader alleenlijk zo zamen drukken, dat er geen bloed uit dringen kan. L.

„ genoegzaam en het is mij gemeenlijk wél ge-  
 „ lukt ; egter raad ik nog eene tweede onder-  
 „ schepping te maaken ; de draaden der onder-  
 „ schepping verzekert men op de gewoone wijze  
 „ van buiten (\*).

„ De wond vul ik op niet droog plukzel , het  
 „ welk ik met langwerpige compresen en eenen  
 „ vereenigenden band vereenig , doch ik wagt mij  
 „ wel , dien te sterk toe te trekken , om den door-  
 „ loop der vogten niet te hinderen (\*\*). Ook  
 „ draag ik behoorlijk zorg , dat de compresen ,  
 „ die ik aanleg , in warmen wijngeest gedoopt en  
 „ er dikwijls weêr nieuw opgelegd worden , om  
 „ de warmte der deelen te onderhouden. Dit  
 „ verband moet men agt en veertig uren na de  
 „ operatie laten liggen , en wagten , tot dat het  
 „ plukzel afvalt , het welk gemeenlijk tien of  
 „ twaalf dagen na de operatie gebeurt en tot dat  
 „ de draaden afvallen , het welk een weinig laa-  
 „ ter volgt. ” (v4).

” (\*) Men moet reeds eenige dagen voor de operatie ee-  
 ne drukking maaken , ten einde het bloed zig aan eenen  
 nieuwen omloop gewenne. Twee onderscheppingen zijn  
 altijd noodzaaklijk , zomwijlen ook meer. Zie *traité des*  
*Operations de Chirurgie par AMBR. BERTRANDI trad. de*  
*l'Italien par Mr. SOLIER DE LA ROMILLAIS. à Paris. 1769.*  
 3<sup>e</sup> L.

(\*\*) Behalven de aderen moet men ook de watervaten  
 in agt neemen. L.

(v4) [ Na het verrigten dezer operatie , word gewoon-  
 lijk de geheele onderarm doof , ongevoelig , koud en bleek ;  
 doch het welk zig alles na verloop van eenigen tijd weêr  
 langzaam begint te herstellen : niet tegenstaande dat zom-  
 wijlen egter , gelijk de hoogleeraar MONRO heeft opge-  
 merkt , de Polsslag van de *Arteria radiaa* weg blijft. Zie



Daar zijn slagadergezwellen , die allengs tot eene aanmerkelijke grootte aangroeijen, en zulken heeft men voor ettergezwellen gehouden en geopend. Ik heb de dije aan een lijk van een manspersoon ontleed, aan welker binnenste en middenste deelen een gezwel was, het welk de lijder agttien maanden lang gehad had. Het was van tijd tot tijd grooter geworden en had de grootte van een kinder hoofd. Een anders bekwaam Heelmeester had het voor een ettergezwel aangezien en geopend. De lijder stierf aan de bloedstorting , die men op geenerlei wijze kon stelpen. De voorste helft der opening van de dijeflagader was drie vinger breed weggevreeten. Ik vond aan de binnenzijde der dije boven de knie een klein lidteken in de huid, van het welk men mij zeide, dat het van den steek van eenen degen was, welken deze soldaat voor omtrent een jaar bekomen had, waarop dit gezwel was gevolgd ; het welk zig allengs uitgezet had (w4).

*Edenburgsche proeven*, D. 11. bladz. 147. — Doch ongelukkiger is de uitslag, wanneer na verloop van 24. of 30. uren het deel onder de binding ongevoelig en koud blijft; blaaren, vlekken en streepen zig op de huid vertoonen: het welk een en ander eene aannaderende en volkómen versterking van den geheelen arm aanduid. — In ditzelfstip blijft er voor den Heelmeester niets over, zo hij zijn Lijder behouden wil, dan, alvorens hij deze toevallen tot eene zekere hoogte laat komen, spoedig tot de afzetting van den arm, boven de binding, over te gaan.]

(w4) [Hoe omzigtig men zomwijlen is, in het waarneemen der kentekenen, kan het nothans den ervarendsten doen mistasten, en het één voor het ander, vooral in deze gebreken, doen aanzien. Men zie hier van, onder anderen, eenige voorbeelden uit RIVERIUS, LANCISIUS en RUISCH

Deze waarneeming nu toont niet alleen het gevaar aan, welk bij het openen van zekere gezwellen, welker aart men niet nauwkeurig kent, plaatsvind; maar ook, dat groote slagadergezwellen aan eenen hoofdstam, gelijk hier het geval was, on-

door PLATNER in zijn meergemeld werk, D. I. bladz. 399. (\*) bijgebracht: „Ik beken;” zegt zelf deze geleerde man, in de zo even aangehaalde plaats, „dat ik op deeze wijze eens in een jongen bedroogen heb geweest, die een sterk kloppend gezwel hadt aan 't bovenste van de borst, 't welk mij toefcheen een slagaderbreuk te zijn, daar het nogthaus, in het vervolg, door de suppuratie werdt genezen. De dwaaling egier,” vervolgt hij, „is veel gevaarlijker, wanneer de Heelmeesters een *Aneurysma* voor een ander gezwel aanzien en het zelve openen, hoednige droevige omstandigheden niet dan te dikwils voortkomen.”

Bij de Ettergezwellen aan de Lies en Okfelen ontmoeten wij veelmalen eene zodanige sterke klopping, dat dit soort van gezwellen den Beoefenaar dikwerf zig zelve, omtrend de ware bepaaling, doet wantrouwen. — Wij hadden onlangs bij een jongman een dergelijk geval. Dezelve vertoonde ons, onder zijn regter okfel een gezwel ter grootte van een hoederëi, 't welk langzaam was opgekomen; in het begin wel gevoelig, doch nu bijna geheel onpijnlijk; op het aanraaken zag; met bijna of geene kleur verandering, en verzeld met eene sterke klopping. Uit de twijfelagtigheid der kenmerken beslooten wij, dit gezwel aan zig zeiven over te laten, en dekten het alleenlijk met een *Emp. diachyl. C. Gumm.* Omtrend veertien dagen hier na kwam er eene ontfteeking bij, en het gezwel zette zig aanmerkelijk uit. De tekenen bleeven egter even duister. Wij namen onze toevlugt tot verzagende pappen; en na verloop van vier dagen opende zig het gezwel van zelve en ontlastte eene menigte etter. — Wij raaden dus alle jonge Heelmeesters aan, in deze of soortgelijke gevallen de voorzigtigheid te beiragten en liever de natuur, schoon langzamer, te laten werken, dan door eene ongelukkige handgreep der kunst de lijdens in het graf te storten.]

ongeneeslijk zijn , wijl de randen der slagader , daar het gezwel is , allengs verslijten (\*).

De vierde soort van slagadergezwellen , welken Dr. HUNTER waarneemt , is , gelijk wij reeds gezegd hebben ; ongeneeslijk. De drukking , welke bij de meeste andere slagadergezwellen heilzaam is , is hier nadeelig , dewijl , gelijk HUNTER aanmerkt , deze drukking den terugloop van het bloed door de terugvoerende aderen zou kunnen hinderen , het welk het ongemak zou verergeren. Om dus de vergrooting van deze slagaderbreuk voor te komen , moet men den lijder beveelen , zijnen arm zo veel mogelijk om hoog te houden en niet te laten afhangen , denzelyen met geestagtige vogten te wrijven en alle sterke bewegingen en vermoeijenden arbeid met den arm te vermijden.

(\*) In veele gevallen van slagadergezwellen moet men tot de afzetting overgaan. Hier bij moet men vooral aanmerken , dat men het lid zo hoog mogelijk boven het gezwel moet wegheemen , wijl de slagader , niet alleen hier , maar ook veeltijds nog hooger , beledigd is. Het is zeldzaam , dat bij een slagadergezwel in den knieboog de afzetting vrugtloos in het werk gesteld word. — Behalven de reeds bijgebragte werken , behooren hiertoe nog de volgende. De verhandeling van DONALD MONRO in de *Essai observations physical and literary*, Edimburg. Vol. III and ROLI GUATTANI *de externis aneurismatibus liber*. Romæ 1772. [ Zie de Nederduitsche vertaling hier van , door den kundigen J. VAN DER HAAR , Rott. 1779. ] en CAJETAN LOMBARDINI *de aneurismaticis præcordiorum morbis*. Pavie 1777. 4. L.



## EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

*Van de afzetting der leden.*

**H**ET afzetten der leden betreft de vingers, een gedeelte der hand, de teenen en een gedeelte van het been, den voorarm, den opperarm, welken men zomwijlen uit de geleding neemt, de dije, het been en in zekere gevallen ook de dije uit haare geleding met het bekken (x4).

(x4) [Nadien de heer LE BLANC in dit geheele Hoofd-deel niet spreekt van de gevallen, welke de afzetting noodzaaklijk maaken; en dit stuk van veelen zeer verschillend behandeld word: zo hebben wij gedacht den jongen Heelmeester geen ondiensnt te doen, aan hem voor te stellen de gevallen, welke thans door de meesten onzer beoefendste Heelmeesteren, in tegenstelling nogthans van de heeren BILGUER, TISSOT en meer anderen, hier toe betrokken worden.

Deze zijn; eene volkomen en bepaalde versterving van eenig deel, vooral, wanneer dezelve door eene uitwendige oorzaak ontstaan is; een aanmerklijk en bepaald been bederf, het zij in het gewrigt of lichaam des beens zelve; de gedeeltelijke of geheele wegneeming van eenig voornaam deel door schietgeweer; een beenvermorseling, met verscheuring van banden, peezen enz.; de opening of doorklieving van eenig aanzienlijk bloedvat, welkers bloedvloed door de konst niet kan gestuit worden, ten minsten niet dan met verlies van dat deel, waar toe het geschikt was: — Met een woord, alle beledigingen, van wat aart dezelve ook zijn mogen, en welken eenig deel, 't welk voor de wegneeming vatbaar is, aan doen; en wier gevolg eene volstrekte vernietiging van dat en verdere deelen aanduid, mog-



## I.

*Van de afzetting der Vingers.*

**D**E ouden sneden de vingers in het midden van eene geleding met snijdende tangen door, anderen bedienden zig van eenen beitel en eenen looden hamer om deze afzetting te verrigten; anderen eindelijk zaagden het lid in het midden door, en dit deden zij, om dat zij geloofden, dat het gevaarlijk is, de vingers in de gewrigten door te snijden. De laater Heelmeesters, welken bij ondervinding zagen, dat deze wijzen van de vingers afzetten, toevallen veroorzaakten, beproefden, deze afzetting in de gewrigten te onderneemen en het goed gevolg heeft de vooroordeelen der ouden daar omtrent ten eenemaale verban-  
nen (y4).

ren zonder bedenking den grondslag dezer operatie uitmaaken.

Het juiste tijdperk der operatie in deze gevallen ontleent vooral van de verschillende omstandigheden der verschijnzelen deszelfs bepaaling. En het zijn deze verschijnzelen, welken een oplettend Heelmeester den meer of minder spoedigen tijd tot derzelver onderneeming ligtelijk aanwijzen.]

(ij4) [Het wagneemen door *snijtangen* is wreed, zij kunnen door derzelver toenijping opspijting en afschilfering veroorzaaken.

De operatie door den *beitel* en *hamer* is aan dit zelfde toeval onderworpen, en ook niet altoos zeker. — Wij hebben gezien, dat door geöefende Heelmeesters twee en meer slagen door den hamer (niet zonder de hevigste pijn aan

Om het tweede en derde lid af te zetten, laat de Heelmeester zo veel mogelijk zijnen helper, die de hand vast houdt, de huid naar de hand trek-

de lijdens te veroorzaken) op den beitel gegeven wierden, zonder dat dezelve nogthans de afkapping des vingers bewerkte. Het geweld deed den vinger wel breeken, doch niet op de bepaalde plaats, en men was genoodzaakt, wilde men de operatie volbrengen, dit deel ter plaatse daar het zelve gebroken was, met de schaar af te snijden. — En dit geval moet bij deze wijze van afzetting altoos gebeuren, wanneer namelijk, door onagtzaamheid of eenige andere oorzaak, het deel, 't welk men wil wegneemen, niet evenredig en op alle deszelfs punten evenlijvig op dat geen, waar op het ten tijde der afkapping liggen moet, gehouden word.

Bij gevolg is het niet zonder reden, dat de heer LE BLANC aan de afzetting der vingeren in derzelver gewrigten boven deze wijze den voorrang geeft. — Dan, niet tegenstaande deze laatste ook de aanprijzing en goedkeuring van de meeste der beoefenende Heelkundigen wegdraagt, moeten wij, behoudens hun agting, betuigen, dat ze egter aan ons geene genoegzame voldoening verschaft. Zij besluit nog veele onvolkomenheden en levert, behalven eene min of meerdere omslagtigheid, voor de Lijders eene hevige pijn op: de minste kwetzing van het kraakbeen des lids 't welk behouden moet worden, geeft eene langdraadige en verdrietige geneezing. — Wij verkiezen derhalven liever, om een en andere redenen, bij deze afzettungen, in naarvolging van LE DRAN, *oper. der Heelk. bl. 419.*, het gebruik der *zaagjes*, en wel zulken, die uit wél geharde sijne scherpe staalen veeren gemaakt zijn.

En schoon dezelve ook niet van alle onvolkomenheden vrij zijn, zo kan men egter door dezelve vrij spoedig en bijna op alle plaatsen de afzetting, zonder merklijke pijn en toevallen, verrigten. Om de operatie door afzaaging te verrigten, behoeft niet meer dan, na dat de huid opgetrokken is, eene rondgaande snede tot op het been gemaakt te worden; vervolgens dit laatste met het zaagje zagtiijk doorgezaagd hebbende, verbind men, even als onze schrijver in dit hoofddeel opgeeft.]

ken, en maakt met een incisiemes met eene bolle snede eene kringvormige incisie in de huid, een weinig van het gewricht van het lid, dat hij wegneemen wil. Zo dra de huid rondom doorgesneden is, gaat de helper nog steeds voort, met de huid naar de hand toe te trekken, hier door word de kringvormigerand der doorgesneden huid met het gewricht, het welk dan geheel ontbloot is, in den zelfden stand en strekking gebragt: alsdan vat hij het lid met de linke hand, buigt het, zo veel als mogelijk is, om en scheid het lid met het zelfde instrument af, terwijl hij de uitspannende pees doorsnijdt, den beursband [*ligamenta capsularia*] opent en eindelijk de inbuigende spieren doorsnijdt; doch hij wagt zich hier bij wél, met de snede van het instrument het kraakbeen te raaken, het welk het einde van het lid bekleed, dat hij wil behouden.

Als men eenen vinger uit zijn gewricht met het been der nahand wil afscheiden, begint men, met den vinger, als het bij voorbeeld de voorste vinger is, van den naastvolgenden af te scheiden. Als men nu nog eenige lijnen van het gewricht af is, maakt men daar eene kringvormige incisie in de huid, ten einde de helper, welke de hand vast houdt, de huid naar de hand zou kunnen trekken en dus het gewricht ontblooten. Hier op buigt hij den vinger om en op zijde, snijdt de uitspannende pees door, maakt in den beursband eene incisie en scheid eindelijk ook de buigspieren (\*), doch neemt zich wél in agt, dat hij met

(\*) Ik meen de peezen der opperste buigspier der vingers (*sublimis*) en der diepliggende spier der vingers (*profundus*).



de snede van het instrument het kraakbeen, het welk het hoofd van het been der nahand bekleed, waar mede de vinger door het gewrigt vereenigd is, niet raake.

Als men den middensten of den ringvinger wil wegneemen, moet men te weêrzijden eene insnede maaken, om bij het gewrigt te kunnen komen en de kringvormige incisie e. z. v. te maaken.

Het tweede en derde lid van den duim neemt men op dezelfde wijze weg als die der andere vingers; maar als men den duim uit zijne geleding met het vierkante been van het gewrigt der hand wil neemen, maakt men eene insnede, om den duim van het been der nahand, het welk den voorsten vinger draagt, af te scheiden; snijd de huid en de halve tuschenbeenspier van den voorsten vinger tot aan het gewrigt van het eerste lid met het vierkante been door; buigt den duim op zijde; draagt zorg, dat de helper, die den voorarm houdt, de huid om hoog trekt; opent den beursband, en scheid dien uit de geleding, terwijl men de snede van het mes naar den duim houdt, op dat men het kraakbeen niet kwetse, dat het vierkante been overdekt, en de uitspannende peezen doorsnijde; snijd de spieragtige deelen van de duimspier (*thenar*) als mede de pees van de buigspier door en neemt den duim weg.

Na de eene zo wel, als na de andere wijze van afzetten, haalt men de huid over de wond te zamen, vult de wond met eene genoegzaame hoeveelheid geschaafd plukzel, op het welk men ruuw plukzel, linnen longuetten en compresen legt; het geheel word met eenen bekwaamen band ver-



zekerd (24). Men moet het verband niet eerder afneemen, dan wanneer het van zelve afvalt (25). Al de volgende verbanden moet men met fijn, zagt en droog plukzel leggen, doch geen zalf, noch digestief daar op doen, ten minsten wanneer geen bijzondere omftandigheden het nodig maaken. Als het lidteken zig begint te vormen, kan men over het plukzel eene kleine hegtplaafter, als bij voorbeeld de gomplaafter, leggen.

Er zijn gevallen, gelijk dat, het welk LOUIS (\*) verhaalt, waar in de Heelmeester zig genoodzaakt ziet, een geheel deel der hand weg te neemen en dus de beenderen der nahand door te zaagen, gelijk hij dit zelf met het gelukkigst gevolg gedaan heeft, om het lid zo lang mogelijk te behouden. Ook kan men met het snijdend instrument de beenderen van de nahand uit derzelver geledingen met de beenderen van het gewrigt der hand fcheiden, ten einde zo veele en zulke lange deelen te behouden als mogelijk is.

De teenen zet men op dezelve wijze af. Men

(24) [Naardien de bloedftorting zelden aanmerklijk is, zo is het zomwijlen, om toevallen voor te komen, van nut altoorens men verbind, het zelve eerst wat te laten uitvloeijen. Doch wanneer het egter gebeurde, dat een slagadertakje eenige veelheid bloeds storte, zo zal men in zodanig een geval met vrugt van de onmidlijke aanlegging der zwam op het geopende mondje der slagader gebruik kunnen maaken.]

(25) [De heer LE BLANC wil hier waarschiynlijk door verstaan hebben: dat men niet eerder verbinden moet, voor dat het tijdperk der suppuratione daar is en het plukzel door de verettering los word en af valt. Dit geschied gewoonlijk na verloop van zes, agt of meer dagen.]

(\*) *Memoires de l'Acad. de Chirurgie*, II. p. 388.

kan in zekere gevallen ook een gedeelte van den voet wegneemen en de beenderen van den navoet doorzaagen of dezelve uit hunne gewrigten losmaaken, gelijk verscheiden schrijvers zulks verhaalen (\*).

## II.

### *Van het afzetten van den voorarm.*

EEN voornaame regel bij de afzetting van groote deelen is, dezelve zo te verrigten, dat van de huid zo veel, als mogelijk is, behouden werde, op dat na de affcheiding van het lid nog zo veel overblijft, dat men ze over den rand des stomps kan trekken. Een andere regel bij het afzetten der leden is, dat men het zelve zo lang, als mogelijk is, behoude (b5).

Bij het afzetten der groote leden moet men gedurende en na de operatie het bloed tragten meester te worden. Te dien einde legt men het tourniquet voor de operatie zo aan, dat het op

(\*) In SCHMÜCKERS *vermischten chirurgischen schriften. II. B.* vind men eene lezenswaardige verhandeling hier over van den heer BLOCH. L.

(b5) [Deze laatste regel gaat egter niet altoos door: bij de bovenste ledemaaten is dezelve nuttig, doch bij de onderste veelal af te keuren; vooral wanneer de voet of het onderste van het been moet weggenomen worden. Men zal ook in dit laatste geval de operatie meestal door de geoefendste Heelmeesters even onder de knie zien voorstellen, niet tegenstaande het wegneemen van den voet genoeg was: en wel om dat het overblijvende stuk beens meer hinderlijk dan gemakkelijk zijn zou.]

den hoofdstam der slagader, welke zig hier verspreid, moet drukken, en om te beletten, dat het bloed niet vloeije, onderschept men al de hoofdtakken der slagader, welken doorgesneden zijn.

Bij het afzetten van den voorarm legt men op het middenste en binnenste deel des opperarms boven de plaats, daar de armslagader ligt, eene trapswijze compres, welke men verzekert door eene tweede, die rondom den arm gaat en hier legt men dan het tourniquet aan, het zij het veld-tourniquet, of dat van PETIT, het welk MORAND verbeterd heeft, en het welk men voor het andere moet verkiezen, wijl het gemaklijker en zekerer is. Men vertrouwt het tourniquet aan eenen kundigen helper.

Wanneer men den voorarm voor digt bij het gewricht der hand wil afzetten, moet men hem naar binnen laten buigen, een helper moet de hand vasthouden en een andere, die op zijde moet staan, den voorarm met beide handen vatten en de huid naar de elleboogen trekken. De Heelmeester legt hierop eenen band van omtrent twee vinger breed ter plaatze, daar hij de beenderen wil doorzaagen en maakt met een incisiemes, dat eene bolle snede heeft, een kringvormige incisie in de huid. Zo dra de huid rondom doorgesneden is, trekt de helper de huid zo ver om hoog, dat de kringvormige rand, welke door deze incisie gemaakt is, op dezelfde plaats komt, daar de Heelmeester de zaag wil zetten. Alsdan legt hij aan het onderste deel ook nog eenen band aan en laat den helper, die op het tourniquet agt geeft, denzelven aantrekken om de bloedstorting te be-

letten. Hierop snijdt hij met het zelfde incisiemes; digt bij de opgetrokken huid, de peezen en de overige deelen, welken de beenderen bedekken, door, snijdt de vierkante inwaard draaijende spier, welke tusfchen de beenderen is, insgelijks door; als de spier in dezelfde ftrekking is met de plaats, daar de afzetting gefchied, fcheid hij dezelve af, daar hij de beenderen wil doorzaagen, gelijk hij ook met een tweefnijdend mes het beenvlies wegneemt ter plaatze, daar hij doorzaagen wil (c5). Om nu het beenvlies behoorlijk weg te neemen, snijdt hij het met de punt van dit instrument rondom de beenderen, zo digt bij de vleeschi-ge deelen, als mogelijk is, door, fchrabt het met de snede van het zelfde instrument na het deel, dat hij wegneemen wil, af, ten einde met de zaag alleenlijk de beenderen te fcheiden, en het beenvlies niet te fcheuren, hetwelk van kwaade ge-  
vol-

(c5) [De herhaalde infnijding door de Fransche en Engelsche Heelmeesters met veel ijver doorgezet, heeft bijna in Europa eene algemeene toejuiching gekregen. Doch niet tegenstaande dit, zo zijn er egter nog zodanigen, die dezelve op verre na zo volledig niet beschouwen, als men dezelve oordeelt te zijn. — De taal van den kundigen GESSCHER levert, onder anderen, een bewijs hier van op. „Het zij mij vergunt,” zegt deze groote Heelmeester, „hier op aan te merken, dat dergelijk eene herhaalde infnijding veel minder voordeelen insluit dan de heer SHARP, zig verbeeld: dat ze althans geheel niet in staat is om „het uitsteken des beens te verhoeden” e. z. v. *algem. oeff. Heelk.* §. 3272. — En een ieder, die bij onder- vinding weet, wat *afzetten* is, vertrouwen wij, dat, zo hij niet aan blindelings volgende Leerstellingen verflaapt is, hij aan de herhaalde infnijding nimmer de voorkeur boven de wijze der Ouden geeven zal.]



volgen zou kunnen zijn (d5). Hierop legt hij eenen kleinen band zeer vast aan, waar door hij de beide beenderen zamen bind, om ze behoorlijk te verzekeren en daar door te beletten, dat zij niet wiggelen, als hij ze doorzaagt. De einden van den band laat hij door den helper vasthouden, die de hand vat, en om de beenderen gemaklijker door te zaagen, laat hij ze op eene stelling rusten, die eene bekwaame hoogte heeft en omtrent zò gemaakt is als die, waar van BERTRANDI zig bediende om de dijepijp door te zaagen (\*), en om de spieren te beschermen, omvat hij de beenderen met eene gespleeten compres, die hij aan den helper overgeeft, welke den voorarm vast houdt. De Heelmeester, die de operatie doet en tusschen den lijder en deszelfs arm staat, begint met de zaag, die eene geheel regte plaat heeft, den eersten trek op den draaijer, wijl deze hier het sterkste is, alsdan zaagt hij ook het ellebeen door; en geeft ook wél agt, dat het

(d5) [Het is zeer moeilijk dit beenvlies op alle plaatsen, vooral, wanneer er meer dan een been is, weg te schraapen, en neemt ook in de operatie eenen aanmerkelijken tijd weg. De beroemde Fransche Heelmeester LE DRAN heeft dit reeds voor lang opgemerkt, daar hij zegt: „Het vleesch, en insgelijks het beenvlies geheel doorgesneden zijnde, „neemt deze insnijding, welke ik vooronderstel volkomen te zijn, alle gemeenschap van leven tusschen het „deel van het beenvlies, dat boven de insnijding is, en „dat, 't welk beneden is, en bij gevolg ook het gevoel „weg: het is derhalven onnut het been te schraapen, om „het beenvlies daar van los te maaken, gelijk de schrijvers voorstellen.” *Oper. der Heelkonst*, bladz. 416. Zie ook PLATNER *Handl. tot de Chirurgie*, D. I. bladz. 197. als ook GESSCHER oeff. Heelk. §. 3263.]

(\*) *Mémoires de l'Acad. de Chirurgie*, T. II. p. 372.

ellebeen eerst geheel doorgezaagd is, voor dat hij den draaijer afneemt, waarmede hij de operatie moet besluiten. Als nu de beenderen doorgezaagd zijn en het lid weggenomen is (\*), laat hij het tourniquet een weinig los, ten einde de openingen en einden der afgesneden slagaderen duidelijk te kunnen zien en onderscheppen (\*\*). Hij neemt

(\*) Om de beenderen, bij welke afzetting het ook mag wezen, wél door te zaagen, moet de plaat der zaag dun zijn; zulk eene gaat veel gemaklijker en ligter door dan eene breede, en als het lid, dat men weg wil neemen, uit twee beenderen bestaat, moet men den eersten trek met de zaag op het sterkste been doen, en dan tot het kleinere overgaan, het welk men ook het eerst moet doorzagen. Men moet de zaag ligt beweegen en er lange trekken mede doen, ook moet zij niet zeer sluiten; op het laatst moet men zeer zagt zaagen en slegts kleine trekken doen, om te verhoe-den, dat de beenderen niet aan stukken springen. De schraag (*chevalet*) is een goed middel om de beenderen nauwkeurig door te zaagen. Indien, onaangezien deze voorzorg, egter een splinter buiten het afgezaagde stuk mogt zijn blijven zitten en uitsteken, zou het altijd beter zijn, denzelven oogenbliklijk af te zaagen, dan dien met eene tang af te rippen gelijk zommige schrijvers aanraaden. LE BLANC.

Onder de zaagen, waar van men zig bedient, behaagt mij inzonderheid die van POTT, (zie *Brambilla Inurumentarium chirurgicum Viennense* T. 61. fig. 2.) schoon zij des niet te min een' kundigen bestierder verëischt. De schraag is altijd boven eenen tweeden helper te verkiezen. Eene goede zaag tot het afzetten moet eene breede plaat hebben, die een weinig breeder is, daar de kegelvormige tanden staan. Voor eenen geoefenden Heelmeester kan de greep der zaag met de plaat in gelijke lijn staan; doch voor eenen mingeoefenden is het beter, dat dezelve een weinig hooger staat, dan de plaat. L.

(\*\*) De oefenende Heelmeesters zijn het ten aanzien der onderschepping van de slagaders niet eens; zommigen wil-

dan den aangelegden band af, brengt de huid nabij den stomp bij elkander, waar over hij eene

len, dat men veel vleesch in de onderschepping vatte; anderen, dat men alleen het celledweefzel, het welk om de slagader ligt, mede zal onderscheppen. Als men veel vleeschige deelen in de onderschepping vat, neemt men ook tevens veel vliezige en peesagtige deelen, welken, indien zij te sterk aangetrokken worden, gevaarlijke toevallen zouden kunnen veroorzaaken. Wanneer men alleen het celledweefzel vat, dat de slagader omgeeft, kan de onderschepping, als men ze maar een weinig te sterk aantrekt, de slagader doorsnijden; daar en boven kan de rotagtige ontbinding van het celledweefzel de wanden der slagader in een punt van haare middenlijn doorknaagen en eene tweede bloedstorting veroorzaaken ter plaatze, daar de onderschepping geschied was.

De toevallen, die op de onderschepping volgen, daar men te veel vleeschige deelen omvat heeft, hangen dikwijls af van de spanning der deelen, welken onderscheept waren en het naast bij het been liggen, gelijk POUTEAU dit zeer wél aangetoond heeft in zijne *Melanges de Chirurgie*. Hij raad derhalven tot vermindering dezer toevallen aan, na het onderscheppen der vezelen, welken zulk eene spanning zouden kunnen veroorzaaken, de beenderen zo na mogelijk te doorsnijden. —

Doch om de verrotting van het celledweefzel en van de spieren, welken mede onderscheept zijn, te vermijden, moet men enkel dezelve om de wanden van de opening der slagader zeer matig zamentrekken en het invloeyen van het bloed beletten. Ook weet men, dat het opzwellen van de wonden der slagader en van de deelen, in de onderschepping besloten, en welk op dezelve onder en boven dezelve volgt, eene voornaame hinderpaal aan het bloed is. Dit gezwel maakt de holligheid van het vat nauwer; hoe meer het eerste toeneemt, hoe nauwer het andere word; de wanden der slagader raaken elkander onmiddellijk, kleeven aan een en vereenigen zig door middel van het vogt, het welk ze zamenfmeed. Op die wijze moet men zig de vergroeying van eene slagader, om dewelke men eenen band gelegd heeft, verbeelden.



genoegzaame hoeveelheid geschaafd plukzel en daar over ruuw plukzel legt, om de ledige plaat-

Als men de onderschepping wil doen, neemt men eene kromme naald, welke men met dubbele draaden, die men naast elkander legt, wél met wasch bestrijkt, en in de gedaante van een lint naast elkander kleeft en hierop met ongel vet maakt, doorhaalt, zo dat zij gemakkelijk doorgetrokken kan worden. Als dan laat men het tourniquet een weinig los, om het einde der slagader te ontdekken, steekt de naald twee of drie lijnen van de opening der slagader in het vleesch, en als men ze omtrent een vinger breed doorgestoken heeft, trekt men ze op de tegengestelde zijde, op dezelfde wijdie van de opening der slagader, door, steekt ze andermaal dicht bij de plaats, daar men ze doorgehaald heeft, weér in, en trekt ze dan op de plaats, daar men ze het eerst ingestoken had, weér door. Hier door maakt men, dat het kanaal der slagader zig midden in de onderschepping bevind. Als dan maakt men met de beide einden der draaden eenen heelkundigen knoop, trekt dien matig zamen, terwijl men de vingers, die den knoop toetrekken, tegen de spieren aandrukt, om alle opening te vermijden. Men laat dan het tourniquet een weinig los, om te zien, of de knoop vast genoeg toegetrokken is, en maakt op denzelven dan nog eenen knoop met eenen strik.

[ De pijn en hevige toevallen, welke zomwijlen op deze wijze van heging volgen, heeft veelal de Heelmeesters tot onderschepping der slagader bij eene afzetting, de zogenaamde *Slagadertang* doen bezigen. Men zie de wijze om dezelve te gebruiken en tevens eene goede afbeelding bij GARENGEOT, *verhandeling over de instrumenten der Chirurgie*, D. II. bl. 147. als ook bij HEISTER, *Heelk. onderwijzingen*, Pl. IX. fig. 6. en 7. en verbeterd bij ULHOORN, Pl. II. fig. 13. — Dan in plaats van deze tang heeft BROMFIELD zijn *tenaculum* (zijnde een kromme naald met een plat handvat) tot dat zelfde einde uitgedagt; en merkt aan, dat ingeval de slagader is opgetrokken, de tang als dan van geen dienst kan zijn, daar deze naald egter kan gebezigd worden.

Dan, de ondervinding heeft in beide deze wijzen geleerd, dat de draad, welke om de uitgetrokken slagader gelegd



zen te vullen en eene zagte en gelijke drukking te maaken ; doch het geheel verzekert hij met eenen eenvoudigen vereenigenden band , dien hij nooit te sterk moet zamentrekken.

Als men deze afzetting verrigt, wanneer het

word, veelligt door de opkrimping derzelve afschuift en eene nieuwe en zomwijlen gevaarlijke bloedvliet veroorzaakt. — Om dit toeval voor te komen, hebben wij geene zwaarigheid gemaakt, onze Leerlingen te onderigten: dat in plaats van den draad alleenlijk om het uitgetrokken einde der slagader te winden en aldaar eenvoudig door een knoop en strik te vestigen, het ons voorkwam veiliger te zijn, wanneer men dezen draad door middel van een fijn naaldje ééns of tweemaal dwarsch door het uiteinde der slagader doorhaalde, en verder door dezen draad dezelve toebond. De proeven, hier toe genomen, hebben ons nader getoond, dat deze wijze van onderschepping en toebinding voor alle afschuiwing vrij zeker is. Zedert hebben wij ook met genoegen gezien, dat de beroemde GESCHER dit insgelijks ter zijner goedkeuring opgeeft. Zie *oeffenende Heelkunde*. D. III. bladz. 98.]

Op deze wijze moet de onderschepping der voornaamste slagaderen bij het afzetten en in alle andere gevallen, waar in eene slagader te veel bloed geeft, verrigt worden. En zijn gevallen, waarin het bloed uit eene slagader komt, welke uit het lichaam des beens ontspringt, en waarin het onmogelijk is, eene onderschepping in het werk te stellen. Dit zijn de gevallen, zegt MORAND, in dewelken men een stukje vitriool of een gloeiend ijzer moet gebruiken.

De einden van den band moet men lang genoeg laten, op dat men hem ten eersten kan uittrekken, als het nodig is.

Wijl de band, als men hem slegts matig toetrekt, dikwijls de spiervezelen, welke mede in de onderschepping zijn gekomen, niet volkomen vernielt, gebeurt het veeltijds, dat de band nog lang tusfchen de spieren blijft liggen, schoon de stomp reeds opheelt. Men kan als dan, gelijk MORAND dit uit eigen ondervinding aanmerkt, den band zonder gevaar open snijden.

gewrigt der hand of het ondereind van den voorarm door eenen schoot of door een geweer verbrijzeld is, het welk berst in de hand van hem, die het wilde affchieten, hebben de gekwetste beenderen gemeenlijk geen vastigheid meer onder elkander; in zulk een geval is het volstrekt noodzaaklijk, de beenderen met eenen kleinen regten band te binden en op eene schraag, ten einde dezelve des te beter te kunnen doorzaagen. Op deze wijze heb ik de operatie voor dertig jaaren met mijnen amptgenoot, den heer NOEL, in eene afzetting van den voorarm ondernomen en wel bij gelegenheid van een geval, dat een geweer gesprongen was en het gewrigt der hand en de onderste einden van het ellebeen en den draaijer verbrijzeld had.

Wanneer de beenderen van het gewrigt der hand slegts verbrijzeld zijn, zo dat de einden van het ellebeen en des draaijers niets geleden hebben, moet men de afzetting in de gewrigten van deze beenderen met het gewrigt der hand doen, omtrent op dezelfde wijze, als men de vingers uit derzelver gewrigten neemt, of zo als men de beenderen der nahand van de beenderen van het gewrigt der hand affcheid; doch men moet altijd agt geeven, dat men zo veel van de huid behoud, als mogelijk is.

Voor meer dan dertig jaaren sprong een geweer in de hand eens bedienden van den heer VAN IMBRECOURT. De beenderen der nahand en een gedeelte van de beenderen der voorhand waren verbrijzeld; doch de einden der beenderen van den voorarm en de kraakbeenderen, die ze omkleeden, waren beschadigd. Ik fcheidde derhalven

met een incisiemes het gewrigt der hand zeer zorgvuldig uit de geledingen met den voorarm en droeg zorg, dat ik met de snede van het instrument de kraakbeenige einden van den voorarm niet raakte. De lijder had verder geen toevallen en de stomp was binnen veertig dagen volkomen toegeheeld, zonder dat ik ergens eene merklijke afschilfering daar aan bespeurde.

Wijl ik overtuigd was, dat het zo gevaarlijk niet is, als de ouden meenden, een lid uit het gewrigt af te scheiden, besloot ik in het boven verhaalde geval, er de proef van te nemen. Het gevolg, dat ik bij het afzetten der vingers uit derzelver gewrigten en bij het afzetten van den arm uit het schouderblad gezien en ondervonden had, maakte mij onbeschroomd. Ik overlei derhalven bij mij zelven en dagt, wijl bij het afzetten der vingers en des arms uit de gewrigten met het schouderblad het lidteken zig zo wel vormt over de kraakbeenen, waarom zou het zig niet even zo wel vormen over die, welken de onderreinden van den voorarm bekleeden? Daarenboven, wanneer ik de hand uit de gewrigten afscheide, houd ik den voorarm langer; een voordeel, dat de lijder moet ontbeeren, wanneer men hem de beenderen doorzaagt.

Volgens deze waarneeming en de gronden, welken mij deden besluiten om het afzetten der hand in haare gewrigten te onderneemen, geloof ik, dat men in zekere gevallen het afzetten van den voorarm in zijne gewrigten met den opperarm en die van het been in zijne gewrigten met de dije zou kunnen onderneemen. De heer BRAS-



DOR heeft aangetoond (\*), dat men het afzetten der armen, beenen en dijën in derzelver gewrigten kan onderneemen. Ook heeft de heer HOIN mij berigt, dat hij met het gelukkigste gevolg een been in het gewrigt van de knie afgezet heeft. Het was te wenschen tot bevordering der wetenschap, dat iemand al de waarneemingen, hiertoe betrekkelijk, bij elkander verzamelde, om de vooroordeelen der Heelmeesters tegen het afzetten uit de gewrigten geheel en al te verbannen. Ik weet, dat de heer LOUIS eene verhandeling over deze gewigtige stof beloofd heeft (e5).

De heer LOUIS raad bij het afzetten van den voorarm aan, dat men na de onderschepping der vaten de kokers der spieren zal opsplijten, ten einde de verstopping der vogten te verhoeden, welke

(\*) *Memoires de l'acad. roy. de Chirurgie. Vol. V. 4°*. Zie ook TRECOURT, in de *memoires & observations de Chirurgie. Paris 1769, 8°*.

(e5) [Het vooroordeel, tegen de afzetting der leden in derzelver gewrigten, isthans zo heerschend niet meer. Zedert dat beroemde mannen zig deze stof hebben aange trokken en de oefenende Heelmeesters hebben doen blijken, dat het geene nieuwigheid is; maar dat zelfs de oudsten en beroemdsten der Genees- en Heelkundigen, in voorkomende gelegenheden, daar van reeds gebruik hadden gemaakt. Men zie, dit aangaande, de werken van HIPPOCRATES, GALENUS, SEVERINUS, PARE, HILDANUS en veele anderen, — Ook pleiten rede en ondervinding voor derzelver bestaanbaarheid. De meer genoemde GESSCHER, een man, wiens oordeel en ondervinding allezins de blijken eens grooten Heelmeesters opleveren, hier op zinspelende, zegt: „ dat ze *beschouwelijk* genomen, geenerlei „ merklijk, althans, geenerlei onverwinlijk gevaar insluit; „ en *oefenend*, dat ze gedaan is met eenen uitslag, al „ zints beantwoordende aan het oogmerk.” *Oeff. Heelk.* §. 3236.]



door het gezwel, dat na het afzetten volgt, kon veroorzaakt worden, en schrijft derhalven voor, de kokers onder de huid langs de spieren te klooven. Ik heb volgens dit voorschrift de operatie nooit zelf ondernomen, noch zien onderneemen; ik zou vreezen eenige slagader en zekere deelen, die men in agt moet neemen, te kwetzen. Egter heeft de ondervinding ook geleerd, dat, om het zwellen der spieren, het spannen der kokers en de ophoping en verstopping der vogten te vermijden, men slegts maar eenen vereenigenden band behoeft aan te leggen en maar even samen toe te trekken.

Als men het middenste en bovenste gedeelte van den voorarm wil afzetten, moet men hem door den helper laten houden, en, zo als ik te vooren aangewezen heb, de banden aanleggen; de Heelmeester, die de operatie doet, moet zig tuschen het lichaam en den arm van den lijder plaatzen, en met een mes, dat eene bolle snede heeft, (zie plaat III. fig. 4.) eene kringvormige snede maaken. Misschien zal men zig verwonderen, dat ik deze mesfen boven de kromme mesfen verkies, waar van de Heelmeesters zig bij het afzetten der leden altijd bediend hebben. Schoon men doorgaans het kromme mes gebruikt, heeft de ondervinding mij nogthans geleerd, dat eene holle snede, gelijk die van het kromme mes, de spieren niet zo gemakkelijk en naauwkeurig doorsnijdt, als eene bolle snede. De holle snede, hoe wél dezelve geslepen is, kauwt, scheurt de deelen en snijdt alleenlijk, wanneer men de kringvormige snede doet, door dat men ze op de spieren drukt; wijl men met een krom mes niet wél de

beweeving van eene zaag kan namaaken, eene beweeging, welke onvermijdelijk noodzaaklijk is, om de spieren juist door te snijden. Maar met een bol mes maakt men de kringvormige snede met minder moeite en meer juistheid en zo, dat de lijder minder pijn gevoelt; en dit instrument kan men volkomen even als een zaag beweegen. Men herinnere zig hier bij het geen ik in het zesde hoofdstuk van het incisiemes met eene bolle snede gezegd heb (\*).

Als hij nu de kringvormige snede tot op de beenderen gemaakt heeft, snijd hij met het klein tweesnijdend mes den band tusfchen de beide beenderen door en omsnijd zo veel mogelijk het beenvlies rondom de beenderen, schraapt het naar de onderste deelen van het lid af, voltooit de operatie, zo als wij gezegd hebben, en legt het verband en den band aan.

(\*) Onder de nieuwlings opgegeeven amputatiemesfen verdienen inzonderheid de mesfen van POTT en DESAULT genoemd te worden. Dat van POTT is negen en een halven duim lang en naar onder toe anderhalven duim breed, van boven smaller en een weinig ingebogen. Zie BRAMBILLÆ *Instrum. chirurg. Viennense. Tab. LXI. fig. 8.* Maar het mes van DESAULT is twaalf en een halven duim lang en naar onder een duim breed, van boven loopt het spits toe en heeft te weër zijden eene snede; en dus kan het ook gebruikt worden om het vlies tusfchen twee beenderen, als bij voorbeeld tusfchen het ellebeen en den draaijer los te snijden. DESAULT volvoert het afzetten met dit mes in de helft van den tijd, welken een ander met een krom mes tot het verrigten van deze operatie nodig heeft. L.

## I I I.

*Van het afzetten des opperärms.*

**D**EZE verrigt men aan het onderste, middenste en bovenste gedeelte des opperärms, boven de inplanting der peezen van de driehoofdige armspier, en in zijn gewrigt met het schouderblad.

Volgens de manier, door de meeste schrijvers voorgesteld, om den opperarm in deszelfs bovenste en middenste deelen beneden de pees der driepuntige [*deltoides*] armspier afzetten, snijdende gemeenlijk met het kromme mes de spieren door, zijn de punten van de tweehoofdige spier en de einden der elleboogspieren, of der spieren, welken den arm uitspannen, niet in de zelfde strekking met de doorgezaagde beenderen, maar schijnen ze veel eer te verlaten, en ziger van te verwijderen en naar boven te loopen, het welk den stomp kegelvormig maakt en der geneezing hinderlijk is.

Om dit ongemak te vermijden, en den stomp eene platte oppervlakte te geeven, moet men de voorschriften volgen, die VALENTIJN (\*) ons gegeeven heeft. Men moet namelijk deze spieren niet doorsnijden, voor dat men aan den voor- en den opperarm eene behoorlijke houding ge-

(\*) *Recherches critiques sur la Chirurgie moderne.* 1772. Zie ook *Sammlung der auserlesenen und neusten Abhandlungen für Wundärtze.* 3tes Stück. S. 71.

geeven heeft, om de opperdeelen dezer spieren langer te maaken, op dat de vleeschige deelen na het afzetten zo lang en zelfs langer mogen zijn, dan het einde van het afgezaagd been, en dus hetzelfde kunnen omgeeven en als bedekken.

Ik heb door proeven aan verscheiden lijken, die nog warm en welker gewrigten nog zo buigzaam waren als in een levend lichaam, waargenomen, dat, wanneer men den voorarm naar den opperarm buigt, in dezen stand den opperarm naar vooren draait en den elleboog laat zakken, het lichaam van de tweehoofdige spier gespannen en naar haare bovenste inplantingen getrokken word; dat, wanneer men den voorarm uitstrekt en den opperarm dicht aantrekt, de vleeschige deelen, welken de spieren, die den voorarm uitspannen en zig met eene peesagtige uitbreiding aan den elleboog hegten, aangetrokken en om hoog geheven zijn. Ik heb deze proeven aan een sterk gespierd persoon herhaald, en er dezelfde gevolgen uit getrokken.

Volgens deze gemaakte waarneemingen laat ik den voorarm buigen, den opperarm naar vooren draaijen, den elleboog afhangen, en begin in dien stand met het mes met de bolle snede de tweehoofdige spier tot op het been door te snijden. Zo dra ik deze spieren doorgesneden heb, laat ik den voorarm uitstrekken en breng den geheel uitgestrekten opperarm in eene sterke spanning; in deze houding snijd ik de spieren door, welken den voorarm uitspannen en eindig mijne kringvormige snede op het been (f5)

(f5) [ Dit voorschrift, 't welk onze schrijver op het ge-



Doch, om de operatie voor den Heelmeester gemaklijker te maaken, op dat hij den helper het behoorlijk gemak zou kunnen verschaffen en den arm in deze verschillende houdingen brengen, moet hij deszelfs plaats van buiten tegen den arm neemen. Als hij het been doorgezaagd en de compres weggenomen heeft, die de spieren terug houd, strekken deze beide spierige deelen zig nog over het einde van het been uit, zo dat zij het been omvatten en bedekken; in plaats, dat volgens de gewoone manier, welke ik in een lijk volgde, om ze met deze te vergelijken, de eindē der vleeschige deelen van het einde des beens verwijderd zijn, om welke reden de stomp dan ook altijd kegelvormig word. De operatie duurt daarom ook niet langer; maar zij is even spoedig verrigt. De verandering van houding geschied, gelijk VALENTIJN zegt, in een oogenblik.

Men kan hier uit afneemen, dat, wanneer men de kringvormige snede op deze wijze maakt, het einde van het afgezaagde been zig als in de vleeschige deelen verbergt, zo dat de heeling zeer spoedig kan volgen en men in het geheel geen merklijke schilfering bescpeurt, voornaamlijk,

tuigenis van den heer VALENTIJN volgt, word door den heer PORTAL tegengesproken; en welke juist het tegengestelde, de ontspanning naamlijk, aanbeveelt. Zie *Histoires de l'Academie des Sciences de Paris, année 1773*. Deze schrijver vooronderstelt, dat de spieren in eene uitrekking veel meer na de afzetting zullen intrekken en verkorten, dan dezelve doen, wanneer zij ten tijde eener ontspanning worden doorgesneden. — Eene aanmerking, welke onzes bedunkens door oefenende Heelmeesters wel verdient in overweeging genomen te worden.]

wanneer het beenvlies niet door de tanden der zaag gescheurd is, en de stomp zal dan ook eene platte oppervlakte hebben.

Maar men moet, gelijk LOUIS voorschrijft (\*), het beenvlies op het nauwkeurigste rondom de beenderen en zo na mogelijk aan de vleeschige deelen afsnijden, voor dat men het naar onder schraapt, het welk veeleer bij den opperarm en bij de dije dan bij den voorarm en de scheenbeenen kan geschieden. Bij het afzetten, waar van wij hier spreken, legt men het tourniquet zo hoog aan als mogelijk is, op dat het den lijder niet moeilijk valle en geheel onbelemmerd op de slagaders zou kunnen werken; de spieren zelve vat men met twee banden zamen en maakt tuschen dezelve de kringvormige snede.

Als men genoodzaakt is, de afzetting aan de bovendeelen van den opperarm boven de inplanting der driepuntige armspier te doen, moet men de afzetting met de vleeschlappen eveneens in het werk stellen, als of men den opperarm uit zijn gewrigt met het schouderblad wilde neemen.

Hier volgt de manier van DE LA FAIJE, om den opperarm uit de geleding met het schouderblad af te zetten, zo als hij ons dezelve heeft mede gedeeld.

„ Na dat de opperarm in de behoorlijke houding geplaatst; dat is, zo veel mogelijk aan de borst gebragt is, ten einde de driepuntige spier van den arm zig uitspanne en verlange, maak ik”, zegt DE LA FAIJE, „ met een regt

(\*) *Memoires de l'acad. roy. de Chirurgie. Tom. II. p. 272.*

„ en gewoon incisiemes op den afstand van drie  
 „ of vier vinger breed van de opperste deelen  
 „ des schouderblads eene incisie in de dwarste,  
 „ waar door ik de driepuntige spier tot op de  
 „ beenderen scheide. Hier op maak ik er nog  
 „ twee of drie in de lengte, de eene voor-  
 „ waard, de andere agterwaard, en wel zo,  
 „ dat zij loodregt op de eerste vallen en met  
 „ deze eene soort van lap vormen, onder den  
 „ welken ik, na dat ik den zelven afgescheiden  
 „ heb, het incisiemes breng om de beide hoof-  
 „ den der tweehoofdige spier en den beurs-  
 „ band [*ligamentum capsulare*] van het ge-  
 „ wrigt door te snijden. Daar na kan ik met  
 „ weinig moeite het hoofd van het been naar mij  
 „ haalen en door middel van het incisiemes, waar  
 „ mede ik van beide zijden insnijde, en het welk  
 „ ik tuschen de beenderen en de spieren breng,  
 „ welken onder de okzels zijn en de vaten be-  
 „ vatten, afscheiden. Terwijl ik dit doe, rigt  
 „ ik de snede van het instrument naar het been  
 „ toe, onderschep de vaten zo dicht mogelijk on-  
 „ der den okzel, en neem den opperarm weg,  
 „ de spieren een vinger breed onder den band  
 „ doorsnijdende. Ik maak als dan den lap klei-  
 „ ner, ten einde hij volkomen op het deel passe  
 „ en de geheele vlakke pan van het schouderblad  
 „ bedekke, zo dat er slegts eene kleine halve kring-  
 „ vormige wond overblijft. Ten laatsten laat  
 „ ik ook nog de einden van den band, die ter  
 „ onderschepping gediend heeft, door het on-  
 „ derste gedeelte der wond uithangen (g5).

(g5) [ Eenigen onderscheppen, alvorens zij de incisie



Onder al de wijzen, om den arm uit zijn gewrigt af te zetten, is er geen gemaklijker om uitvoeren, dan die van DE LA FAIJE; zij heeft

we

doen, de bloedvaten onder den oksel; en sluiten in deze onderschepping tevens een gedeelte der huid en spieren in. — PLATNER beschrijft deze manier zeer klaar, daar hij zegt: „men heeft een zeer groote en zeer kromme „naald, met een sterken, drie of vier dubbelden, gewasch- „ten draad, of sterk bandje, voorzien. Met deeze steekt „men, onder den arm, de huid en alle spieren, van de „eene zijde tot de andere, zodanig door, dat de naald digt „langs het been heen gaat, en dus alle de groote vaten, „die onder den oksel naar den arm toelopen, zonder „dezelve te kwetzen, onderschept worden. Alle deeze „vaten bindt men vervolgens, nevens het vleesch, te gelijk, met den draad, zodanig, dat in den geheelen arm en deszelfs nog levende deelen, nergens eenige klopping „der slagaderen meer bespeurd worde.” Na dat de arm is weggenomen, „als dan worden de slagaderen, en de- „ze lappen, van de andere deelen afgezonderd, met kleine naalden en draaden onderschept en toegebonden; „waar op men de spieren en huid, benevens de voorheen „aangelegde draaden, afsnijdt, bedekkende met het overblijvende de schouderpan of holligheid des schouderblads.” Zie zijne *handl. tot de Chirurgie* I. D. bl. 212. en 213. — Van dit gevoelen zijn ook de heeren GARENGEOT en HEISTER. Zie HEISTER's *Heelkundige onderwijzingen*. D. II. bladz. 594.

LE DRAN egter, en veelen met hem, keurt deze voorzigtigheid af, als te pijnlijk en omslagtig zijnde: en doet de onderschepping niet voor dat de arm is weggenomen. Zie zijne *Oper. der Heelkonst*, bladz. 416. en 417.

ULHOORN heeft, om in dit geval het gevaar der bloeding te ontwijken, een bijzonder soort van *tourniquet* voorgesteld, 't welk waarlijk meer in de kragt eener verbeelding, dan in een wezenlijk nut te kunnen toebrengen, bestaat. Zie zijne *aant. op L. HEISTER, Heelk. onderw.* D. II. bl. 593. I. B.]



wezenlijke voordeelen, welken deze Heelmeester ook opgeeft, maar ik zou bij deze afzetting het incisiemes met de bolle snede, waar van ik gesproken heb, boven het gewoone regte verkiezen.

Als men nu den lap, welken de driepuntige armspier vormt, teruggeslagen en tot ondersteuning van denzelven eene compres aangelegd heeft, onderzoekt men nauwkeurig, of de ziekte, welke ons deed besluiten tot de operatie, in het been zelve eindigt en of de beursband en het hoofd des beens niet tevens beledigd zijn, gelijk zulks plaats kan hebben, wanneer een schoot het been op deze plaats getroffen heeft, zonder den beursband of het hoofd des beens te beschadigen, e. z. v. In dit geval trekt men het opperarmsbeen, het welk niet meer aan het tegenoverstaande been hangt, vast naar zig en doet hier de operatie van het afzetten, als of men ze in het gewrigt doet, doch draagt zorg, den beursband of de spieren, die zig rondom het hoofd des beens tot aan deszelfs hals hegten, met de snede van het incisiemes niet te raaken. Als men de vaten onderschept heeft volgens het voorschrift van DE LA FAIJE, en het beenvlies, het welk het einde van het been omgeeft en in dit geval zig dikwijls met punten en ongelijkheden, die de deelen zouden kunnen beledigen, eindigt, opgesneden en afgeschaafd heeft, zo moet men het einde van het been doorzaagen. Doch, om dit met gemak te kunnen doorzaagen, rust men het op eene verheven stelling of schraag, want het is niet mogelijk, gelijk LOUIS dit aanmerkt, het zonder de zelve door te zaagen. Verders moet men de

wond met eene fijne spons of met linnen, in laauwen wijngeest gedoopt, uitwaschen, om de schilfers of het zaagzel, dat op de spieren valt, af te neemen; op de wond zelve legt men dan den lap, welken de driepuntige spier vormt, bedekt het geheel met eene genoegzaame hoeveelheid geschaafd plukzel, waar op men sijn plukzel legt en hier over eindelijk compresen en een bekwaam verband (*b5*).

Er zijn gevallen, (\*) waarin men verplicht is, de afzetting boven de inplanting van de pees der driepuntige armspier te doen, schoon het been daar niet gebrooken is. In dit geval moet men de slagader digt bij den okzel zoeken, en zo dra men dezelve gevonden heeft, zo digt mogelijk bij het been eene kromme naald door brengen, zo als PETIT dit beschrijft, de slagader met den draad omvatten en onderscheppen; als men de onderschepping gemaakt heeft, snijdt men me

(*b5*) [Dit afzetten met den lap is in de voorige Eeuw allereerst gebezigd; men vind van hetzelfde melding gemaakt door den heer JOUNG, in zijn werkje genaamd *Cur-rus triumphalis e terebinto*, Lond. 1679. — Kort daar na heeft de Amsterdamsche Heelmeester VERDUIN, zie zijne *Briefsgewijze verhandeling*, Amst. 1696. zig als uitvinder hier van opgedaan. Vervolgens is deze wijze door de heeren RAVATON en VERMALE, (zie LE DRAN, *oper. der Heel-konst*, bladz. 411. en 413.) veranderd en verbeterd; en vooral tot het afzetten van het scheen- en kuitbeen aangeprezen. Dan deze wijze van afzetting, schoon thans nog door éénigen staande gehouden, is om haare onvolkomenheden bijna geheel verbannen. Men zie over het een en ander SHARP, *oordeelkundige Aanmerkingen*, Hoofdsf. XXXVII. als ook GARENGEOT, *operations de Chirurgie*. Tom. III. pag. 413.]

(\*) HALLERI *Disertationes chirurgicae*. Tom. V. p. 221.

het incisiemes met de bolle snede de driepuntige spier boven haare pees door, maakt de beide incisiën ter zijde, zo als DE LA FAIJE die aanbeveelt, slaat den lap met eene compres te rug en maakt met het instrument de kringvormige snede zo, dat men de spieren een duim breed beneden de onderschepping doorsnijdt; hier op legt men de gespleeten compres aan, om de spieren te rug te houden, legt het deel op de schraag en zaagt het door. Den arm afgenomen hebbende, legt men den lap, die van de driepuntige armspier overgebleven is, op de wond, vult dezelve met geschaafd zagt plukzel op en legt er compresen en een bekwaam verband over heen.

Doch, niet tegenstaande de hier gegeven beschrijving der handgreepen in deze operatie, moet de handelwijze door ons beschreven, veranderd worden naar den aart en de kentekens der ziekte, welken tot de operatie aanleiding geeven en naar de onderscheiden toevallen, die dezelve kunnen verzellen en naar oneindig veele omstandigheden, welken dezelve meer of min verward maken.

Zo zijn bij voorbeeld de omstandigheden verschillende, welken ons tot het afzetten bepaalen en ons verplichten, den arm in het gewrigt afzetten of het been onder deszelfs hoofd afzaagen.

DE LA FAIJE, wien ik mijn handschrift mededeelde, voor dat het ter drukpers ging, zegt bij die gelegenheid in zijnen brief: „ik weet niet, „wat men daar bij wint, wanneer men een klein „eind van het been afzaagt en het hoofd van „den opperarm in het gewrigt laat blijven. Zal

„ de lijder dus doende minder pijn daar aan heb-  
 „ ben? of zal de heeling dan spoediger geluk-  
 „ ken? of dient dit terug gebleeven hoofd nog  
 „ tot iets?

Doch het geen men er bij wint, wanneer men het einde van het been afzaagt en het hoofd van den opperarm in het gewricht laat, bestaat daar in, dat men bij deze afzetting niet zo veele deelen doorsnijdt, als wanneer men het hoofd des beens uit het gewricht los schilt en *hoe meer men doorsnijdt, hoe meer deelen men in eene operatie scheid, des te grooter zijn de gevolgen daar van.* Volgens deze grondstellingen, welken door de dagelijksche ondervinding bevestigd worden, is het eene zekere zaak, dat de afzetting onder het hoofd des opperarms van zo veele toevallen niet verzeld is, als die, welke men in het gewricht onderneemt. Men zal hier van te meer overtuigd worden, wanneer men in aanmerking neemt, dat men in de afzetting onder het gewricht met het snijdend instrument de kleine ronde spier, de bovenste schouderbladspier, de onderste schouderbladspier en de spier onder het schouderblad liggende, welken met de capsula van het gewricht vereenigd zijn ter plaatze, daar de inplantingen der spieren van het hoofd des beens zijn, welke eene spieragtige capsula vormen, die met de eerste vereenigd is en het geheele hoofd van het been des opperarms omvat, doorsnijdt; zo verschoont men den lijder van de pijn, die met deze snede onvermijdelijk gepaard gaat, en van de toevallen, die er op volgen. Wij staan toe, dat het terug gebleeven stuk van het hoofd tot niets kan dienen, maar, wat nadeel kan het ook toebre-



gen? Waarom zal men hetzelfde, zonder noodzaak, wegneemen, te meer, daar het van gevolgen kan zijn, welken men kan vermijden, wanneer men de gezonde deelen spaart en de incisie beneden het hoofd van het been doet,

Menig een zal mischien van gevoelen zijn, dat het gevolg van de afzetting uit het gewricht, het welk zo veele Heelmeesters hebben onderhouden, mij omtrent de gevolgen, welken ik van deze operatie vrees, zou kunnen gerust stellen; doch het is genoeg, dat men deze gevolgen te vreezen heeft, en ik zie daar en boven geen noodzaaklijkheid om deze operatie te doen, wanneer noch het hoofd van het been, noch de capsula beledigd zijn, waar door wij tot het wegneemen van dit stuk zouden moeten besluiten.

De heer DE LA FAIJE verzekert mij in den zelfden brief, dat men de afzetting uit het gewricht volgens zijne manier zeer dikwijls in het leger met het gelukkigste gevolg gedaan heeft, en dat hij in de wijze van dezelve te doen, zedert dat hij de verhandeling in druk heeft gegeven, niets veranderd of er bijgevoegd heeft (\*).

(\*) In deze operatie stelt men het bloed door bijzondere hier toe uitgevonden tourniquets, waar van er een door DAHL, (zie *Platneri Suppl. Tab. III. & IV.*) een ander door den heer MOURENHEIM (zie *Beobachtungen verschiedener chirurgischer vorfälle. Wien. I. Band 1780. 8<sup>o</sup>. Tab. I. Fig. VI. VII.* uitgevonden is; of, gelijk BROMFELD, enkel door de drukking van den vinger. Het laatst middel verkies ik altijd boven de beide eersten. L.

## I V.

*Van het afzetten van het been.*

**H**ET is een voornaame regel bij het afzetten van het been, de operatie onder de verhevenheid van het scheenbeen te doen, om de peezen der spieren niet te raaken, die het been naar de dije buigen.

Om de bloedvloeijing onder de operatie te kunnen bedwingen, legt men op het middenste gedeelte van het dijebeen, daar de slagader voorbij loopt, eene trapswijze compres aan, welke men door middel van eene tweede, die men rondom het geheele been slaat, verzekert, en hier legt men het tourniquet aan, het welk aan eenen bekwaamen helper word toevertrouwd.

Alle de Heelmeesters willen, dat men de operatie zó zal doen, dat de huid, voornaamlijk die, welke de knie en het voorste gedeelte van het been bedekt, lang genoeg blijve, om het einde van het been na het afzetten te bedekken, en de vorming van het lidteken te bevorderen.

Hier toe slaan PAREUS en GUILLEMEAU voor, het lid te buigen en de kringvormige snede te maaken. Doch andere Heelmeesters hebben deze gevoeglijke houding weer verworpen, wijl het zo gemaklijk niet is, een kringvormige snede met het kromme mes te maaken, waar van men zig bij deze operatie bediende, als wanneer men

het lid uitstrekt en in evenwigt houd. „ Deze  
 „ houding „, zegt LOUIS, (\*) „ heeft oogen-  
 „ schijnlijke bezwaarlijkheden; want na de ope-  
 „ ratie laat men de dije en den stomp buigen en  
 „ door deze bewegingen word de huid om hoog  
 „ getrokken en laat noodwendiglijk het einde van  
 „ het been ontbloot. ”

Om te verhoeden, dat de huid om hoog trekt  
 en het einde van het been na het afzetten ont-  
 bloot, moet men den raad van PAREUS en GUIL-  
 LEMEAU volgen, en de huid, welke het voorste  
 gedeelte van het been bedekt, doorsnijden als  
 het been gebogen is, zonder zijne toevlugt tot de  
 leêschroef of de bank van F. VAN HILDEN of het  
 instrument van HIPPOCRATES te neemen. Men  
 kan deze incisie zeer gemaklijk doen met het  
 mes met de bolle snede (Pl. III. fig. 4.)

De lijder plaatst zig op eenen stoel, die van  
 eene behoorlijke hoogte moet zijn, of op den  
 kant van het bed, en zet den gezonden voet op  
 den grond, welke, nevens het been en de dije  
 met linnen bedekt en omwonden moet zijn. Het  
 beledigt been moet door de helpers gehouden en  
 ondersteund worden; een van dezelve moet het  
 been, de andere de dije houden; die het been  
 houd, moet het een weinig naar de dije buigen  
 en onder het opligten van de knie tevens de dije  
 een weinig naar het bekken opligten. De deelen  
 in dezen stand gebragt zijnde, omvat de helper,  
 die de dije houd, met beide handen het bovenste  
 gedeelte van het been en trekt de huid naar de

(\*) *Memoires de l'Acad. roy. de Chirurgie, Tom. II. p.*  
 374.

knie toe. De Heelmeester, die de operatie doet en tusfchen de beenen naar binnen ftaat, legt boven en vervolgens onder eenen band aan om de fpieren vast te houden, latende tusfchen beide eene ruimte van omtrent twee vinger breed.

Ik stel het geval, dat men het regte been moet afzetten, zo moet de Heelmeester de regte hand tusfchen de dije en het beledigd been doorbrengen; een helper geeft hem het mes in de hand: het mes gevat hebbende, buigt hij het gewrigt der hand om, zet het onderfte eind van het mes aan den inwendigen hoek van het fcheenbeen en fnijd in eens de huid en het vleesch tot over het kuitbeen door. Zo dra deze snede gedaan is, ftrekken de helpers, welke het lid vasthouden, het zelve uit en houden het in evenwigt. In dezen ftand zet de Heelmeester het einde van het mes aan het kuitbeen, daar hij de eerste snede geëindigd heeft, en volbrengt in eens de kringvormige snede.

Als het linke been afgezet moet worden, bedient hij zig van de linke hand en verrigt daar mede het geen hij met de regte zou gedaan hebben, om het regte been af te zetten. Doch, zo hij met beide handen niet wél kan opereeren en dat hij der linke hand niet magtig is, drukt hij met de regte hand de punt van het mes tegen den inwendigen hoek van het fcheenbeen, trekt het mes met eene beweging even als van eene zaag naar vooren en fnijd in eens de huid en de fpieren tot over het kuitbeen door. Zo dra deze snede gedaan is, brengen de helpers het been in den evenwigtigen ftand; aldan brengt de Heelmeester het mes onder het been door, buigt het



gewrigt van de hand éen weinig terug, zet het einde van het mes aan het kuitbeen, daar hij de eerste snede geëindigd heeft, en volvoert de kringvormige snede, door het mes van deszelfs einde tot aan de punt als eene zaag te bewee-  
gen.

De beide wijzen om de kringvormige snede te maaken, zijn omtrent dezelfden, of men het rechte of het linke been afzet. Het komt allcen op den Heelmeester aan, om die te verkiezen, welke hij het gemakkelijkst kan verrigten. Met dit mes snijdt men de huid en de spieren nauwkeurig door, het welk men met het kromme mes niet kan doen, gelijk ik reeds boven §. II. gezegd heb, wijl naamlijk alle gelijke vlakten beter door eene bolle dan door eene holle snede doorgesneden worden, en wijl men der eerste de beweging van eene zaag kan geeven, het welk ten aanzien van een krom mes niet wel kan plaats hebben. Daarenboven, door déze wijze van de kringvormige snede te maaken, bedekt de huid het einde van het afgezaagde been na het afzetten, het welk, gelijk wij reeds aangemerkt hebben, het vormen van het lidteken zeer bevordert. Hier door worden de incisien op twee onderscheiden tijden, welken PETIT voorstelt, en die, welke men in derzelver plaats gesteld heeft, en volgens welke men de huid van den inwendigen hoek des scheenbeens tot boven het kuitbeen maakt, voor nuttelocs verklaart.

Na deze kringvormige incisie snijdt de Heelmeester met het klein tweefnijdend mes den band tusfchen de beenderen en de spieren, welken over en tusfchen de beenderen zijn, door nijd zo

veel als mogelijk is met de punt van dit instrument in het beenvlies, scheid het van deszelfs vereeniging af en schrabt het naar onder toe, ten einde te kunnen zaagen zonder hetzelfde te scheuren. Als hij de beenderen afgeschrabt heeft, legt hij eene gekloofde compres aan, die hij den helper overgeeft, welke de knie vast houdt, bind de beenderen met eenen regten band zamen en laat de hoofden daar van houden door den helper, die het been aanvat, legt de beenderen op de schraag of stelling en zaagt ze door, beginnende met den eersten trek het scheenbeen doortezaa-gen, alsdan het kuitbeen en eindelijk het overige van het scheenbeen.

Als het lid nu weggenomen is, laat hij het tourniquet een weinig los om de monden der groote slagaders te onderzoeken en onderschept ze volgens de voorschreven regelen in §. II. (15.)

De vaten onderschept zijnde, legt hij eene genoegzaame hoeveelheid geschaafd plukzel op

(15) [Het is bijna een algemeen voorschrift der meeste Heelkundigen, zo dra het been is weggenomen, het tourniquet een weinig los te draaijen, om langs dien weg de voornaamste afgesneden slagaderen te ontdekken en vervolgens te binden. — Dit egter laat zig vrij gemaklijker zeggen dan doen. Wij merken, insgelijks, met den heer GESSCHER, aan, dat zo dra het tourniquet los raakt, het bloed met een zodanig geweld uit alle de afgesneden rakjes vloeit, dat het bijna onmogelijk is, de juiste plaats der vaten, welke men binden wil, te erkennen. — Wij raaden derhalven, met den heer GESSCHER, alle voorzigtige Heelmeesters, welke deze operatie onderneemen willen, aan, zig alvorens de juiste plaats dezer bloedvaten door de ontledkunde eigen te maaken.]

den stomp en daar over weêr ruuw plukzel, om op die wijze een kussen te vormen, het welk eene zachte, weeke en gelijke drukking op al de punten van den omtrek des stomps maakt en de holligheden en ongelijkheden kan opvullen. Hier op legt hij de compresen en den vereenigenden band aan, wêl agt gevende, dien niet te sterk zamen te trekken, ten einde de toevallen te vermijden, die daar uit zouden kunnen ontstaan. Ook laat hij de helpers de hand tegen het einde van den verbonden stomp houden, om eene zachte drukking te maaken. De helpers, die elkan- der aflossen, moeten met deze zachte drukking tien of twaalf uren aanhouden.

## V.

*Van het afzetten der dije.*

ONDER al de afzettingen is er geen, daar het uitteeken van het been gewoonlijker is, dan bij het afzetten van het dijebeen. De Heelmeesters hebben om die reden ook gepoogd, de oorzaaken daar van te ontdekken en de middelen uittedenken, om die te vermijden. De oorzaaken daar van zijn ook genoeg bekend, maar onder alle de middelen, om dezelve te ontwijken, door de schrijvers voorgesteld, weet ik er, naar mijn oordeel, geen beteren, dan die, welken de heer VALENTIJN onlangs voorgeslagen heeft (\*).

(\*) *Recherches critiques sur la chirurgie moderne.* p. 136. en *Samml. der auserl. Abhandl. für Wundärtze.* 3tes Stück, S. 711.

„ De volgende aanmerkingen „, zegt VALEN-  
 TIJN, „ welken ik gemaakt heb over de veran-  
 „ deringen, die de spieren ondergaan in de ver-  
 „ schillende bewegingen, waarin zij de deelen,  
 „ aan dewelken zij vast zijn, verplaatzen, en  
 „ de ontdekkingen van de werkingen dezer werk-  
 „ tuigen hebben mij eindelijk overtuigd, dat  
 „ men het uitsteeken van het been niet anders  
 „ kan vermijden, dan door de onderscheiden  
 „ spieren, die het lid omgeeven, dat afgezet zal  
 „ worden, in de sterkste uitspanning door te snij-  
 „ den (k5). Om dit in een helderder licht te stel-  
 „ len, zal ik het op de afzetting van de dij-  
 „ toepassen, als de geene, waar bij het uitste-  
 „ ken van het been telkens voorkomt en in de  
 „ daad het allermoeilijkst te vermijden is.

„ De spieren in het algemeen, welken het  
 „ meest toebrengen, om den stomp eene kegel-  
 „ vormige gedaante te geeven en zeer ligt van  
 „ het einde des beens afwijken, zijn de zulken,  
 „ welker implantingen het verste van het gewricht  
 „ en het middenpunt der beweging des beens  
 „ zijn, dat zij beweegen; dezen zijn aan de  
 „ dije de tweehoofdige spier, van dewelke het  
 „ eene hoofd aan het agterste en bovenste deel  
 „ der uitsteeking van het zitbeen vast is; de  
 „ halfpeeszige, de halfspierige, de regte en de  
 „ snijderspier. Men heeft gemeend, tegen het  
 „ terug trekken der spieren de kruishegting, de  
 „ languetten van kleefplaaster en de ringbanden  
 „ te moeten gebruiken. Maar men ziet klaar,  
 „ hoe belachlijk en gevaarlijk het is, zijne toe-

(k5) [ Men zie hier over het geen op bl. 300. (f5) ge-  
 zegd is. ]



„ vlugt tot dergelijke middelen te neemen, om  
 „ de doorgesneden spieren uitgespannen te houden.  
 „ Het wezenlijke in dit geval is, eene wijze  
 „ te bedenken, om de spieren zo te deelen, dat  
 „ zij langer zijn, dan de beenderen, en de spie-  
 „ ren behouden, welken aan de as van het  
 „ been vast zijn of in dezelfde strekking loopen.  
 „ Dit onwaardeerbaar voordeel is gegrond op  
 „ het voorschrift, dat ik gegeven heb, en door  
 „ dit eenvoudig middel vind men de huid en de  
 „ spieren, welken volgens de gemeene manier  
 „ zig meer schijnen zamen te trekken, in de daad  
 „ meer verlengd; men neemt veel minder van  
 „ derzelver zelfstandigheid weg, wijl men ze in  
 „ haare sterkste uitspanning doorsnijdt. Deze  
 „ manier bewijst ook verder, hoe nutteloos de  
 „ afzetting op twee onderscheidentijden is. Daar-  
 „ enboven is deze wijze van afzetten ook zeer  
 „ gemakkelijk uittevoeren, want men behoeft  
 „ de houding van het lid maar eens geduren-  
 „ de de kringvormige snede te veranderen. ”(15).

(15) [Wij merken hier bij aan, dat het, om aan een  
 en ander oogmerk te voldoen, zeer nodig is, het verband  
 zodanig aan te leggen, dat het van boven naar onderen,  
 dat is, van de heup, bij voorbeeld, naar de knie, zijne  
 strekking heeft. Hier door belet men, voor eerst, den te  
 grooten en vrijen invloed van bloed naar den stomp van het  
 afgezette deel; en, ten anderen, kunnen de spieren en de  
 huid zo veel niet optrekken, om dat dezelve geene ruimte  
 voor haare uitzetting vinden, waar uit dan volgt, dat  
 de stomp des beens minder ontbloot zal worden.

Wanneer noghans, niet tegenstaande alle onze pogin-  
 gen, de stomp van eenig been merklijk buiten het opper-  
 vlak der spieren uitsteekt, zo zal men verplicht zijn, wil  
 men den Lijder aan geene verdrietige en langwijlige genee-

Volgens het voorschrift van de verandering , welke de spieren in de onderscheiden beweegingen der deelen , aan dewelken zij vast zijn , ondergaan , en volgens de zamenstelling dezer werktuigen , heb ik proeven genomen aan de dije van verscheiden lijken , omtrent op de wijze als ik die in de derde afdeeling beschreeven heb ; ik heb dezelfde werkingen waargenomen en meen volgens deze ondervindingen te mogen oordeelen , dat de beste en gemakkelijkste manier , om de spieren , na de snede , eene aanmerkelijke lengte te doen houden , zo dat zij van het einde des beens niet afwijken , maar het om zo te spreken als bedekken , die is , welke ik hier ga voorstellen.

Als men den lijder de behoorlijke houding gegeven , en de helpers omtrent op dezelfde wijze geplaatst heeft , als bij het afzetten van het been , vervolgens het tourniquet zo hoog , als mogelijk is , aangelegd , de huid der dije behoorlijk om hoog getrokken en met eenen band genoegzaam verzekerd , en eenen dergelijken band twee vinger breed onder dezen aangelegd heeft , om de spieren vast aan elkander te drukken , plaatst de Heelmeester zig aan de buitenzijde der dije , die hij wil afzetten , zo dat hem niets hindert , en maakt de kringvormige snede met het mes met de bolle snede.

zing bloot stellen , dit uitsteekende stuk op nieuw weg te neemen. — De Ouden verkozen hier toe hunne nijptangen enz. Doch wij vinden , met andere geëfende Heelmeesters , het gebruik der zaagen hier toe merklijk beter. ]

Ik laat den lijder op eene tot het steensnijden geschikte tafel, of, als men die niet kan krijgen, op een ledikant, of op den kant van het bed leggen, latende het gezonde been op den grond hangen en tot aan de heup bedekken en omwinden, en den lijder door de helpers vasthouden: de Heelmeester, die de operatie zal doen, plaatst zig, gelijk ik reeds gezegd heb, aan de buitenzijde der dije, welke hij wil afzetten, laat het lid door de helpers, die het vast houden, uitrekken; en als het geheel uitgerekt is, agterwaard buigen en zo veel mogelijk naar beneden neigen; in deze houding brengt hij de dije in de sterkste afwijking; door deze houding word het lichaam der regte voorste spier en der spieren, welken aan de binnenvlakte der dije liggen, uitgespannen en om hoog naar derzelver inplantingspunten getrokken. Nu begint hij in deze houding de spieren aan de binnenzijde der dije en tevens de voorste regte spier en dijespier door te snijden. Oogenblikkelijk daarop ligten de helpers het lid op, buigen het been en de dije naar het bekken toe en brengen het in de sterkste afwijking. In deze houding snijdt hij de spieren aan de agter- en buitenzijde der dije door en eindigt zijne kringvormige snede tot op het been. De verwisfeling der houding kan in een oogenblik geschieden; het schijnt schier, als of de Heelmeester niet ophield met snijden.

Ik heb deze manier aan verscheiden lijken beproefd, welken nog warm en derzelver gewrigten zo buigzaam waren als in levende lichaamen; zij heeft alle voordeelen der kringvormige snede, welke wij in de derde afdeeling bij het afzetten

van den opperarm aan de middenste en onderste deelen beschreven hebben. Ik had dezelve aan de jonge Heelkundigen en aan verscheiden van mijne amptgenooten laten zien en hun getoond, hoe het einde van het rolvormige been, als ik de spieren in derzelver verschillende houdingen doorsneed, zig na de afzetting verdiept en van alle zijden door vleeschdeelen omgeeven bevond; in plaats, dat volgens de gemeene manier, welke ik met deze vergeleek, deze even verre daar van verwijderd waren.

Als men nu de kringvormige snede gemaakt heeft, voleindigt men de operatie volgens de overige voorschriften, van dewelken ik bij het afzetten van den arm en het been gesproken heb, men zaagt namelijk het been op de schraag door, onderschept de vaten e. z. v. (m5).

Deze

(m5) [ „ Wanneer de slomp dik is, ” zegt SHARP, „ valt het zomtijds voor, dat er *tien* of *meer* vaten toege-, „ bonden moeten worden e. z. v. — Dan, wij betuigen, behoudens de agting van dezen beroemden Heelmeester, dat dit ons te omslagtig voorkomt; en wij zijn door onder- vinding bevestigd, dat wanneer *twee* of op zijn hoogst *drie* der voornaamste takken gebonden zijn, de overige bloed- vlied door het verband, met behulp eener zachte drukking, kan tegen gehouden worden. — Waar toe dan deze verbazende en langwijlige omslag? — Het oogmerk immers van een oefenend Heelmeester moet zodanig zijn, dat het, behoudens de zekerheid der uitvoering, tot gemak en veiligheid zijner Lijderen zig uitstrekke?

En, niet tegenstaande wij de toebinding, in deze gevallen, als het kragtdadigst middel voor de bloedstorting aanzien; zo kunnen er zig egter gevallen opdoen, dat men van het zelve geen gebruik, ten minsten niet dat genoeg is, maaken kan. — In zo een geval raaden wij



„ Deze wijze van opereeren ’, zegt VALENTIJN, bladz. 139.; „ is van de gewoone zo zeer verschuldende, dat de spieren, welker einden gemeenlijk „ door de grondvlakte des Kegels worden gevormd „ zig hier aan de punt bevinden. Zeifs de algemeene bekleedzelen blijven bij deze wijze van ze te „ ichelden langer, dan wanneer men naar de manier van PETIT opereert.”

Als men het afzetten boven de middenste deelen der dije onderneemt, verhindert het boven aangelagte tourniquet den heelmeeſter, die de operatie doet. Om dit te vermijden en met meer gemak te opereeren, legt men het kussen van het tourniquet van PETIT boven den dijeboog aan en verzekert door middel van eenen gordel, die even als een breukband met eene gesp voorzien is, dit kussen zo, dat het juist op de dijeflagader treft, welke hier onder den falloopiaanſchen band doorloopt, en drukt de ſlagader, door de ſchroef eenige reizen om te draaijen, behoorlijk zamen, om het uitvloeijen van het bloed geduurende de operatie te beletten. Het been, welk onmiddellijk onder deze ſlagader ligt, dient tot eene tegendrukking van het kussen. De heer DE LA FAIJE heeft mij een tour.

aan, gebruik te maaken van de eiken zyam, zijnde door de heer BROSSARD, allereerst, met goed gevolg, hier toe gebezigd; en beſchreven in de *Memoires de l'academie de Chirurgie*, tom. III. pag. 4. — of wel van de ſijne zagte ſpons, waar van de heer WHITE, *An Account of the topical applicatiens of the sponge*, &c. Lond. : 762. ſpreekt, van welke laaſte deze beroemde Heelmeeſter zegt: dat dezelve hem, op meer dan vijftig perſoonen gebruikt, altoos wel, zonder eenige hechting of toebinding te gebruiken, gelukt was, uitgezonderd twee gevallen, in welke hij verplicht was, de orderſchepping te verrigten. Men zie over het een en ander de aant. op de handl. tot de *Chir.* van den heer J. Z. PLATNER; D. I bl. 201 (\*).]

niquet vereerd, het welk de heer MORAND verbeterd heeft; dit tourniquet heeft eene dubbele schroef en is van eenen gordel voorzien, welken men op den dijeboog aanlegt, om de bloedstorting bij het afzetten van de dije boven het middenste deel behoorlijk te beletten. In het zelfde geval is het den heer LOUIS volkomen wél gelukt, het bloedvloeijen geduurende de operatie te beletten door de slagader ter plaatze, daar zij onder den boog door loopt, door eenen bekwaamen helper, na dat hij er eene dikke compres op gelegd had, te laten zamendrukken en er den vinger vast op houden.

LOUIS (\*) geeft ook eenen goeden raad, om te beletten, dat de stomp niet in eene spitze punt eindigt. „Men let niet genoeg”, zegt hij, „op den stand des stomps, wanneer men het verband vernietigt. „Om de punt van den stomp te verheffen en de wond des te gemaklijker te verbinden, buigt men de dije om hoog. Maar, hoe meer men met de geneezing voordspoed, hoe minder men daar op let, en ik heb veele gewonden gezien, welken, als zij zig buiten alle gevaar oordeelden, moeilijk zouden zijn geworden, wanneer men hun niet toegelaaten had, hunne dije in eenen regthoek met het lichaam te brengen en ze loodregt in de hoogte beweegen. „Doch bij deze buiging schijnt het einde van het been uittelsteeken en het verheft zig ook in de daad boven de horizontaallijn der spieren. Dit is derhalven eene geheel strijdige beweging, welke men volstrekt moet verbieden. Maar de Heelmeester kan, in plaats van de dije te laten buigen, het verband veel gemaklijker maaken, als hij den lijder

(\*) *Mémoires de l'Acad. roy. de Chirurgie, Vol. IV.*

, door eenen ondergelegden doek op beide zijden laat  
 „ opligten en onder de lenden en den aars eene kleine  
 „ vaste en dikke matras of een lederen kussen legt,  
 „ dat te deeg met hair opgevuld is.”

Na dat ik de afzetting volgens de manier van den heer VALENTIJN in mijne openbaare lessen gedaan had, heb ik aangetoond, dat, wanneer men den stomp om hoog ligt en in eene loodregte lijn legt, de spieren aan de agterzijde van de dije van het einde des beens afweeken en het niet meer van die zijde omgaven. Dit toont de gegrondheid der waarneeming van den heer LOUIS duidelijk aan.

Het misbruik van zalven en digestiven, welken men bij het verband der wond na het afzetten gebruikt, vertraagt de geneezing. Als de verettering reeds begonnen is, behoeft men zulke wonden alleen met droog plukzel te verbinden (\*).

Wij laten het aan de akademie der Heelneesteren over om de beste handgreepen bij het afzetten der dije uit het gewrigt bekend te maaken, en zullen derhalven hier niets in het bijzonder daar van zeggen (\*\*). Ondertuschen, wanneer er rondom de onderste vlakke van de holte des gewrigts eene drooge versterving plaats had, welke de spieren, die dit gewrigt omgeeven, verteerd had en er leevend vleesch te voorschijn kwam, het welk te kennen gaf, dat de versterving hier staan

(\*) Het droog verband word insgelijks aanbevolen door den heer BONNAUD. *Journal de Medecine, &c. T. XXXIV. Paris 1770. L.*

(\*\*) Men vind voorbeelden van de afzetting der dije uit het gewrigt in *Opuscules de chirurgie par MORAND, Paris 1768.*, in de *memoires sur les sujets proposes pour le prix de l'academie roy. de chirurgie. T. IX.*, waarin eene verhandeling geplaatst is van den heer BARBET, en in *Medical commentaries bij a Societij of Edinburgh. Vol. VI. L.*

bleef, en dat dit door versterfving aangedaan deel flegts nog even vast was, gelijk ik zulk een geval voor vijf en twintig jaaren in ons hospitaal gezien heb aan een kind van veertien jaaren, het welk brood van brandkoorn had gegeten, zo zou ik geen bedenking maaken, gelijk de heer DE LA CROIX en ik deden, om de dije uit het gewrigt af te zetten.

De handgreep bij het afzetten van een lid ter plaatze, daar de drooge versterfving zig vast gezet heeft, is eenvoudiger, dan die, welke wij boven beschreeven hebben. In dit geval gebeurt het dikwijls, dat men niet verpligt is, de vaten te onderscheppen en enkel eene kringvormige incisie met het incisiemes, om de spieren door te snijden, is genoeg.

Het gebeurt ook, dat zulk eene soort van versterfving, voornaamlijk, als zij van brandkoorn ontstaat, zig bij de gewrigten eindigt, als bij voorbeeld aan de knie. In dit geval kan men het lid uit het gewrigt afscheiden, ten minsten zou ik geen bedenking maaken om het te doen (15).

Ik zou nog meer voorbeelden van dergelijke afzet-

(15) [De heer WRABES heeft voor korten tijd een werkje in Duitschland gemeen gemaakt, waar in hij voorstelt: dat bij eene versterfving der uiterste ledematen de afbinding van het verstorven deel, de zekerste en beste wijze van behandeling in deze gebreken is; aanmerkende, dat men daar door veele toevallen, als bloedstorting, het uitsteecken van been en eene langdraadige geneezing enz. vermijdde. Dan, in hoe verre dit waar zij, zal de ondervinding, vertrouwen wij, ons nader bevestigen. Dit is zeker, dat dezelve nog met veele onvolkomenheden zwanger gaat; wij zullen hier bij aanhaalen de woorden van den onvermoeiden GESSCHER; welke, hier op zinspeelende, zegt: „dat de wijze van binden, door gemelde Heelmeester gedaan, mij niet flegts te omflagtig, maar ook te wreed toefchijnt.” e. z. v. „Oeff. Heelkunde, D. III. bladz. 120]



tingen kunnen bijbrengen, onder anderen eene, welke in herfstmaand 1771. in ons hospitaal aan een jongeling van agttien jaren ondernomen werd (\*).

(\*) Ik ga met voordagt de bekende geschillen tusſchen BILGUER en zijne tegenpartij, tusſchen POTT en KIRKLAND voorbij, welken onderzoeken, in welk geval de afzetting raadzaam is of niet. Liever zal ik eenige nuttige ſchriften en verhandelingen aanhaalen, welken kortling over deze gewigtige ſtof geſchreeven zijn. Als: ERNST PLATNER *Suppl. in Patris Inſtit. chirurgiæ Pars I. p. 123.*; *The ſurgical works* bij PERE POTT. vol. III. BROMFEILDS *chirurgiſche Wahrnemungen*; SCHMUCKER *in ſeinen Wahrnemungen 2ter Theil*; in den *vermiſchten Schriften 1ter Theil*; PORTAL in *l'Hift. de l'acad. des Sciences année 1773. 4.*, en ALANSON in *Observations upon Amputation an the After-treatment. London. 1779. 8. L.*

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.

---

## D R U K F O U T E N.

Bladz. 91. reg. 21. in de noot , staat *aterens* , moet zijn *atercus*.

Bladz. 185. reg. 3. in de noot , staat *aderlatinge* , moet zijn , *aderlatingen*.















